

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ

แบบแผนการบริโภคที่มีผลต่อน้ำหนักเด็กชาวเขา
เผ่ากะเหรี่ยง 0-1 ปี ตำบลแม่เหาะ อำเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อผู้เขียน

นายไชยณรงค์ ปิตรีตัน

สาขาสหศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาสหศึกษาศาสตร์

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

รองศาสตราจารย์ ชลอสรี	แดงเปี่ยม	ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ชมนาด	พจนามาตร์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ์	พงษ์สนธิ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยงค์	ลิมตระกูล	กรรมการ

บทคัดย่อ


การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา แบบแผนการบริโภคและหาความสัมพันธ์

ระหว่างแบบแผนการบริโภคกับน้ำหนักตัวของเด็กชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อายุ 0-1 ปี ในตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างรวม 130 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต ซึ่งสร้างขึ้นเองโดยผู้ศึกษา รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ มารดากลุ่มตัวอย่างทั้ง 130 รายและในจำนวน 130 รายนี้คัดเลือกโดยวิธีสุ่มอย่างง่ายอีก 45 ราย ทำการสังเกตแบบแผนการบริโภค วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ไค-สแควร์

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแบบแผนการบริโภคที่เหมาะสมถูกต้องตามเกณฑ์อายุครบทุกชนิดมี ร้อยละ 60.8 และที่ไม่เหมาะสมคือ ถูกต้องตามเกณฑ์อายุแต่ไม่ครบทุกชนิด มี

ร้อยละ 39.2 กลุ่มตัวอย่างมีระดับน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 71.5 และมีระดับน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 28.5 โดยจำแนกเป็นต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 1 ร้อยละ 25.4 ระดับ 2 ร้อยละ 3.1

แบบแผนการบริโภคและน้ำหนักเทียบเกณฑ์มาตรฐาน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

Independent Study Title Feeding Patterns Affecting Body Weight of
Karen Children Aged 0-1 year Tambon Mae-Hao
Amphoe Mae Sariang Changwat Mae Hong Son

Author Mr. Chainarong Piturat

Master of Public Health Public Health

Examining Committee

Assoc. Prof. Charosi Dangpiam Chairman

Assoc. Prof. Chomnard Potjanamart Member

Asst. Prof. Kannikar Pongsanit Member

Asst. Prof. Prayong Limtragool Member

Abstract

The purposes of this study were to investigate the feeding patterns and the relationship between feeding patterns and body weight of Karen children aged 0-1 year, Tambon Mae-Hao, Amphoe Mae Sariang, Changwat Mae Hong Son. The study samples consisted of 130 children, selected by simple random sampling. Interview schedule and observational guide designed by the investigator were the instruments of this study. Data were collected by interviewing of 130 mothers of the study samples and 45 out of 130 mothers were drawn by simple random sampling for observing the feeding patterns. Data were

analysed by using descriptive statistics. Chi-square was used to test hypothesis.

The results of the study showed that 60.8 percent of the samples had complete feeding pattern at appropriate time, 39.2 percent had received supplementary foods at appropriate time but had not complete feeding pattern. Seventy-one point five percent of the study was in normal standard body weight while 28.5 percent were in lower level; 25.4 percent was in the first degree and 3.1 percent was in the second degree lower than standard body weight. The feeding pattern was significantly related to the body weight at statistical level.001.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved