

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของนักศึกษาพยาบาล
 ชื่อผู้เขียน นางสาวภัทรา ไชยา
 ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์ศึกษา)
 คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
 รองศาสตราจารย์ละออ ดันติสิรินทร์ ประธานกรรมการ
 รองศาสตราจารย์อุเทน ปัญโญ กรรมการ

บทคัดย่อ

การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหารและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการกับการบริโภคอาหารของนักศึกษาพยาบาล ประชากรจำนวน 60 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสายบุรี จังหวัดปัตตานี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2548 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบบันทึกน้ำหนักและวัดส่วนสูง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แครมเมอร์วี ผลการศึกษาพบว่า ประชากรมีภาวะโภชนาการปกติ ร้อยละ 63.33 ภาวะโภชนาการต่ำกว่าปกติ ร้อยละ 31.67 ภาวะโภชนาการเกินปกติ ร้อยละ 5.00 การบริโภคอาหารที่เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับดี คือมีค่าเฉลี่ย 1.77 ส่วนการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับดี คือมีค่าเฉลี่ย 1.31 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการกับการบริโภคอาหารตามมือโดยรวม, การบริโภคอาหารที่เหมาะสมโดยรวม และ การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมโดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับน้อย (แครมเมอร์วี = .207, .249 และ .218)

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright © by Chiang Mai University
 All rights reserved

Independent Study Title Nutritional Status and Food Consumption of Nursing Students

Author Ms. Pattra Chaiya

Degree Master of Science (Nutrition Education)

Independent Study Advisory Committee

Assoc. Prof. La-aw Tuntisirintra Chairperson

Assoc. Prof. Uthen Panyo Member

ABSTRACT

The purposes of this study were to study the nutritional status, food consumption and the relationship between nutritional status and food consumption of nursing students. The population were 60 of the third year nursing students at Boromarajonani College of Nursing, Chiang Mai. Data were collected by questionnaires regarding to their food consumption and record forms of weight and height which the reliability was 0.78. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and Cramer's V correlation coefficient. The results showed that their nutritional status were normal, under and over with 66.33%, 31.67% and 5.00% respectively. The population had good behavior in food consumption at good level with mean 1.77. They had bad behavior in food consumption at good level with mean 1.31. The total correlation between nutritional status and every meal consumption, nutritional status and good behavior in food consumption and nutritional status and bad behavior in food consumption were low.

(Cramer's V =.207, .249, .218)

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved