ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ การฉันภัตตาหารและภาวะโภชนาการของสามเณร

ผู้เขียน พระชัชพงศ์ เรือนอ้าย

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์ศึกษา)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

อาจารย์ คร. ศักดา พรึ่งลำภู ประชานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ยุพา สุภากุล กรรมการ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการฉันภัตตาหาร ภาวะโภชนาการและ ความสัมพันธ์ระหว่างการฉันภัตตาหารกับภาวะโภชนาการของสามเณรที่จำพรรษาอยู่ในอำเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 155 รูป โดยคัดเลือกจากสามเณรที่มีอายุตั้งแต่ 13-18 ปี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบบบันทึกน้ำหนักและส่วนสูงและแบบบันทึกรายการ ภัตตาหารที่ฉันจำนวน 3 วัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและหาความสัมพันธ์โดยใช้การทดสอบไคสแควส์

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับภัตตาหารจากการบิณฑบาตร้อยละ 58.71 ฉันภัตตาหารร่วมกับสามเณร / พระรูปอื่นร้อยละ 90.97 ฉันภัตตาหารเช้าร้อยละ 70.06และ ฉันมื้อเพลร้อยละ67.74 ตามลำดับ ฉันภัตตาหารว่างเช้าเป็นบางวันร้อยละ 76.77 และฉัน ภัตตาหารว่างหลังมื้อเพล ร้อยละ53.55 ตามลำดับ ฉันข้าวเหนียว สัปดาห์ละ 6-10 ครั้ง ร้อยละ 50.97 ส่วนใหญ่ไม่ฉันข้าวต้มร้อยละ 80.00 และฉันน้ำเปล่าวันละ 5-6 แก้ว ร้อยละ 32.90 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับ การฉันภัตตาหารร้อยละ 58.71 โดยได้รับ คำแนะนำจากครอบครัวมากที่สุดร้อยละ 28.39 ภัตตาหารที่ฉันบ่อยคือภัตตาหาร ที่มีรสกลมกล่อม ร้อยละ 43.23 และภัตตาหารประเภทผัด ร้อยละ 29.03 ฉันขนมขบเคี้ยว ผลไม้ ลูกอมและ น้ำอัดลม ร้อยละ 89.68, ร้อยละ 96.13, ร้อยละ 81.29 และร้อยละ 90.97 ตามลำดับ

กลุ่มตัวอย่างฉันภัตตาหาร โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.41 หลีกเลี่ยง ภัตตาหารบางอย่างเมื่อสุขภาพปกติ ร้อยละ 50.32 โดยเฉพาะภัตตาหารสุกๆ ดิบๆ สำหรับ กลุ่มตัวอย่างเมื่ออาพาธ (ป่วย) หลีกเลี่ยงการฉันภัตตาหารร้อยละ 61.94 โดยเฉพาะภัตตาหารรสเผ็ดจัด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีน้ำหนักตามเกณฑ์ (โดยใช้เกณฑ์น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ) ร้อยละ 58.71 มีส่วนสูงตามเกณฑ์ (โดยใช้เกณฑ์ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ) ร้อยละ 54.19 และกลุ่มตัวอย่างมี ภาวะโภชนาการสมส่วน (โดยใช้เกณฑ์น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง) ร้อยละ 74.84

การฉันภัตตาหารและภาวะโภชนาการพบว่า การฉันภัตตาหารประเภทหวานมีความสัมพันธ์ กับภาวะโภชนาการ โดยใช้เกณฑ์น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบว่าการฉันภัตตาหารประเภทแกงมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ โดยใช้เกณฑ์ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05



Independent Study Title Food Consumption and Nutritional Status of Novices

Author Pra Chatchapong Ruen-aay

Degree Master of Science (Nutrition Education)

Independent Study Advisory Committee

Lect. Dr. Sakda Pruenglampoo Chairperson

Assoc. Prof. Yupa Supakul Member

ABSTRACT

The objectives of this study were to investigate food consumption, nutritional status and the correlation between food consumption and nutritional status of novice in San Pa Tong District, Chiang Mai Province. The sample consisted of 155 novices, which selected from the novice who were 13-18 years old. Questionnaires, weight-height record forms and 3 days food record forms were used to collect the data. They were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation and Chi-square Test.

The results showed that the novices got foods from Bintabath 58.71%. They ate foods with others novices / monks 99.97%. They had breakfast and lunch everyday 70.06% and 67.74%, respectively. They had break after breakfast and lunch for someday 76.77% and 53.33%, respectively. They ate sticky rice for 6-10 times a week 50.97%. Most of them did not eat boiled rice 80.00% and drank water 5-6 glasses a day 32.90%. They received suggestions about food consumption 58.71%, which from their families 28.39%. Food items, which quite frequently consumed were moderate taste 43.23% and stir fried foods 29.30%. They ate snacks, fruits, candies and soft drink 89.68%, 96.13, 81.29% and 90.97%, respectively.

They had food consumption practice at the level of faire which average score was 1.41. At normal healthy, they avoided to eat some foods 50.32%, especially some of medium rare foods. Whenever they sicked, they avoided to eat some foods 61.94%, especially spicy foods.

The novice had normal weight (by weight for age) 58.71%, normal height (by height for age) 54.19% and they had good nutritional status (by weight for height) 74.84%.

Sweet foods consumption was significant correlation with nutritional status by weight for age at the level of .05. Beside that curried foods consumption was significant correlation with nutritional status by height for age at the level of .05.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved