**ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ** การใช้ยาและการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคความคันโลหิตสูง

ผู้เขียน นางสิริลักษณ์ พงษ์สวัสดิ์

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(โภชนศาสตร์ศึกษา)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

อาจารย์ คร.ศักดา พรึงถำภู ประชานกรรมการ รองศาสตราจารย์เทียมศร ทองสวัสดิ์ กรรมการ

## บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ยาและการบริโภคอาหารของผู้ป่วย โรคความคัน โลหิตสูงในตำบลเชียงคาวที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเชียงคาว จังหวัดเชียงใหม่อย่างน้อย 6 เดือน จำนวน 54 คน ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรค ความคันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ การศึกษาในครั้งนี้ได้คำเนินการในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2551 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบบบันทึก เครื่องชั่งน้ำหนักและ เครื่องวัดส่วนสูง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

## ผลการศึกษาพบว่า

- 1. ประชากรมีการใช้ยาโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การใช้ ยาถูกต้องตามหลักการอยู่ในระดับดี แต่การป้องกันอันตรายและการจัดการอาการข้างเกียงจากการ ใช้ยาอยู่ในระดับพอใช้
- 2. ประชากรมีการบริโภคอาหารอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาหาร พบว่า การบริโภคอาหารไขมันอยู่ในระดับดี ที่ควรปรับปรุงคือ การบริโภคอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ส่วน ที่ต้องปรับปรุงคือ การบริโภคอาหารกลุ่มนม นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณการบริโภคอาหารแต่ละกลุ่มต่อวันของประชากรต่ำกว่าปริมาณที่แนะนำ ให้คนไทยบริโภคต่อวัน

Independent Study Title Drug Use and Food Consumption of Hypertension Patients

Author Mrs. Siriluk Pongsawat

Degree Master of Science (Nutrition Education)

**Independent Study Advisory Committee** 

Lect. Dr. Sakda Pruenglampoo Chairperson

Assoc. Prof. Tiamsorn Tongswas Member

## ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate drug use and food consumption of 54 hypertensive patients in Chiangdao sub-district who attended at Chiangdao primary care unit in Chiang Mai province at least 6 months. These patients were diagnosed to be essential hypertension by physician. The study was conducted during May to June 2008. Study instruments were questionnaire, recording form, scale, and altimeter. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation

The results of the study showed that:

- 1. The population had good level of overall drug use. When classified by aspects , the population had good level of medication compliance whereas they had satisfied level of prevention and management side effect.
- 2. The population had satisfied level of overall food consumption. When the food consumption was classified by groups, the results showed that their consumption of fat was at good level. But their consumption of meat, vegetables and fruits were at low level while those of rice-starch and milk were at very low level. In addition, the amount of food consumption per day of the population was quite lower than the recommended quantity per day for Thai people.