

ข้อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยของหญิง
ในระยะคลอด โรงพยาบาลนครปฐม

ผู้เขียน นางสาวปณัชช์รัตน์ บุนบุญยัง

ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาระบบที่ดีที่สุด)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

รองศาสตราจารย์ ดร. บรรณิการ กันธรรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รองศาสตราจารย์ ดร. นวี เบญจรงค์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

บทคัดย่อ

การดูแลผู้ป่วยในระยะคลอดมีความสำคัญในการช่วยลดการบาดเจ็บและลดภาวะแทรกซ้อนบริเวณผู้ป่วยที่มีอยู่จากการคลอด การศึกษา เชิงพัฒนารังนีมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับ การดูแลผู้ป่วยของหญิงในระยะคลอด โรงพยาบาลนครปฐม โดยใช้กรอบแนวคิดการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกของสถาบันวิจัยด้านการแพทย์และสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยเดิม ปี ค.ศ. 1999 ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาแนวปฏิบัติทางคลินิก โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพจำนวน 6 ราย โดยใช้แบบสอบถามความเป็นไปได้ในการนำแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า แนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการดูแลผู้ป่วยของหญิงในระยะคลอด โรงพยาบาลนครปฐม พัฒนาจากหลักฐานเชิงประจักษ์จำนวน 33 เรื่อง แนวปฏิบัติทางคลินิกประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การดูแลผู้ป่วยในระยะที่ 1 ของการคลอด 2) การดูแลผู้ป่วยในระยะที่ 2 ของการคลอด 3) การดูแลผู้ป่วยและแพลฟอร์มในระยะที่ 4 ของการคลอด และ 4) การดูแลผู้ป่วยและแพลฟอร์มก่อนขึ้นบ่ายจากห้องคลอด สำหรับความเป็นไปได้ในการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกพบว่า กลุ่มผู้ทดลองใช้แนวปฏิบัติทุกราย เห็นด้วยว่าแนวปฏิบัติทางคลินิกมีความง่ายไม่ซับซ้อน สะดวก สามารถนำไปใช้ได้จริง มีความพึงพอใจ มากและมีความเป็นไปได้มากในการนำไปใช้ใน

หน่วยงาน กลุ่มผู้ทดลองใช้แนวปฏิบัติจำนวน 4 ใน 6 ราย เห็นด้วยว่า ทีมสหสาขาวิชาสามารถปฏิบัติตามได้และการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกจะช่วยประยัดค่าใช้จ่ายได้มาก การศึกษาระบบนี้ยืนยันว่า แนวปฏิบัติทางคลินิกที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ และควรนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อนำสู่ขั้นตอนการนำไปใช้ และเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการด้านการดูแลฝ่ายบินระยะคลอดต่อไป



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

Independent Study Title Development of Clinical Practice Guidelines for Perineal Care Among Intrapartum Women, Nakhonpathom Hospital

Author Miss Panuttita Khumbunyung

Degree Master of Nursing Science (Advanced Midwifery)

Independent Study Advisory Committee

Associate Professor Dr. Kannika Kantaruksa

Advisor

Associate Professor Dr. Chavee Baosoung

Co-advisor

ABSTRACT

Perineal care during childbirth is important to reduce perineal trauma and complications in the delivery process. This developmental study aimed to develop clinical practice guidelines (CPGs) for perineal care among intrapartum women, Nakhonpathom hospital. A guide to the development of CPGs of the Australian National Health and Medical Research Council (1999) was used as a framework for this study. The CPGs were assessed for content validity by three experts. In addition, a test for the feasibility of the CPGs was done with six professional nurses using a CPG feasibility evaluation questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics.

The results revealed that the CPGs for perineal care among intrapartum women, Nakhonpathom hospital were developed from 33 pieces of evidence. The CPGs were composed of four domains: 1) perineal care in the 1st stage of labor; 2) perineal care in the 2nd stage of labor; 3) perineal care and perineal wound care in the 4th stage of labor; and 4) perineal care and perineal wound care before moving out from the labor room. From the feasibility test, all subjects strongly agree that the CPGs were lucid, convenient, applicable, satisfactory, and feasible to implement in the unit. Four of six subjects strongly agree that the multi-disciplinary team was able to follow the CPGs and use of the CPGs could saved costs.

The findings confirm that the developed CPGs are feasible for implementation and should be submitted to the administrators for further implementation and for quality development of perineal care during childbirth.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved