

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมกำรป้องกัน โรคมะเร็งปากมดลูก ของแรงงานสตรีที่ทำงานในโรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน	
ผู้เขียน	นางสาวกฤษติดาพร กีฬาแปง	
ปริญญา	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ)	
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา ไกรพิบูลย์	ประธานกรรมการ
	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิ่มอนงค์ งามประภาสุม	กรรมการ

บทคัดย่อ

โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบบากเป็นอันดับหนึ่งในสตรีไทย และมีอุบัติการณ์ของโรคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่โรคนี้สามารถป้องกันได้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมกำรป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกำรป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก กลุ่มตัวอย่างเป็นแรงงานสตรีที่ทำงานโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และไคสแควร์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัย พบว่า แรงงานสตรีส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมกำรป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกไม่ถูกต้อง ในระดับปฐมภูมิ (ร้อยละ 70.8) ในทุก ๆ ด้าน และในระดับทุติยภูมิ คือ การไม่ไปตรวจหาเซลล์ผิดปกติของปากมดลูกหรือแปปสเมียร์ ถึงร้อยละ 92.0 มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องใกล้เคียงกัน ด้านความสัมพันธ์ พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการรับรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากการวิจัย ยังพบอีกว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก และการรับรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิ และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ระดับทุติยภูมิ

ผู้วิจัยเสนอแนะให้บุคลากรในทีมสุขภาพ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก แก่แรงงานสตรีด้วยวิธีการต่างๆที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อย่างสม่ำเสมอ และจัดบริการตรวจเซลล์ผิดปกติของปากมดลูกหรือแพปสเมียร์ ให้แก่แรงงานสตรีสามารถได้รับการตรวจอย่างครอบคลุม



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

Thesis Title	Factors Affecting Preventive Behavior Concerning Cervical Cancer among Female Factory Workers in the Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province		
Author	Miss Kultidaporn Keelapang		
Degree	Master of Education (Health Promotion)		
Thesis Advisory Committee	Asst. Prof . Dr. Suchada Kraiphibul	Chairperson	
	Asst. Prof . Dr. Nimanong Ngamprapasom	Member	


ABSTRACT

The incidence of cervical cancer is the highest among all type of cancer among Thai women. Although preventive means can be taken, the incidence of the disease is still increasing. This research is designed to identify both primary and secondary preventive health behavior cervical cancer and relationship between some select factors and preventive health behavior cervical cancer. The subject were 400 randomly chosen female factory workers in the Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province. The data were collected by interview technique with the structured questionnaire that was made by researcher. Percentage, Pearson Product Moment Correlation Coefficient and chi-square and Multiple Regression were employed for data analysis.

The results show that the subjects had undesirable health behavior in cervical cancer prevention. The majority of female factory workers in the Northern Region Industrial Estate, Lamphun possessed undersirable primary (70.8%) and secondary (92.0%) preventive health behavior. The perception of cervical cancer was correct (54.0%) and incorrect (46.0%). There were significant relationships between information known about cervical cancer and primary and secondary prevention. The perception of cervical cancer was statistically related to primary prevention

From researching, it found that receiving information about cervical cancer protection and the perception of cervical cancer affected to the behavior of the primary cervical cancer prevention, and receiving information about cervical cancer prevention affected to the behavior of the secondary cervical cancer protection.

Regarding the research finding, it is recommended that health teams should be encouraged to provide more information concerning cervical cancer and pap smear service for female factory workers to encourage them to continuously perform preventive health behavior.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved