

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชาย
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดตาก

คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม

การวิจัยครั้งนี้ ต้องการทราบถึงพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในแบบสอบถามนี้จะมีข้อความให้ท่านอ่านเพื่อพิจารณาถึงความรู้สึก ความคิดเห็น หรือความเชื่อและการปฏิบัติตัวตามความเป็นจริงของท่าน ดังนั้นคำตอบจึงไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด ขอให้ท่านตอบตรงกับความรู้สึก ความคิดเห็น ความเชื่อ และการปฏิบัติตัวของท่านมากที่สุด โดยคำตอบจะสรุปเป็นภาพรวมและจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการจะนำข้อมูลมาวางแผนและจัดทำโครงการควบคุมโรคเอดส์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ให้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเยาวชนไทยต่อไป

ทั้งนี้คำตอบที่ได้ทุกข้อจะเก็บเป็นความลับ และไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตัวท่านทั้งสิ้น

ขอขอบคุณที่ท่านกรุณาให้ความร่วมมือในครั้งนี้

บุญยานุช เดชบริบูรณ์

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลทั่วไป

1. อายุ.....ปี
2. ท่านมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุ.....ปี (จำนวนปีเต็ม)
3. ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับใคร
 - () 1. เพื่อน / คู่รัก
 - () 2. หญิงรักสนุกที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
 - () 3. หญิงขายบริการทางเพศ
 - () 4. อื่น ๆ ระบุ.....
4. ท่านเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 - () 1. ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 6)
 - () 2. เคย เป็นโรค ระบุ.....
5. รักษาที่ได้
 - () 1. คลินิกเอกชน
 - () 2. โรงพยาบาล / สาธารณสุขจังหวัด / สถานีอนามัย
 - () 3. ซื้อมากินเอง
 - () 4. อื่น ๆ ระบุ.....
6. ท่านได้รับเงินจากผู้ปกครองหรือบุคคลอื่น ๆ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายประมาณกี่บาทต่อเดือน
 - () 1. น้อยกว่า 500 บาท / เดือน
 - () 2. 501 – 1,000 บาท / เดือน
 - () 3. 1,001 – 1,500 บาท / เดือน
 - () 4. มากกว่า 1,500 บาท / เดือน

1. ความรู้เรื่องโรคเอดส์

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย “/” ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อความ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ทราบ
1. โรคเอดส์ คือ กลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง			
2. เมื่อได้รับเชื้อ โรคเอดส์เข้าสู่ร่างกายแล้ว จะแสดงอาการของโรคทันที			
3. จะทราบว่าติดเชื้อ โรคเอดส์หรือไม่ ด้วยการตรวจเลือด			
4. อาการเตือนที่น่าสงสัยว่าอาจจะเป็น โรคเอดส์ ได้แก่ ต่อม้ำเหลืองโต อ่อนเพลียมาก น้ำหนักลด มีไข้เรื้อรัง ท้องเสียเรื้อรัง			
5. เมื่อท่านมีเชื้อ โรคเอดส์อยู่ในร่างกาย ท่านสามารถถ่ายทอดเชื้อ โรคเอดส์ไปสู่คู่นอนของท่านได้			
6. โรคเอดส์ติดต่อได้โดยการ ใช้ของสาธารณะต่าง ๆ ร่วมกัน			
7. โรคเอดส์ติดต่อได้โดยการสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวกับ ผู้ติดเชื้อเอดส์			
8. บူးสามารถแพร่เชื้อ โรคเอดส์ได้			
9. เลือดหรือน้ำเหลืองผู้ป่วยโรคเอดส์ถ้าสัมผัสบนผิวหนังปกติที่มีแผลถลอก หรือบาดแผล จะไม่ทำให้ติดเชื้อเอดส์			
10. เชื้อโรคเอดส์สามารถถูกฆ่าได้โดยในน้ำต้มเดือด 100 องศาเซลเซียส นาน 20. นาที			
11. การใช้ถุงยางอนามัยในการร่วมเพศทุกครั้งสามารถป้องกันโรคเอดส์ได้			

2. การรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคเอดส์

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย “ / “ ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึก ความคิดเห็น ความเชื่อ และการกระทำตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด เพียงข้อเดียว และกรุณาตอบทุกข้อ

ข้อความ	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย
1. การร่วมเพศกับหญิงบริการเพียงครั้งเดียว ไม่สามารถทำให้ติดเชื้อโรคเอดส์ได้			
2. การเที่ยวหญิงบริการที่ราคาแพง ไม่มีโอกาสติดเชื้อโรคเอดส์ได้			
3. การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการทางเพศที่เป็นขาประจำ ไม่ทำให้ติดเชื้อเอดส์			
4. การมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนด้วยกัน ทำให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อเอดส์			
5. การใช้ถุงยางอนามัยทำให้ความรู้สึก ในการร่วมเพศลดลง			
6. การร่วมเพศที่มีการใช้ปาก มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์			
7. คนทั่วไปมีโอกาสติดเชื้อโรคเอดส์ได้ จากการใช้ใบมีดโกนร่วมกับบุคคลอื่น			
8. การสักรูปรอยต่าง ๆ บนร่างกาย มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์			

3. การรับรู้ถึงความรุนแรงของโรค

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย “ / “ ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึก ความคิดเห็น ความเชื่อ และการกระทำตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด เพียงข้อเดียว และกรุณาตอบทุกข้อ

ข้อความ	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย
1. โรคเอดส์เป็นโรคร้ายแรง เป็นแล้วไม่มีทางรักษาให้หายจากโรค			
2. โรคเอดส์ถ้ายังไม่มีอาการแสดง ไม่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้			
3. ผู้ที่ได้รับเชื้อโรคเอดส์ เมื่อเกิดการเจ็บป่วยจะมีอาการรุนแรงและรักษาได้ยากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับเชื้อโรคเอดส์			
4. การติดเชื้อโรคเอดส์ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำลง และเป็นโรคแทรกซ้อนได้ง่าย			
5. เมื่อติดเชื้อโรคเอดส์แล้ว ควรร่วมเพศบ่อย ๆ จะทำให้เชื้อโรคในตัวลดลง			
6. ผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์ เป็นผู้ที่มีความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ			
7. ผู้ป่วยเอดส์ถ้าปฏิบัติตนไม่ถูกต้องมีโอกาสเสียชีวิตได้เร็วกว่าโรคอื่น			
8. ทารกที่เกิดจากมารดาที่เป็นโรคเอดส์ มีโอกาสติดเชื้อโรคเอดส์ได้			
9. มารดาที่เป็นโรคเอดส์ จะมีโอกาสเสียชีวิตและทิ้งบุตรให้เป็นภาระทางสังคม			
10. โรคเอดส์ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน ทั้งต่อผู้ที่เป็นโรคเอดส์เองและต่อครอบครัว			

4. การรับรู้ถึงคุณค่าของการใช้ถุงยางอนามัย

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย “ / “ ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึก ความคิดเห็น ความเชื่อ และการกระทำตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด เพียงข้อเดียว และกรุณาตอบทุกข้อ

ข้อความ	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย
1. การป้องกันโรคเอดส์ทำได้ง่ายกว่าการรักษา			
2. แม้ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง แต่ทุกคนควรมีความรู้เรื่องเอดส์และการป้องกัน			
3. สามีที่ติดเชื่อโรคเอดส์ถ้าสวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาทุกครั้งสามารถป้องกันเชื้อโรคเอดส์ไปสู่ภรรยาได้			
4. ท่านควรพกถุงยางอนามัยติดตัวไว้เสมอ เพื่อจะได้หยิบใช้เมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง			
5. ไม่จำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพราะโรคเอดส์ไม่ได้ติดต่อกันง่าย			
6. การร่วมเพศ โดยใช้ถุงยางอนามัยเป็นสิ่งที่น่ารำคาญ			
7. การร่วมเพศ โดยใช้ถุงยางอนามัยทำให้การหลั่งน้ำอสุจิช้า			
8. การใช้ถุงยางอนามัยขณะร่วมเพศทุกครั้งสามารถป้องกันโรคเอดส์ได้			
9. การสวมถุงยางอนามัยเป็นเรื่องยุ่งยากทำให้เสียเวลา			
10. การไม่สวมถุงยางอนามัยขณะร่วมเพศแสดงถึงความเห็นชาชชาติ			

5. ความสะดวกในการมีและใช้ถุงยางอนามัย

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย “ / “ ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึก ความคิดเห็น ความเชื่อ และการกระทำตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด เพียงข้อเดียว และกรุณาตอบทุกข้อ

ข้อความ	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย
1. สถานบริการทางเพศทุกแห่ง ควรมีถุงยางอนามัยไว้บริการ			
2. ภายในห้องนอนของโรงแรม ควรมีถุงยางอนามัยวางไว้			
3. ถุงยางอนามัยควรมีขายตามร้านขายยา ห้างสรรพสินค้า หรือตามร้านขายของชำต่าง ๆ			
4. ห้องพยาบาลของวิทยาลัย ควรมีถุงยางอนามัยแจกฟรีสำหรับนักศึกษา			
5. ท่านรู้สึกสบายใจ เมื่อไปซื้อถุงยางอนามัยจากร้านที่สามารถหยิบได้เอง			
6. ท่านชอบใช้ถุงยางอนามัยที่มีลักษณะบาง เวลาสวมใส่แล้วให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ			
7. ถุงยางที่ดีควรมีลักษณะเหนียว บาง ไม่แตกง่าย			

6. คำแนะนำของบุคคลใกล้ชิดเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย “ / “ ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึก ความคิดเห็น ความเชื่อ และการกระทำตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด เพียงข้อเดียว และกรุณาตอบทุกข้อ

ข้อความ	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย
1. เมื่อได้รับคำแนะนำจากพ่อแม่ ญาติ หรือพี่น้อง ให้ใช้ถุงยางอนามัยในการร่วมเพศ ท่านปฏิบัติตามมากขึ้น			
2. เมื่อได้รับคำแนะนำจากเพื่อน หรือคนรัก ให้ใช้ถุงยางอนามัยในการร่วมเพศ ท่านปฏิบัติตามมากยิ่งขึ้น			
3. เมื่อคุ้นเคยกับวิธีการใช้ถุงยางอนามัยในการร่วมเพศ ท่านปฏิบัติตามมากขึ้น			
4. เมื่อมีผู้ติดเชื้อโรคเอดส์แนะนำท่านเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยในการร่วมเพศ ท่านปฏิบัติตามมากขึ้น			

7. การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์และถุงยางอนามัย

7.1 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ และถุงยางอนามัยจากแหล่งใดบ้าง โปรดใส่เครื่องหมาย (/) หน้าคำตอบที่ท่านเลือก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1. () หนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ
2. () โทรทัศน์
3. () รายการวิทยุ
4. () แผ่นป้ายตามสถานที่ต่างๆ
5. () นิทรรศการ
6. () เอกสาร หรือแผ่นปลิวต่างๆ
7. () คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล
8. () คำแนะนำจากอาจารย์
9. () คำแนะนำจากเพื่อน
10. () แหล่งอื่นๆ ระบุ.....

7.2 จงเรียงลำดับที่ท่านได้รับข่าวสาร จากมากไปหาน้อย (เลือกคำตอบจากข้อ 7.1)

1.
2.
3.

7.3 แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ และถุงยางอนามัย แหล่งใดที่ท่านรู้และเข้าใจมากที่สุด (เลือกคำตอบจากข้อ 7.1)

.....

8. พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย “ / “ ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึก ความคิดเห็น ความเชื่อ และการกระทำตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด เพียงข้อเดียว และกรุณาตอบทุกข้อ

ข้อความ	ทุกครั้ง	บางครั้ง	ไม่ใช่เลย
1. ท่านมีถุงยางอนามัยติดตัวไว้เสมอ			
2. เนื่องด้วยท่านกลัวติดเชื้อโรคเอดส์ ท่านจึงใช้ถุงยางอนามัย			
3. เนื่องด้วยท่านกลัวคู่นอนของท่านตั้งครรภ์ ท่านจึงใช้ถุงยางอนามัย			
4. เนื่องด้วยท่านกลัวโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท่านจึงใช้ถุงยางอนามัย			
5. เมื่อท่านมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการทางเพศ ท่านใช้ถุงยางอนามัย			
6. เมื่อท่านมีเพศสัมพันธ์กับคู่อรักหรือเพื่อน ท่านใช้ถุงยางอนามัย			
7. เมื่อท่านมีเพศสัมพันธ์กับชายรักร่วมเพศ ท่านใช้ถุงยางอนามัย			

9. ท่านใช้ถุงยางอนามัยในการร่วมเพศครั้งแรกเมื่ออายุ.....ปี

ภาคผนวก ข

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ความรู้เรื่องโรคเอดส์

ความรู้	ตอบถูก ร้อยละ	ตอบผิด ร้อยละ
1. จะทราบว่าติดเชื้อโรคเอดส์หรือไม่ ด้วยการตรวจเลือด	96.9	3.1
2. โรคเอดส์ คือกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่อง	91.8	8.2
3. เมื่อได้รับเชื้อโรคเอดส์เข้าสู่ร่างกายแล้วจะแสดงอาการของโรคทันที	87.6	12.4
4. โรคเอดส์ติดต่อได้โดยการสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวกับผู้ติดเชื้อเอดส์	86.1	13.9
5. เมื่อท่านมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกาย ท่านสามารถถ่ายทอดเชื้อโรคเอดส์ไปสู่คู่นอนของท่านได้	80.4	19.6
6. อาการเตือนที่น่าสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคเอดส์ได้แก่ ต่อมมน้ำเหลืองโต อ่อนเพลียมาก น้ำหนักลด มีไข้เรื้อรัง ท้องเสียเรื้อรัง	75.3	24.7
7. โรคเอดส์ติดต่อได้โดยการใช้ของสาธารณะต่าง ๆ ร่วมกัน	75.3	24.7
8. การใช้ถุงยางอนามัยในการร่วมเพศทุกครั้งสามารถป้องกันโรคเอดส์ได้	72.2	27.8
9. ยุง สามารถแพร่เชื้อโรคเอดส์ได้	61.9	38.1
10. เลือดหรือน้ำเหลืองของผู้ป่วยโรคเอดส์ถ้าสัมผัสบนผิวหนังปกติที่มีแผลถลอกหรือบาดแผลจะไม่ทำให้ติดเชื้อโรคเอดส์	40.7	59.3
11. เชื้อโรคเอดส์สามารถถูกฆ่าได้โดยในน้ำต้มเดือด 100 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที	18.6	81.4

2. การรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคเอดส์

การรับรู้	เห็นด้วย ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย ร้อยละ
1. คนทั่วไปมีโอกาสติดเชื้อโรคเอดส์ได้ จากการใช้ใบมีด โกนร่วมกับบุคคลอื่น	69.1	22.7	8.2
2. การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการทางเพศที่เป็นขา ประจำ ไม่ทำให้ติดเชื้อเอดส์ *	7.7	34.0	58.2
3. การเที่ยวหญิงบริการที่มีราคาแพง ไม่มีโอกาสติดเชื้อ โรคเอดส์ *	8.2	34.5	57.2
4. การสักกรูปรอยต่าง ๆ บนร่างกายมีโอกาสเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อโรคเอดส์	57.2	36.1	6.7
5. การมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนด้วยกัน ทำให้ปลอดภัย จากการติดเชื้อเอดส์ *	16.0	51.5	32.5
6. การร่วมเพศกับหญิงบริการเพียงครั้งเดียวไม่สามารถทำ ให้ติดเชื้อโรคเอดส์ได้ *	13.9	56.2	29.9
7. การร่วมเพศที่มีการใช้ปากมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการติด เชื้อโรคเอดส์	14.9	56.2	28.9
8. การใช้ถุงยางอนามัยทำให้ความรู้สึกในการร่วมเพศลด ลง *	49.5	36.1	14.4

หมายเหตุ * หมายถึง คำถามเชิงลบ

3. การรับรู้ถึงความรุนแรงของโรคเอดส์

การรับรู้	เห็นด้วย ร้อยละ	ไม่แน่ใจ ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย ร้อยละ
1. โรคเอดส์เป็นโรคร้ายแรง เป็นแล้วไม่ทางรักษาให้หาย จากโรค	88.7	8.2	3.1
2. การติดเชื้อโรคเอดส์ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำลง และเป็นโรคแทรกซ้อนได้ง่าย	85.6	12.9	1.5
3. เมื่อติดเชื้อโรคเอดส์แล้ว ควรร่วมเพศบ่อย ๆ จะทำให้ เชื้อโรคในตัวลดลง *	6.7	10.3	83.0
4. ผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์ เป็นผู้ที่มีความทุกข์ ทรมาน ทั้งร่าง กายและจิตใจ	79.9	14.9	5.2
5. ทารกที่เกิดจากมารดาที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ มีโอกาสติด เชื้อโรคเอดส์ได้	77.8	19.6	2.6
6. โรคเอดส์ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งต่อผู้ที่เป็นโรค เอดส์เองและต่อครอบครัว	77.3	16.5	6.2
7. ผู้ป่วยเอดส์ถ้าปฏิบัติตนไม่ถูกต้องมีโอกาเสียชีวิตได้ เร็วกว่าโรคอื่น	74.2	21.6	4.1
8. มารดาที่เป็นโรคเอดส์จะมีโอกาเสียชีวิตและทิ้งบุตรให้ เป็นภาระทางสังคม	73.1	20.6	6.2
9. โรคเอดส์ถ้ายังไม่มีการแสดง ไม่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้ อื่นได้ *	7.2	36.1	56.7
10. ผู้ที่ได้รับเชื้อโรคเอดส์เมื่อเกิดการเจ็บป่วยจะมีอาการ รุนแรง และรักษาได้ยากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับเชื้อโรคเอดส์	58.2	37.6	4.1

หมายเหตุ * หมายถึง คำถามเชิงลบ

4. การรับรู้ถึงคุณค่าของการใช้ถุงยางอนามัย

การรับรู้	เห็นด้วย ร้อยละ	ไม่แน่ใจ ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย ร้อยละ
1. แม้ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง แต่ทุกคนควรมีความรู้เรื่องโรคเอดส์และการป้องกัน	93.8	4.1	2.1
2. การป้องกันโรคเอดส์ทำได้ง่ายกว่าการรักษา	89.2	7.2	3.6
3. ท่านควรพกถุงยางอนามัยติดตัวไว้เสมอ เพื่อจะได้หยิบใช้เมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง	84.0	11.3	4.6
4. ไม่จำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพราะโรคเอดส์ไม่ได้ติดต่อกันง่าย *	8.2	14.9	76.8
5. การใช้ถุงยางอนามัยขณะร่วมเพศทุกครั้งสามารถป้องกันโรคเอดส์ได้	56.7	35.1	8.2
6. การไม่สวมถุงยางอนามัยขณะร่วมเพศแสดงถึงความ เป็นชายชาตรี *	20.1	25.8	54.1
7. การสวมถุงยางอนามัยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากทำให้เสียเวลา *	28.4	26.8	44.8
8. การร่วมเพศโดยใช้ถุงยางอนามัยเป็นสิ่งที่น่ารำคาญ *	31.4	24.2	44.3
9. สามี่ที่ติดเชื้อโรคเอดส์ ถ้าสวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาทุกครั้งสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ไปสู่ภรรยาได้	37.6	53.1	9.3
10. การร่วมเพศโดยใช้ถุงยางอนามัยทำให้การหลั่งน้ำอสุจิ ช้า *	27.3	57.2	15.5

หมายเหตุ * หมายถึง คำถามเชิงลบ

5. ความสะดวกในการมีและใช้ถุงยางอนามัย

ข้อความ	เห็นด้วย ร้อยละ	ไม่เห็นใจ ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย ร้อยละ
1. สถานบริการทางเพศทุกแห่งควรมีถุงยางอนามัยไว้บริการ	89.7	9.8	0.5
2. ภายในห้องนอนของโรงแรมควรมีถุงยางอนามัยวางไว้	87.6	10.3	2.1
3. ถุงยางอนามัยควรมีขายตามร้านขายยา ห้างสรรพสินค้า หรือตามร้านขายของชำต่าง ๆ	79.4	12.4	8.2
4. ถุงยางที่ดีควรมีลักษณะเหนียว บาง ไม่แตกง่าย	78.9	14.9	6.2
5. ห้องพยาบาลของวิทยาลัย ควรมีถุงยางอนามัยแจกฟรี สำหรับนักศึกษา	74.2	17.0	8.8
6. ท่านรู้สึกสบายใจ เมื่อไปซื้อถุงยางอนามัยจากร้านที่สามารถหยิบได้เอง	72.2	20.1	7.7
7. ท่านชอบใช้ถุงยางอนามัยที่มีลักษณะบาง เวลาสวมใส่แล้วให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ	50.0	30.9	19.1

6. คำแนะนำของบุคคลใกล้ชิดเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย

ข้อความ	เห็นด้วย ร้อยละ	ไม่แน่ใจ ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย ร้อยละ
1. เมื่อได้รับคำแนะนำจากพ่อแม่ ญาติ หรือพี่น้อง ให้ใช้ถุงยางอนามัยในการร่วมเพศ ท่านปฏิบัติตามมากยิ่งขึ้น	81.4	17.0	1.5
2. เมื่อได้รับคำแนะนำจากเพื่อน หรือคนรัก ให้ใช้ถุงยางอนามัยในการร่วมเพศ ท่านปฏิบัติตามมากยิ่งขึ้น	79.9	18.6	1.5
3. เมื่อมีผู้ติดเชื้อโรคเอดส์แนะนำท่านเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยในการร่วมเพศ ท่านปฏิบัติตามมากยิ่งขึ้น	72.2	19.1	8.8
4. เมื่อคุณอนาปัตติเสการ ใช้ถุงยางอนามัยในการร่วมเพศ ท่านปฏิบัติตามมากยิ่งขึ้น *	26.3	37.6	36.6

หมายเหตุ * หมายถึง คำถามเชิงลบ

7. การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ และถุงยางอนามัย

แหล่งข้อมูล	จำนวน (N=194)	ร้อยละ
1. โทรทัศน์	179	92.3
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล	174	89.7
3. คำแนะนำจากอาจารย์	163	84.0
4. แผ่นป้ายตามสถานที่ต่าง ๆ	163	84.0
5. หนังสือพิมพ์ และวารสารต่าง ๆ	153	78.9
6. รายการวิทยุ	144	74.2
7. นิตรรศการ	132	68.0
8. คำแนะนำจากเพื่อน	113	58.2
9. เอกสารหรือแผ่นปลิวต่าง ๆ	100	51.5
10. แหล่งอื่น ๆ (จากพ่อแม่ ญาติ เพื่อนบ้าน)	37	19.5

8. พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย

ข้อความ	ทุกครั้ง ร้อยละ	บางครั้ง ร้อยละ	ไม่ใช่เลย ร้อยละ
1. เมื่อท่านมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการทางเพศ ท่านใช้ถุงยางอนามัย	82.5	9.8	7.7
2. เนื่องจากท่านกลัวโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท่านจึงใช้ถุงยางอนามัย	72.7	22.7	4.6
3. เมื่อท่านมีเพศสัมพันธ์กับชายรักร่วมเพศ ท่านใช้ถุงยางอนามัย	65.5	13.9	20.6
4. เนื่องจากท่านกลัวติดเชื้อโรคเอดส์ ท่านจึงใช้ถุงยางอนามัย	62.4	24.2	13.4
5. เนื่องจากท่านกลัวคู่นอนของท่านตั้งครรภ์ ท่านจึงใช้ถุงยางอนามัย	55.7	32.0	12.4
6. เมื่อท่านมีเพศสัมพันธ์กับคู่อรักหรือเพื่อน ท่านใช้ถุงยางอนามัย	54.6	30.4	14.9
7. ท่านมีถุงยางอนามัยติดตัวไว้เสมอ	29.4	47.9	22.7

9. พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศสัมพันธ์

ข้อความ	ทุกครั้ง ร้อยละ	บางครั้ง ร้อยละ	ไม่ใช้เลย ร้อยละ
1. เมื่อท่านมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการทางเพศ ท่านใช้ถุงยางอนามัย	85.7	6.5	7.8
2. เนื่องจากท่านกลัวโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท่านจึงใช้ถุงยางอนามัย	72.7	27.3	0
3. เมื่อท่านมีเพศสัมพันธ์กับชายรักร่วมเพศ ท่านใช้ถุงยางอนามัย	67.5	15.6	16.9
4. เนื่องจากท่านกลัวติดเชื้อโรคเอดส์ ท่านจึงใช้ถุงยางอนามัย	62.4	24.2	13.4
5. เนื่องจากท่านกลัวคู่นอนของท่านตั้งครรภ์ ท่านจึงใช้ถุงยางอนามัย	53.2	35.1	11.7
6. เมื่อท่านมีเพศสัมพันธ์กับคู่อริหรือเพื่อน ท่านใช้ถุงยางอนามัย	45.5	33.8	20.8
7. ท่านมีถุงยางอนามัยติดตัวไว้เสมอ	26.0	58.4	15.6

ภาคผนวก ก

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายอาชีวศึกษา จังหวัดตาก

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. ผศ. สมศรี | ปัทมพันธ์ | ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 2. ผศ. รัตนา | พันธ์พานิช | ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 3. อาจารย์ จิราพร | สุวรรณธีรางกูร | ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 4. คุณอดิศร | สมเจริญสิน | หัวหน้างานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก |

ประวัติผู้เขียน

ชื่อนามสกุล	นางบุญขานุช เดชบริบูรณ์
วัน เดือน ปีเกิด	7 พฤษภาคม 2511
ประวัติการศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2529 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ปีการศึกษา 2534
ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน	นักวิชาการควบคุมโรค 6 งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก