

## บทที่ 4

### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

#### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษารังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเพศและความรู้เกี่ยวกับ การให้คำปรึกษาเรื่องเพศ ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่วนปฐุ จังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาใน พยาบาลวิชาชีพทั้งหมดที่กำลังปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่วนปฐุ 130 คน และได้รับแบบสอบถามคืน จำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 91.54 รวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2545 ผลการศึกษาได้นำเสนอในรูปตาราง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากร

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเพศ

ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ

## ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากร

**ตาราง 1 จำนวนและร้อยละของประชากร จำแนกตาม เพศ อายุ ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติการพยาบาล ประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพพยาบาล**

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (N = 119 คน)	ร้อยละ
<b>เพศ</b>		
ชาย	14	11.8
หญิง	105	88.2
<b>อายุ</b>		
20-29	16	13.5
30-39	63	52.9
40-49	26	21.8
50 ปีขึ้นไป	14	11.8
<b>ตำแหน่ง</b>		
หัวหน้าเด็ก	11	9.2
รองหัวหน้าเด็ก	15	12.6
พยาบาลวิชาชีพ	87	73.2
อื่นๆ	6	5.0
<b>สถานที่ปฏิบัติการพยาบาลปัจจุบัน</b>		
แผนกชาย	52	43.7
แผนกหญิง	33	27.7
ศูนย์ป้องกันฯ	27	22.7
อื่นๆ	7	5.9
<b>ประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพพยาบาล</b>		
0-5 ปี	20	16.8
6-10 ปี	10	8.4
11-15 ปี	29	24.4
16 ปีขึ้นไป	60	50.4
ประสบการณ์ทำงานเฉลี่ย 15.07 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 8.53		
ประสบการณ์ทำงานน้อยที่สุด 1 ปี และมากที่สุด 38 ปี		
ประสบการณ์ในการทำงานของคนส่วนมาก 17 ปี		

จากตาราง 1 พบร่วมประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 88.2 และมีอายุอยู่ระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 52.9 อายุ 40-49 ปี ร้อยละ 21.8 เป็นพยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 73.2 และเป็นพยาบาลปฏิบัติการอยู่ในหอผู้ป่วยชั้นร้อยละ 43.7

ประชากรส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพพยาบาลมากกว่า 16 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 50.4 โดยจะมีประสบการณ์ในการทำงานเฉลี่ย 15.07 ปี ประสบการณ์การทำงานที่น้อยที่สุด คือ 1 ปี และประสบการณ์การทำงานที่นานที่สุด คือ 38 ปี

ตาราง 2 จำนวนและร้อยละของประชากร จำแนกตามการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษา การให้คำปรึกษาเรื่องเพศ และการทำงานในทีมการให้คำปรึกษาเรื่องเพศของ โรงพยาบาลส่วนปุรง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (N = 119 คน)	ร้อยละ
การอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Course )		
ไม่เคย	17	14.3
เคย	102	85.7
หลักสูตร 3 วัน	71	69.6
หลักสูตร 1 สัปดาห์	43	42.2
หลักสูตร ไม่เกิน 2 สัปดาห์	10	9.8
เคยอบรมมากกว่า 1 หลักสูตร	23	22.6
อื่นๆ	9	8.8
เคยให้คำปรึกษาเรื่องเพศ		
ไม่เคย	61	51.3
เคย	58	48.7
การหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย	42	72.4
การหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศหญิง	16	27.9
การหลั่งน้ำนมเร็ว	20	34.5
รักร่วมเพศ	33	56.9
การไม่บรรลุความสุขสุดยอดทางกามารมณ์	9	15.5
การແດກປຶ້ມຍຸນຄູນອນ	20	34.5
อื่นๆ	10	17.2
การปฏิบัติงานอยู่ในทีมการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ (คลินิกเพิ่มรัก)		
ใช่	5	4.2
ไม่ใช่	114	95.8

จากตาราง 2 พบร่วมกันว่าประชากรส่วนใหญ่จะได้รับการอบรมการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ 85.7 และหลักสูตรที่ได้รับการอบรมส่วนใหญ่จะเป็นการอบรมในหลักสูตร 3 วัน คิดเป็นร้อยละ 69.6 และในการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาดังกล่าวจะพบว่า มีประชากรได้รับการอบรมมากกว่า 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 22.6

นอกจากนี้ พบร่วมกันว่าประชากรที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ กับประชากรที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศโดยมีจำนวนใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 48.7 และ 51.3 ตามลำดับ สำหรับเรื่องที่ให้คำปรึกษาเรื่องเพศนั้น ได้แก่ ปัญหาระบบการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย จะมีผู้เข้ามารับการบริการขอรับคำปรึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.4 รองลงมาคือปัญหาระบบการรักษาเพศ คิดเป็นร้อยละ 56.9 และพบว่ามีเพียงร้อยละ 4.2 ของประชากรที่ทำงานในพื้นที่ในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศของโรงพยาบาลส่วนปฐุ (คลินิกเพิ่มรัก)

## ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเพศ

### ตาราง 3 จำนวนและร้อยละของประชากร จำแนกตามความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเพศ เรื่อง การหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย

ความรู้เรื่องการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย	ตอบถูก	
	จำนวน	ร้อยละ
1. โรคเบาหวาน เป็นโรคหนึ่งที่ทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว	98	82.4
2. การหย่อนสมรรถภาพทางเพศหมายถึงการที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้ด้านหลังที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้จนสำเร็จ	102	85.7
3. การหย่อนสมรรถภาพทางเพศของเพศชาย มีช่วงเก็บไว้ข้างก้นการแข็งตัวของอวัยวะเพศในตอนเช้าเป็นประจำ (full morning erection)	56	47.1
4. การรับประทานอาหารที่มีไขมันมาก เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งทำให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้	65	54.6
5. ฮอร์โมนเพศชายที่อยู่ในระดับต่ำ หรือยาเสพติดคบางอย่างเป็นสาเหตุของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ	108	90.8
*6. ปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศไม่สามารถที่จะรักษาได้	114	95.8
7. โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่เสี่ยงต่อการเกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้สูง	97	81.5
*8. คนที่รับประทานยาลดกรดนาน จะทำให้ความต้องการทางเพศลดลง ได้ถึงแม้ว่าจะหยุดรับประทานแล้วก็ตาม	92	77.3
*9. ยา Viagra ออกฤทธิ์ในการเพิ่มความต้องการทางเพศ	77	64.7
*10. ยา Viagra สามารถใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ทุกราย	114	95.8
*11. การพักผ่อนอย่างเพียงพอ และการออกกำลังกายเป็นประจำ เพียงแต่ช่วยในการให้พลังงานของเลือด แต่ไม่ช่วยให้การหย่อนสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นเนื่องจากการแข็งตัวของอวัยวะเพศเก็บไว้ข้างกันระบบประสาทมากกว่า	96	80.7
*12. จิง แป๊ก กิ๊วช น้ำมันปลา อาหารทะเล และพืชผัก ผลไม้สด เพียงแต่ทำให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น แต่ไม่ช่วยให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศดีขึ้น	42	35.3

หมายเหตุ \* หมายถึง ข้อความด้านลบ

จากตาราง 3 พบรวมว่า ประชากรส่วนใหญ่สามารถตอบถูกต้องเกินร้อยละ 80 ขึ้นไปใน 3 อันดับแรก ได้แก่ ยา Viagra สามารถใช้รักษาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ทุกราย และน้ำอุจหา การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ไม่สามารถที่จะรักษาได้ ร้อยละ 95.8 เท่ากัน และยอร์โมนเพศชาย ที่อยู่ในระดับต่ำ หรือยา酶ติดบางอย่างเป็นสาเหตุของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศร้อยละ 90.8

สำหรับข้อที่ตอบได้ถูกต้อง “ไม่ลึกร้อยละ 80 โดยนับเรียงจาก 3 อันดับสุดท้าย” ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีไขมน้ำมาก เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อชอร์โมนเพศชาย ซึ่งทำให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ร้อยละ 54.6 การหย่อนสมรรถภาพทางเพศของเพศชาย มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศในตอนเช้าเป็นประจำ (full morning erection) ร้อยละ 47.1 และไขง แบะกี้วัย น้ำมันปลา อาหารทะเล และพืชผัก ผลไม้สด เพียงแต่ทำให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น แต่ไม่ช่วยให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศดีขึ้นร้อยละ 35.3

**ตาราง 4 จำนวนและร้อยละของประชากร จำแนกตามความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเพศเรื่อง การหยอดน้ำนมบรรดาภพทางเพศในเพศหญิง**

ความรู้เรื่องการหยอดน้ำนมบรรดาภพทางเพศในเพศหญิง	ตอบถูก	
	จำนวน	ร้อยละ
*1. ความกลัวต่อความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากเคยมีประสบการณ์มา ก่อนเป็นสาวเหตุทำให้เกิดการหยอดน้ำนมบรรดาภพทางเพศในเพศหญิงมากที่สุด	14	11.8
*2. การหยอดน้ำนมบรรดาภพทางเพศในเพศหญิงมีสาวเหตุมาจากค้านจิตใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	108	90.8
*3. ผู้หญิงที่ถูกกระทำชำเรา ก่อน ส่งผลให้เกิดการหยอดน้ำนมบรรดาภพทางเพศได้ทุกราย	102	85.7
*4. กัญชา (marijuana) และยาอี (Ecstasy, MDMA) ช่วยกระตุ้น อารมณ์เพศได้ ดังนั้นจึงใช้รักษาการหยอดน้ำนมบรรดาภพทางเพศได้เช่นกัน	101	84.9
*5. ความกลัว ความอาย และความรู้สึกผิดต่อการมีเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดการหยอดน้ำนมบรรดาภพทางเพศในเพศหญิง ได้ทุกราย	57	63
*6. การที่ถูกเดี้ยงดูอย่างเข้มงวดความขัน ในเรื่องเพศ เป็นสาวเหตุ หนึ่งของการหยอดน้ำนมบรรดาภพทางเพศในเพศหญิงทุกราย	87	73.1
*7. ความรู้สึกว่าสามีเป็นคนโง่ หยาบคาย ไม่น่าไว้วางใจ อาจ ก่อให้เกิดปัญหาการหยอดร่างได้ แต่ไม่มีส่วนสัมพันธ์ต่อการตอบสนองทางเพศ	89	74.8

หมายเหตุ \* หมายถึง ข้อความค้านลบ

จากตาราง 4 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่สามารถตอบถูกต้องถูกน้อยละ 80 ขึ้นไป ได้แก่ การหยอดน้ำนมบรรดาภพทางเพศในเพศหญิงมีสาวเหตุมากจากทางค้านจิตใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ร้อยละ 90.8 ผู้หญิงที่ถูกกระทำชำเรา ก่อน ส่งผลให้เกิดการหยอดน้ำนมบรรดาภพทางเพศได้ทุกรายร้อยละ 85.7 และกัญชา (marijuana) และยาอี (Ecstasy, MDMA) ช่วยกระตุ้น อารมณ์เพศได้ ดังนั้นจึงใช้รักษา การหยอดน้ำนมบรรดาภพทางเพศได้เช่นกัน ร้อยละ 84.9

สำหรับข้อที่ตอบได้ถูกต้องไม่ถึงร้อยละ 80 โดยนับเรียงจาก 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ การที่ถูกเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดกว่าขั้นในเรื่องเพศ เป็นสาเหตุหนึ่งของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศหญิงทุกรายร้อยละ 73.1 ความกลัว ความอาย และความรู้สึกผิดคือการมีเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศหญิงได้ทุกรายร้อยละ 63 และความกลัวต่อความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากเคยมีประสบการณ์มาก่อนเป็นสาเหตุทำให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศหญิงมากที่สุดร้อยละ 11.8

**ตาราง 5 จำนวนและร้อยละของประชากร จำนวนความคุ้นเคยกับปัญหาทางเพศเรื่อง การหลั่งน้ำกามเรื้อรัง**

ความรู้เรื่องการหลั่งน้ำกามเรื้อรัง	ตอบถูก	
	จำนวน	ร้อยละ
*1. การหลั่งน้ำกามเรื้อรัง คือการที่สามีดึงชุดสุกดยอดจากการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนเวลาปกติกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนครั้งของการมีเพศสัมพันธ์	35	29.4
2. สามี/ภรรยาที่ทะเลกัน จะทำให้เกิดอารมณ์ก้าว้าว และขาดการควบคุมการหลั่งน้ำกามได้	71	59.7
3. ท่อปัสสาวะอักเสบจากการติดเชื้อ โ哥โนเรีย หนองในที่เป็นสาเหตุ ทำให้เกิดการหลั่งน้ำกามเรื้อรัง	48	40.3
4. ยาทางจิตบำบัดนานาทำให้การหลั่งน้ำกามช้าลงได้	94	79.0
5. side effect ของยาที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้ากลุ่ม SSRIs ( Selective Serotonin Reuptake Inhibitors ) ได้แก่ fluoxetine paroxetine sertraline ทำให้หลั่งน้ำกาม ได้ช้าลง	92	77.3
*6. ความตื่นเต้น ความวิตกกังวล ทำให้มีการหลั่งน้ำกาม ได้ช้าลง	50	42.0
*7. การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลั่งน้ำกามเรื้อรัง	62	52.1
*8. การสำเร็จความใคร่ด้วยดูดของข้างนอก 1 ชั่วโมงก่อนการมีเพศสัมพันธ์ ทำให้หลั่งน้ำกาม ได้ช้าลง	53	44.5
9. การกำหนดหมายใจ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การกำหนดสติและการระลึก្យส่วนต่างๆของร่างกาย เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้รักษาการหลั่งน้ำกามเรื้อรัง	102	85.7
*10. การหลั่งน้ำกามเรื้อรังมีสาเหตุมาจากการจิตใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	106	89.1
11. การลักษณะของยาที่ทำให้หลั่งน้ำกามเรื้อรัง เช่น ยาต้านอนสัมภាន ยาต้านประสาทสัมภាន ยาต้านไข้ ยาต้านภูมิแพ้ เป็นต้น	89	74.8
*12. การมีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งน้ำกามภายนอกช่องคลอด เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้หลั่งน้ำกาม ได้ช้าลง	65	54.6

หมายเหตุ \* หมายถึง ข้อความด้านลับ

จากตาราง 5 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่สามารถตอบถูกต้องเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้แก่ การหลั่งน้ำกามเรื้อรังมีสาเหตุมาจากการจิตใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นร้อยละ 89.1 และการกำหนดหมายใจ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การกำหนดสติ และการระลึก្យส่วนต่างๆของร่างกาย เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้รักษาการหลั่งน้ำกามเรื้อรัง ร้อยละ 85.7

สำหรับข้อที่ตอบได้ถูกต้องไม่ถึงร้อยละ 80 โดยนับเรียงจาก 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ ความตื่นเต้น ความวิตกังวล ทำให้มีการหลั่งน้ำกามได้ช้าลงร้อยละ 42.0 ท่อนี้สภาวะอักเสบจาก การติดเชื้อโภโนเรีย หนองในเทียน เป็นสาเหตุทำให้เกิดการหลั่งน้ำกามเร็วๆ ร้อยละ 40.3 และการหลั่งน้ำกามเร็ว คือการที่สามีถึงจุดสุดยอดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลามากกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนครั้งของการมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 29.4

ตาราง 6 จำนวนและร้อยละของประชากร จำแนกตามความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเพศเรื่อง รักร่วมเพศ

ความรู้เรื่องรักร่วมเพศ	ตอบถูก	
	จำนวน	ร้อยละ
*1. ชาย/หญิง มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันถือว่าผิดปกติ	61	51.3
2. กรรมพันธุ์ เป็นสาเหตุหนึ่งของรักร่วมเพศ	34	28.6
*3. ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเป็นความผิดปกติทางจิต	56	47.1
4. การมีเพศสัมพันธ์แบบรกร่วมเพศ (homosexual) ไม่จำเป็นต้องการรักษา	82	68.9
*5. การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง เป็นพฤติกรรมทางเพศที่ปกติ ในชายเท่านั้น	115	96.6
6. บุคลิกลักษณะของแม่ มีความสัมพันธ์กับการที่ทำให้ลูกนี้ตัด斷จะเป็นรักร่วมเพศ	86	72.3
7. แม่ที่มีลักษณะปกป้องมากเกินไป (overprotection) สนใจสอนมากเกินไป (overintimate) หวานมากเกินไป (possessive) เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กชายกลายเป็นเกย์ได้	101	84.9

หมายเหตุ \* หมายถึง ข้อความที่น่าสนใจ

จากตาราง 6 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่สามารถตอบถูกต้องเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้แก่ การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง เป็นพฤติกรรมทางเพศที่ปกติในชายเท่านั้นร้อยละ 96.6 และแม่ที่มีลักษณะปกป้องมากเกินไป (overprotection) สนใจสอนมากเกินไป (overintimate) หวานมากเกินไป (possessive) เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กชายกลายเป็นเกย์ได้ร้อยละ 84.9

สำหรับข้อที่ตอบได้ถูกต้องไม่ถึงร้อยละ 80 โดยนับเรียงจาก 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ ชาย/หญิงมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันถือว่าผิดปกติร้อยละ 51.3 ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน เป็นความผิดปกติทางจิตร้อยละ 47.1 และกรรมพันธุ์เป็นสาเหตุหนึ่งของรักแร່วัมเพศร้อยละ 28.6

**ตาราง 7 จำนวนและร้อยละของประชากร จำแนกตามความรู้เกี่ยวกับทางเพศ เรื่องการไม่บรรลุความสุขสุคยอดทางภาระมณี**

ความรู้เรื่องการไม่บรรลุความสุขสุคยอดทางภาระมณี	ตอบถูก	
	จำนวน	ร้อยละ
1. การไม่บรรลุความสุขสุคยอดทางภาระมณี คือ การที่ผู้หญิง ไม่สามารถตอบสนองทางเพศได้เป็นปกติเมื่อถูกกระตุ้นทางเพศ	68	57.1
*2. การที่ผู้หญิงที่เคยมีความสุขสุคยอดทางเพศมาก่อน และ ต่อมาไม่มีความสุขบ้าง ไม่มีบางเบื้องครั้ง เป็นการไม่บรรลุ ความสุขสุคยอดทางภาระมณีแบบหนึ่ง	45	37.8
3. เวลาที่ใช้ในการร่วมเพศมีความสัมพันธ์เป็นอย่างมากกับการ ที่ผู้หญิงจะมีความสุขสุคยอดทางภาระมณี	100	84.0
4. การกระตุ้นที่คลิตริต มีส่วนทำให้ผู้หญิงถึงจุดสุขสุคยอดทาง ภาระมณีได้	111	93.3
5. การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง เป็นวิธีการใช้รักษาการไม่ บรรลุความสุขสุคยอดทางภาระมณีวิธีหนึ่ง	90	75.6
*6. ผู้ที่มีประสบการณ์ในการแต่งงานนานา ทำให้การบรรลุ ความสุขสุคยอดทางภาระมณีลดลง	86	72.3
7. ระยะเวลาในการเล้าโลมก่อนการมีเพศสัมพันธ์ (fore play) จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบรรลุความสุขสุคยอดทางภาระมณี	118	99.2
*8. ถ้าใช้ระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ์นานประมาณ 16 นาที ขึ้นไป จะทำให้เพศหญิงทุกคนสามารถบรรลุความสุขสุค ยอดทางภาระมณีได้	66	55.5

หมายเหตุ \* หมายถึง จํอความด้านลบ

จากตาราง 7 พบรวมว่า ประชากรส่วนใหญ่สามารถตอบถูกต้องเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้แก่ ระยะเวลาในการเล้าโกลมก่อนการนีเพศสัมพันธ์ (fore play) จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบรรลุความสุข สุขด้วยด้วยการมีร้อยละ 99.2 การกระตุ้นที่คลิตอริส มีส่วนทำให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดด้วย การมีผลต่อร้อยละ 93.3 และเวลาที่ใช้ในการร่วมเพศมีความสัมพันธ์เป็นอย่างมากกับการที่ผู้หญิงจะมีความสุข สุขด้วยด้วยการมีร้อยละ 84.0

สำหรับข้อที่ตอบได้ถูกต้องไม่ถึงร้อยละ 80 โดยนับเรียงจาก 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ การไม่บรรลุความสุข สุขด้วยด้วยการมีผลต่อร้อยละ คือการที่ผู้หญิงไม่สามารถตอบสนองทางเพศได้เป็นปกติ เมื่อถูกกระตุ้นทางเพศร้อยละ 57.1 ถัดมาใช้ระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ์นานประมาณ 16 นาที ขึ้นไป จะทำให้เพศหญิงทุกคนสามารถบรรลุความสุข สุขด้วยด้วยการมีผลต่อร้อยละ 55.5 และการที่ผู้หญิงที่เคยมีความสุข สุขด้วยด้วยการมีผลต่อร้อยละ 37.8

ตาราง 8 จำนวนและร้อยละของประชากร จำแนกตามความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเพศเรื่อง การแลกเปลี่ยนคุณอน

ความรู้เรื่องการแลกเปลี่ยนคุณอน	ตอบถูก	
	จำนวน	ร้อยละ
1. การแลกเปลี่ยนคุณอนเกิดจากความต้องการแสวงหาสิทธิ เสรีภาพของเพศหญิง	15	12.6
*2. ผู้ที่มีพฤติกรรมแลกเปลี่ยนคุณอน ข้อว่าเป็นผู้ที่มีปัญหาหรือ ความผิดปกติทางจิต	53	44.5
*3. สามี/ภรรยา ที่ลักษณะมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น ถือว่าเป็นการ แลกเปลี่ยนคุณอนแบบหนึ่ง	52	43.7
*4. ผู้ที่มีพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนคุณอน จำเป็นต้องได้รับการ บำบัดรักษาจากจิตแพทย์	69	58.0

จากตาราง 8 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ตอบถูกใจเมื่อถึงร้อยละ 80 ทุกชื่อ ได้แก่ ผู้ที่มีพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนคุณอน จำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาจากจิตแพทย์ร้อยละ 58.0 ผู้ที่มีพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนคุณอน จัดว่าเป็นผู้ที่มีปัญหาหรือความผิดปกติทางจิตร้อยละ 44.5 สามี/ภรรยาที่ลักษณะมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นถือเป็นการแลกเปลี่ยนคุณอนแบบหนึ่งร้อยละ 43.7 และการแลกเปลี่ยนคุณอนเกิดจากความต้องการแสดงสิทธิเสรีภาพของเพศหญิงร้อยละ 12.6

### ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ

ตาราง 9 จำนวนและร้อยละของประชากร จำแนกตามความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ

ความรู้เรื่องการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ	ตอบถูก	
	จำนวน	ร้อยละ
1. ความต้องการทางเพศเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์แม้ว่าจะ อยู่ในภาวะเจ็บป่วย	116	97.5
2. การรับประทานยาคุมกำเนิด ยาด้านโภชิน และยาด้านโรคซึมเศร้า บางตัว ทำให้ความต้องการทางเพศลดลงได้	109	91.6
3. ความเครียด ความวิตกกังวล ก่อให้เกิดปัญหาทางเพศได้	119	100.0
*4. การตอบสนองทางเพศ เกิดขึ้นจากกระบวนการทางศีรษะร่างกายเท่านั้น	108	90.8
*5. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์	99	83.2
*6. ผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องเพศ ควรเป็นผู้ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้ว	106	89.1
7. ความต้องการทางเพศเป็นสิ่งปกติและจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต อย่างมีคุณภาพ (quality of life)	112	94.1
8. ปัญหาครอบครัวและปัญหาการหย่าร้าง ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาทาง เพศ	117	98.3
*9. การอดนอน การขาดการออกกำลังกาย หรือการรับประทานอาหารที่ ไม่มีประโยชน์ เพียงแต่ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยว ข้องกับการเกิดปัญหาทางเพศ	99	83.2
10. การให้คำปรึกษาเรื่องเพศเป็นส่วนหนึ่งของการให้การพยาบาลแบบองค์รวม	117	98.3
*11. ผู้ที่มีลักษณะมีเหตุผล มีความรู้ มั่นคง เป็นผู้ใหญ่ ก็เพียงพอแล้ว สำหรับการเป็นผู้ให้คำปรึกษาเรื่องเพศ	82	68.9
*12. การให้คำปรึกษาเรื่องเพศ ผู้ให้คำปรึกษาเปรียบเสมือนผู้นำทางในการ ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาได้พับแนวทางในการตัดสินใจ ได้ดีขึ้น	12	10.1
13. พยาบาลรถท่าน้ำที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเพศต้องติดต่อศูนย์บริการแพทย์	115	96.6
*14. ใน การให้คำปรึกษาเรื่องเพศนั้น การใช้ทักษะการทวนซ้ำ ควรทวนซ้ำ เฉพาะประโยชน์สำคัญเท่านั้น ไม่ควรนำเชิงความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวข้อง	42	35.3
*15. บุคลิกของผู้ให้คำปรึกษาเรื่องเพศ ควรจะมีความเป็นกันเอง ขึ้นมาก เมื่อไส ให้กำลังใจ เช้าใจผู้รับคำปรึกษาทุกคน ยกเว้นในกรณีที่ผู้รับ คำปรึกษาคำสั่งมืออาชญากรรมเจ็บป่วยทางจิต	63	52.9

**ตาราง 9 จำนวนและร้อยละของประชากร จำแนกตามความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ (ต่อ)**

ความรู้เรื่องการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ	ตอบถูก	
	จำนวน	ร้อยละ
*16. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษาเรื่องเพศ ควรจะเป็นความสัมพันธ์เชิงส่วนตัว/เชิงสังคม เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษาก็ตความไว้วางใจ กล้าที่จะเปิดเผย	100	84.0
*17. การสรุปความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมต่างๆของผู้รับคำปรึกษา เรื่องเพศตามประสบการณ์ของผู้ให้คำปรึกษาเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด	102	85.7
18. การให้คำปรึกษาเรื่องเพศ เป็นการช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาได้รับข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง และรับรู้ถึงศักยภาพในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้	117	98.3
*19. ท่านนั่งที่เหมาะสมขณะให้คำปรึกษา ผู้ให้คำปรึกษาควรจะนั่งแบบ เชิญหน้าและประسانดายตากับผู้รับคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา เพื่อแสดงถึงความใส่ใจและการตั้งใจฟัง	94	79.0
*20. ในการพิจารณาทางเลือก ผู้ให้คำปรึกษาควรจะมีส่วนในการช่วยเลือก ทางเลือกที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด ให้กับผู้รับคำปรึกษา เพราะผู้รับคำปรึกษาอาจจะซึ้งมองเห็นทางเลือกได้ไม่ค่อยชัดเจน	84	70.6
*21. ในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ ผู้ให้คำปรึกษาไม่ควรจะใช้ทักษะ สะท้อนความรู้สึก เพราะผู้รับคำปรึกษาอาจจะอาย และไม่กล้าเปิดเผย ความจริงของมา	101	84.9
*22. การให้คำปรึกษาเรื่องเพศ ควรจะใช้เฉพาะคำามป擅自เปลี่ยนเส้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับคำปรึกษาได้แสดงความรู้สึกได้อย่างเต็มที่	71	59.7
23. ขณะที่กำลังให้คำปรึกษาเรื่องเพศ ผู้รับคำปรึกษาเงียบไป แสดงว่าผู้รับคำปรึกษาอาจจะกำลังใช้เวลาคิดทบทวนถึงต่างๆ	100	84.0
*24. วิธีที่ดีที่สุดในการใช้ทักษะการสรุปความใน การให้คำปรึกษาเรื่องเพศ คือผู้ให้คำปรึกษาควรจะเป็นผู้สรุปให้ผู้รับคำปรึกษาฟัง	80	67.2
*25. ระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศแต่ละครั้ง ไม่ควรจะเกิน 45 นาที	18	15.1

หมายเหตุ \* หมายถึง ชื่อความค้านลบ

จากตาราง 9 พบร่วมประชากรส่วนใหญ่ สามารถตอบถูกต้องเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป ใน 3 อันดับแรก ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ก่อให้เกิดปัญหาทางเพศได้ร้อยละ 100.0

การให้คำปรึกษาเรื่องเพศ เป็นส่วนหนึ่งของการให้การพยาบาลแบบองค์รวม การให้คำปรึกษาเรื่องเพศ เป็นการช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และรับรู้ถึงศักยภาพในการแก้ปัญหาของตนเองได้ ปัญหาครอบครัว ปัญหาการอยู่ร้าง ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาทางเพศร้อยละ 98.3 เท่ากัน และความต้องการทางเพศ เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์แม้ว่าจะอยู่ในภาวะเจ็บป่วยร้อยละ 97.5

สำหรับข้อที่ตอบได้ถูกต้องไม่ถึงร้อยละ 80 โดยนับเรียงจาก 3 อันดับสูตรห้าย ได้แก่ ใน การให้คำปรึกษาเรื่องเพศนั้น การใช้ทักษะการทวนซ้ำ ควรทวนซ้ำเฉพาะประโยชน์คำพูดเท่านั้น ไม่ควรนำเอาความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวข้องร้อยละ 35.3 ระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศแต่ละครั้ง ไม่ควรเกิน 45 นาทีร้อยละ 15.1 และการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ ผู้ให้คำปรึกษาเปรียบเสมือนผู้นำทางในการช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาได้พบแนวทางในการตัดสินใจได้ดีร้อยละ 10.1

**ตาราง 10 จำนวนและร้อยละของประชากร จำแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเพศ และความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ**

ความรู้	ระดับน้อย		ระดับปานกลาง		ระดับดี	ระดับคีมาก
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน		
	(คน)	(คน)	(คน)	(คน)		
ความรู้เกี่ยวกับ ปัญหาทางเพศ	22 (18.5)	53 (44.5)	43 (36.1)	1 (.8)		
ความรู้เกี่ยวกับ การให้คำปรึกษา เรื่องเพศ	6 (5.0)	24 (20.2)	31 (26.1)	58 (48.7)		

จากตาราง 10 พนวณประชากรส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเพศอยู่ในระดับปานกลาง และระดับดี คิดเป็นร้อยละ 44.5 และร้อยละ 36.1 ตามลำดับ

ในส่วนของการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ พนวณ ประชากรส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเรื่องเพศอยู่ในระดับคีมาก และระดับดี คิดเป็นร้อยละ 48.7 และร้อยละ 26.1 ตามลำดับ