

## บทที่ 4

### ผลการศึกษา

การศึกษาตราบาปที่เกิดขึ้นกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ที่มารับบริการในโรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาจะนำเสนอตามลำดับดังนี้ 1) ปัจจัยพื้นฐานของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งประกอบด้วยลักษณะทางประชากรและสังคม สภาพความเจ็บป่วยและระดับความรุนแรงของโรค การรับรู้ถึงแหล่งที่นำเชื้อมาให้ตนเองและการเคยมีพฤติกรรมเสี่ยง การมีส่วนร่วมและบทบาทในชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี 2) การรับรู้ที่เป็นตราบาปของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 3) ความแตกต่างของการรับรู้ที่เป็นตราบาประหว่างปัจจัยพื้นฐานของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

#### 4.1. ปัจจัยพื้นฐานของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

##### 4.1.1 ลักษณะทางประชากรและสังคม

กลุ่มตัวอย่างเกือบ 2 ใน 3 เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.8) เป็นเพศชายมีร้อยละ 35.2 เกือบครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มอายุในช่วง 25-35 ปี (ร้อยละ 48.2) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 39.8) โดยพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มีอายุน้อยที่สุด อายุ 19 ปี อายุมากที่สุด 64 ปี และมีอายุเฉลี่ย 33 ปี (Mean = 33.2 S.D. = 7.43) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังใช้ชีวิตคู่พร้อมคู่สมรส และกลุ่มผู้ที่คู่สมรสได้เสียชีวิตแล้วมีจำนวนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมาคือเป็นโสด ร้อยละ 10.2 และที่แยกกันอยู่กับคู่สมรสมี ร้อยละ 6.5 สำหรับระดับการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เรียนจบในระดับประถมศึกษาถึงร้อยละ 63.9 รองลงมาคือเรียนจบระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 19.4) ที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีร้อยละ 12.0 และที่เรียนจบระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีมีร้อยละ 4.7 เท่านั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ยังประกอบอาชีพโดยมีอาชีพรับจ้างรายวันมากที่สุด (ร้อยละ 38.9) และที่ทำงานทำสวนทำไร่มีร้อยละ 13.9 และรับราชการมีร้อยละ 1.9 เท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 25.9 สำหรับรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนส่วนใหญ่ต่ำกว่า 2,500 บาทร้อยละ 50.9 รองลงมาคือระหว่าง 2,500 - 5,000 บาท ร้อยละ 40.7 และที่มากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 9.8 เท่านั้น (ดังรายละเอียดในตาราง 4.1)

ตาราง 4.1 ลักษณะทางประชากรและสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

| ลักษณะทางประชากรและสังคม                           | จำนวน<br>(n = 108) | ร้อยละ |
|--|--------------------|--------|
| 1. เพศ   |                    |        |
| -ชาย   | 38                 | 35.2   |
| -หญิง  | 70                 | 64.8   |
| รวม  | 108                | 100.0  |
| 2. กลุ่มอายุ                                       |                    |        |
| -ต่ำกว่า 25 ปี                                     | 13                 | 12.0   |
| -25 -35 ปี   | 52                 | 48.2   |
| -มากกว่า 35 ปีขึ้นไป                               | 43                 | 39.8   |
| รวม  | 108                | 100.0  |
| Mean = 33.2 ปี, S.D.=7.43, Min. =19, Max . = 64 ปี |                    |        |
| 3. สถานภาพสมรส                                     |                    |        |
| -โสด   | 11                 | 10.1   |
| -คู่   | 45                 | 41.7   |
| -หม้าย   | 45                 | 41.7   |
| -หย่าร้าง/แยกกันอยู่                               | 7                  | 6.5    |
| รวม  | 108                | 100.0  |

ตาราง 4.1 (ต่อ)

| ลักษณะทางประชากรและสังคม   | จำนวน<br>(n = 108) | ร้อยละ |
|--|--------------------|--------|
| 4. ระดับการศึกษา   |                    |        |
| -ประถมศึกษา  | 69                 | 63.9   |
| -มัธยมศึกษาตอนต้น  | 10                 | 9.3    |
| -มัธยมศึกษาตอนปลาย   | 11                 | 10.1   |
| -อนุปริญญา   | 2                  | 1.9    |
| -ปริญญาตรี   | 3                  | 2.8    |
| -ไม่ได้เรียนหนังสือ  | 13                 | 12.0   |
| รวม  | 108                | 100.0  |
| 5. อาชีพหลัก   |                    |        |
| -ไม่ได้ทำงานแล้ว   | 28                 | 25.9   |
| -รับจ้างรายวัน   | 42                 | 38.9   |
| -ทำนา/ทำสวน/ทำไร่  | 15                 | 13.9   |
| -ค้าขาย  | 12                 | 11.1   |
| -ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน  | 4                  | 3.7    |
| -รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   | 2                  | 1.9    |
| -ประกอบธุรกิจส่วนตัว   | 5                  | 4.6    |
| รวม  | 108                | 100.0  |
| 7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว   |                    |        |
| -ต่ำกว่า 2,500 บาท   | 55                 | 50.9   |
| -2,500 – 5,000 บาท   | 43                 | 40.7   |
| -มากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป   | 10                 | 9.4    |
| รวม  | 108                | 100.0  |
| Mean = 2,573.15 บาท, S.D.= 2,579.81 บาท, Min. = 300 บาท, Max. = 18,000 บาท |                    |        |

#### 4.1.2. สภาพความเจ็บป่วยและระดับความรุนแรงของโรค

กลุ่มตัวอย่างประมาณ 1 ใน 3 ติดเชื้อเอชไอวีมานานประมาณ 5-10 ปี (ร้อยละ 33.3) รองลงมาคือที่ติดเชื่อเป็นเวลา 1- 3 ปี (ร้อยละ 26.8) ที่ติดเชื่อน้อยกว่า 1 ปี และ 3 - 5 ปี มีจำนวนเท่ากันคือร้อยละ 16.7 และกลุ่มตัวอย่างที่ติดเชื่อมานานกว่า 10 ปีขึ้นไปมีน้อยที่สุดคือร้อยละ 6.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาการของโรคเอดส์ร้อยละ 65.7 อาการที่เกิดขึ้นมักเป็นอาการเบื้องต้นของโรคเอดส์แต่ยังไม่ถึงขั้นรุนแรง อาการที่พบมากที่สุดคือน้ำหนักลด (ร้อยละ 31.5) รองลงมาคือมีตุ่มผื่นทางร่างกาย (ร้อยละ 27.8) อ่อนเพลียและไข้ไหวัดเรื้อรังมีค่าเท่ากัน (ร้อยละ 25.9) โดยพบผู้ที่มีอาการเชื้อราในช่องปาก (ร้อยละ 25.0) สำหรับระดับความรุนแรงของโรคประเมินโดยผู้ศึกษาพบว่าประมาณกว่าครึ่งหนึ่งมีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ (ร้อยละ 54.6) รองลงมาคือเป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ (ร้อยละ 45.4) และไม่พบกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์เต็มขั้นเมื่อประเมินด้านสภาพร่างกายของกลุ่มตัวอย่างโดยผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์เองร้อยละ 56.6 สภาพร่างกายแข็งแรงดี รองลงมาคือมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อย (ร้อยละ 33.3) อ่อนเพลียปานกลาง (ร้อยละ 9.3) และที่อ่อนเพลียมากมีเพียง 1 คนเท่านั้น (ดังรายละเอียดในตาราง 4.2)

ตาราง 4.2 สภาพความเจ็บป่วยและระดับความรุนแรงของโรคของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

| สภาพความเจ็บป่วยและระดับความรุนแรงของโรค | จำนวน<br>(n =108) | ร้อยละ |
|--|-------------------|--------|
| 1.ระยะเวลาของการติดเชื้อเอชไอวี          |                   |        |
| - น้อยกว่า 1 ปี                          | 18                | 16.7   |
| - 1 - 3 ปี                               | 29                | 26.8   |
| - 3 - 5 ปี                               | 18                | 16.7   |
| - 5 -10 ปี                               | 36                | 33.3   |
| - มากกว่า 10 ปี                          | 7                 | 6.5    |
| รวม                                      | 108               | 100.0  |

ตาราง 4.2 (ต่อ)

| สภาพความเจ็บป่วย<br>และระดับความรุนแรงของโรค             | จำนวน<br>(n = 108) | ร้อยละ |
|--|--------------------|--------|
| <b>2. การมีอาการของโรคเอดส์</b>                          |                    |        |
| - มีอาการ  | 71                 | 65.7   |
| - ไม่มีอาการ   | 37                 | 34.3   |
| รวม  | 108                | 100.0  |
| <b>3. กลุ่มอาการของโรคเอดส์ที่พบในขณะนี้<sup>1</sup></b> |                    |        |
| - น้ำหนักลด  | 34                 | 31.5   |
| - ตุ่มผื่นทางร่างกาย                                     | 30                 | 27.8   |
| - อ่อนเพลีย  | 28                 | 25.9   |
| - มีไข้ ไอ หวัดเรื้อรัง                                  | 28                 | 25.9   |
| - เชื้อราในช่องปาก                                       | 27                 | 25.0   |
| - ปวดศีรษะ   | 19                 | 17.6   |
| - หายใจลำบากเหนื่อยหอบ แขนขาอ่อนแรง                      | 8                  | 7.4    |
| - ซาตามปลายมือปลายเท้า                                   | 7                  | 6.5    |
| - ตาพร่ามัวเห็นภาพซ้อน                                   | 6                  | 5.6    |
| - เริ่ม งูสวัด   | 6                  | 5.6    |
| - ถ่ายเหลว   | 5                  | 4.6    |
| - ต่อม้ำเหลืองโต   | 4                  | 3.7    |
| - เบื่ออาหาร   | 3                  | 2.8    |
| <b>4. ระยะเวลาในการดำเนินโรคเอดส์</b>                    |                    |        |
| - ระยะเวลาไม่ปรากฏอาการ                                  | 49                 | 45.4   |
| - ระยะเวลาปรากฏอาการ                                     | 59                 | 54.6   |
| - ระยะเวลาเอดส์เต็มขั้น                                  | 0                  | 0.0    |
| รวม  | 108                | 100.0  |

ตาราง 4.2 (ต่อ)

| สภาพความเจ็บป่วย<br>และระดับความรุนแรงของโรค | จำนวน<br>(n = 108) | ร้อยละ |
|--|--------------------|--------|
| 5. การรับรู้สภาพร่างกายในปัจจุบัน            |                    |        |
| - แข็งแรงดี                                  | 61                 | 56.6   |
| - อ่อนเพลียเล็กน้อย                          | 36                 | 33.3   |
| - อ่อนเพลียปานกลาง                           | 10                 | 9.3    |
| - อ่อนเพลียมาก                               | 1                  | 0.8    |
| รวม  | 108                | 100.0  |

หมายเหตุ ¹ หมายถึง จำนวนรวมของร้อยละกลุ่มอาการของโรคเอดส์ที่พบในขณะปัจจุบันอาจไม่เท่ากับ 100.0 และจำนวนกลุ่มตัวอย่างไม่เท่ากับ 108 เนื่องจากในบางรายมีคำตอบมากกว่าหนึ่งอาการ

#### 4.1.3 การรับรู้ถึงแหล่งที่นำเชื้อมาให้ตนเองและการเคยมีพฤติกรรมเสี่ยง การรับรู้ถึงแหล่งที่นำเชื้อเอชไอวีมาให้ตนเองของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

(ร้อยละ 60.1) รับรู้ว่าติดเชื้อมาจากคูสมรส รองลงมาคือรับรู้ว่าติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส (ร้อยละ 19.4) รับรู้ว่าติดเชื้อจากหญิงบริการทางเพศ (ร้อยละ 13.0) รับรู้ว่าติดเชื้อจากชายรักร่วมเพศและจากการใช้สารเสพติดมีจำนวนเท่ากันคือ ร้อยละ 2.8 และรับรู้ว่าติดเชื้อจากการสัมผัสเลือดกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 1.9 เท่านั้น สำหรับการเคยมีพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่เคยมีพฤติกรรมเสี่ยง (ร้อยละ 69.4) ได้แก่ เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การมีคู่นอนหลายคน ชายบริการทางเพศและจากการใช้ยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 27.8 22.2 15.7 และ 3.7 ตามลำดับ (ดังรายละเอียดในตาราง 4.3)

ตาราง 4.3 การรับรู้ถึงแหล่งที่นำเชื้อมาให้ตนเองและการเคยมีพฤติกรรมเสี่ยง

| การรับรู้ถึงแหล่งที่นำเชื้อมาให้ตนเอง<br>และการเคยมีพฤติกรรมเสี่ยง | จำนวน<br>(n = 108) | ร้อยละ |
|--|--------------------|--------|
| 1. แหล่งที่นำเชื้อเอชไอวีมาให้ตนเอง                                |                    |        |
| - จากคูสมรส  | 65                 | 60.1   |
| - จากหญิงบริการทางเพศ  | 14                 | 13.0   |
| - เพศสัมพันธ์นอกสมรส   | 21                 | 19.4   |
| - รักร่วมเพศ   | 3                  | 2.8    |
| - จากการใช้ยาเสพติด  | 3                  | 2.8    |
| - จากการสัมผัสเลือดกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี                           | 2                  | 1.9    |
| รวม  | 108                | 100.0  |
| 2. พฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี                              |                    |        |
| ไม่เคยมีพฤติกรรมเสี่ยง   | 33                 | 30.6   |
| เคยมีพฤติกรรมเสี่ยง  | 75                 | 69.4   |
| - เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย   | 30                 | 27.8   |
| - คู่นอนหลายคน   | 24                 | 22.2   |
| - ชายบริการทางเพศ  | 17                 | 15.7   |
| - จากการใช้ยาเสพติด  | 4                  | 3.7    |
| รวม  | 108                | 100.0  |

#### 4.1.4 การมีส่วนร่วมและบทบาทในชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี

กลุ่มตัวอย่างประมาณเกือบครึ่งหนึ่งมีส่วนร่วมในชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยการเข้าร่วมกิจกรรมแทบทุกเดือน (ร้อยละ 49.1) รองลงมาคือการไม่เคยร่วมกิจกรรมเลย (ร้อยละ 27.8) และร่วมกิจกรรมนานๆครั้ง (ร้อยละ 23.1) ตามลำดับ โดยมีบทบาทในชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวีในฐานะสมาชิกมีประมาณร้อยละ 56.5 ที่เป็นแกนนำในชมรมผู้ติดเชื้อมีเพียงร้อยละ 15.7 และไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวีร้อยละ 27.0 (ดังรายละเอียดในตาราง 4.4)

ตาราง 4.4 การมีส่วนร่วมและบทบาทในชมรมของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

| การมีส่วนร่วมและบทบาท<br>ในชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี | จำนวน<br>(n = 108) | ร้อยละ |
|---|--------------------|--------|
| 1.การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรม                   |                    |        |
| -ร่วมกิจกรรมแทบทุกเดือน                           | 53                 | 49.1   |
| -ร่วมกิจกรรมนานๆครั้ง                             | 25                 | 23.1   |
| -ไม่เคยร่วมกิจกรรมเลย                             | 30                 | 27.8   |
| รวม   | 108                | 100.0  |
| 2.บทบาทในชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี                   |                    |        |
| -เป็นแกนนำในชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี                | 17                 | 15.7   |
| -เป็นสมาชิกชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี                 | 61                 | 56.5   |
| -ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี           | 30                 | 27.8   |
| รวม   | 108                | 100.0  |

#### 4.2 การรับรู้ที่เป็นตราบาปของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

##### 4.2.1 การรับรู้ที่เป็นตราบาปด้านความมื่อคติของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

กลุ่มตัวอย่างรับรู้ตราบาปในด้านความมื่อคติของการพบอยู่เป็นประจำในเรื่องการที่คนทั่วไปยังเข้าใจว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีคือคนที่ประพฤติไม่ดีหรือประพฤติผิดศีลธรรมมากที่สุด (ร้อยละ 25.0) รองลงมาคือ รับรู้เรื่องที่เพื่อนบ้านซุบซิบนินทาและมองตามขณะผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์เดินผ่าน (ร้อยละ10.2) การที่ผู้คนรอบข้างมองด้วยสีหน้าแววตาที่ดูหมิ่นเหยียดหยามในขณะที่นั่งรอตรวจที่โรงพยาบาลและการที่ผู้คนรอบข้างมองผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์เหมือนเป็นตัวเชื้อโรค มีจำนวนเท่ากันคือ ร้อยละ 5.6 ในขณะที่ประเด็นการรับรู้ตราบาปด้านความมื่อคติที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ไม่เคยรับรู้หรือรู้สึกเลย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนในครอบครัว ได้แก่ เรื่องการที่คนในครอบครัวไม่ยากใจใช้โทรศัพท์และห้องน้ำร่วมกับผู้ติดเชื้อ (ร้อยละ 94.5 และ ร้อยละ 91.6) รองลงมาคือความรู้สึกอึดอัดและไม่ต้องการอาศัยอยู่ในบ้านที่เกิดจากคนในครอบครัว (ร้อยละ 85.1) การที่คนในครอบครัวแสดงความรังเกียจ และแสดงอาการเบื่อหน่าย



ต่อผู้ติดเชื้อที่มีอาการของโรคเอดส์ (ร้อยละ 81.5) และการที่คนในครอบครัวยังเข้าใจผิดว่าการใช้  
 สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน สามารถติดเชื้อเอชไอวีได้ (ร้อยละ 70.3) สำหรับประเด็น  
 อื่นๆที่ผู้ติดเชื้อไม่เคยรับรู้ได้จากผู้คนที่ทั่วไป ได้แก่ การนั่งรถโดยสารแล้วผู้คนไม่ยกที่นั่งใกล้  
 (ร้อยละ 77.7) การถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง (ร้อยละ 70.3) การบริจาคเลือดทำให้ติดเชื้อเอดส์ได้  
 และการที่เพื่อนเดินผ่านแล้วแกล้งมองไม่เห็นหรือไม่ได้ทักทายมีจำนวนเท่ากันคือร้อยละ 64.8  
 (ดังรายละเอียดในตาราง 4.5)

ตาราง 4.5 การรับรู้ที่เป็นตรรกะทางด้านความมีอคติของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

| การรับรู้ที่เป็นตรรกะเอดส์<br>ด้านความมีอคติ<br>(n = 108)  | ระดับการรับรู้ที่เป็นตรรกะ               |  |   |                                      | Mean | S.D. |
|--|--|--|---|--------------------------------------|------|------|
|  | พบอยู่เป็น<br>ประจำ<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) | พบอยู่<br>บ่อยครั้ง<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) | พบอยู่<br>บางครั้ง<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) | ไม่เคย<br>พบเลย<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) |      |      |
| 1.คนทั่วไปยังเข้าใจว่าผู้ติดเชื้อ<br>เอชไอวีคือคนประพฤติไม่ดี<br>หรือประพฤติผิดศีลธรรม                       | 27<br>(25.0)                             | 24<br>(22.2)                             | 42<br>(38.9)                            | 15<br>(13.9)                         | 2.58 | 1.02 |
| 2.เพื่อนบ้านซุบซิบนินทาขณะ<br>ฉันเดินผ่านเขาเหล่านั้น  | 11<br>(10.2)                             | 24<br>(22.2)                             | 46<br>(42.6)                            | 27<br>(25.0)                         | 2.18 | 0.93 |
| 3.ขณะฉันนั่งรอตรวจที่ม้านั่ง<br>ของโรงพยาบาลผู้คนรอบข้าง<br>มองฉันด้วยสีหน้าแววตา<br>ที่ดูหมิ่นเหยียดหยามฉัน | 6<br>(5.6)                               | 10<br>(9.3)                              | 41<br>(38.0)                            | 51<br>(47.2)                         | 1.73 | 0.85 |
| 4.ผู้คนรอบข้างมองฉันเหมือน<br>เป็นตัวเชื้อโรค  | 6<br>(5.6)                               | 10<br>(9.3)                              | 41<br>(38.0)                            | 51<br>(47.1)                         | 1.71 | 0.76 |
| 5.คนทั่วไปเข้าใจว่าการบริจาค<br>เลือดทำให้ติดเชื้อเอดส์ได้   | 6<br>(5.6)                               | 9<br>(8.3)                               | 23<br>(21.3)                            | 70<br>(64.8)                         | 1.55 | 0.87 |
| 6.เวลาเพื่อนฝูงเดินผ่านมัก<br>แกล้งทำเป็นมองไม่เห็นฉัน   | 4<br>(3.7)                               | 9<br>(8.3)                               | 25<br>(23.2)                            | 70<br>(64.8)                         | 1.51 | 0.80 |

ตาราง 4. 5 (ต่อ)

| การรับรู้ที่เป็นตราบาปเอเดส์<br>ด้านความมีอคติ<br>(n = 108)   | ระดับการรับรู้ที่เป็นตราบาป          |                                      |                                     |                                  | Mean | S.D. |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------|------|
|   | พบอยู่เป็นประจำ<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) | พบอยู่บ่อยครั้ง<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) | พบอยู่บางครั้ง<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) | ไม่เคยพบเลย<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) |      |      |
| 7. คนทั่วไปเข้าใจว่าการถูกเนื้อ<br>ต้องตัวผู้ติดเชื้อเอชไอวี จะทำ<br>ให้ติดโรคเอเดส์ได้                         | 4<br>(3.7)                           | 8<br>(7.4)                           | 49<br>(45.4)                        | 47<br>(43.5)                     | 1.71 | 0.76 |
| 8. เพื่อนฉันเข้าใจว่าดื่มน้ำแก้ว<br>เดียวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะทำ<br>ให้ติดโรคเอเดส์ได้                        | 3<br>(2.8)                           | 11<br>(10.2)                         | 51<br>(47.2)                        | 43<br>(39.8)                     | 1.76 | 0.75 |
| 9. มีญาติพี่น้องบางคน มองฉัน<br>ด้วยหางตา และยิ้มที่มุมปาก  | 3<br>(2.8)                           | 11<br>(10.2)                         | 41<br>(38.0)                        | 53<br>(49.0)                     | 1.67 | 0.77 |
| 10. คนทั่วไปเข้าใจว่ายุ่งกัดผู้ติด<br>เชื้อเอชไอวีแล้วไปกัดคนทั่วไป<br>จะทำให้ติดโรคเอเดส์ได้                   | 3<br>(2.8)                           | 10<br>(9.3)                          | 49<br>(45.4)                        | 46<br>(42.5)                     | 1.72 | 0.75 |
| 11. คนส่วนใหญ่ไม่อยากคุยกับ<br>ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอเดส์<br>นานเพราะกลัวติดเอเดส์จากฉัน                | 3<br>(2.8)                           | 8<br>(7.4)                           | 35<br>(32.4)                        | 62<br>(57.4)                     | 1.56 | 0.75 |
| 12. คนในครอบครัวฉันเข้าใจว่า<br>การใช้สิ่งของเครื่องใช้ เช่น สบู่<br>ยาสีฟันร่วมกับฉันทำให้ติด<br>โรคเอเดส์ด้วย | 3<br>(2.8)                           | 5<br>(4.6)                           | 23<br>(21.3)                        | 77<br>(71.3)                     | 1.39 | 0.71 |
| 13. ผู้คนบางคนเข้าใจว่าร่วมรับ<br>ประทานอาหารร่วมกับผู้ติด<br>เชื้อเอชไอวีจะติดโรคเอเดส์ด้วย                    | 2<br>(1.9)                           | 19<br>(17.6)                         | 50<br>(46.2)                        | 37<br>(34.3)                     | 1.87 | 0.76 |

ตาราง 4.5 (ต่อ)

| การรับรู้ที่เป็นตราบาปเอเดส์<br>ด้านความมื่อคติ<br>(n = 108)                            | ระดับการรับรู้ที่เป็นตราบาป  |  |   |                                      | Mean | S.D. |
|---|--|--|---|--------------------------------------|------|------|
|   | พบอยู่เป็น<br>ประจำ<br>จำนวน<br>(ร้อยละ)                           | พบอยู่<br>บ่อยครั้ง<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) | พบอยู่<br>บางครั้ง<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) | ไม่เคย<br>พบเลย<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) |      |      |
|   | 14.ญาติพี่น้องบางคนแสดงท่าที<br>เอ็นชามีเหมือนไม่มีฉันนั่งอยู่ด้วย | 2<br>(1.9)                               | 12<br>(11.1)                            | 26<br>(24.1)                         |      |      |
| 15.ผู้ป่วยเอเดส์มักถูกทอดทิ้ง<br>ให้อยู่คนเดียวตามลำพัง                                 | 2<br>(1.9)   | 9<br>(8.3)                               | 21<br>(19.4)                            | 76<br>(70.3)                         | 1.42 | 0.73 |
| 16.เพื่อนบ้านไม่ต้องการให้ฉัน<br>ไปหาที่บ้านและต้องการอยู่<br>ห่างๆฉัน                  | 2<br>(1.9)   | 8<br>(7.4)                               | 43<br>(39.8)                            | 55<br>(50.9)                         | 1.60 | 0.71 |
| 17. ขณะที่ฉันโดยสารรถประจำ<br>ผู้คนไม่ยอมนั่งใกล้ฉัน                                    | 2<br>(1.9)   | 4<br>(3.7)                               | 18<br>(16.7)                            | 84<br>(77.7)                         | 1.30 | 0.63 |
| 18. หลังจากคนในครอบครัวรู้ว่า<br>ฉันติดเอเดส์ทำให้ฉันรู้สึกอึดอัด<br>และไม่อยากอยู่บ้าน | 2<br>(1.9)   | 3<br>(2.8)                               | 11<br>(10.2)                            | 62<br>(85.1)                         | 1.21 | 0.58 |
| 19.คนในครอบครัวฉันบางคน<br>รังเกียจ แสดงความเบื่อหน่าย<br>ที่ฉันมีอาการของโรคเอเดส์     | 1<br>(0.9)   | 6<br>(5.6)                               | 13<br>(12.0)                            | 88<br>(81.5)                         | 1.26 | 0.60 |
| 20. เพื่อนฝูงไม่ต้องการข้องแวะ<br>พูดคุยกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี                           | 1<br>(0.9)   | 5<br>(4.6)                               | 40<br>(37.1)                            | 62<br>(57.4)                         | 1.49 | 0.63 |
| 21. คนในครอบครัวไม่อยากจะ<br>ห้องน้ำร่วมกับฉัน  | 1<br>(0.9)   | 2<br>(1.9)                               | 6<br>(5.6)                              | 99<br>(91.6)                         | 1.12 | 0.45 |
| 22. คนในครอบครัวไม่อยากจะ<br>โทรศัพท์ร่วมกับฉัน   | 1<br>(0.9)   | 0<br>(0.0)                               | 5<br>(4.6)                              | 102<br>(94.5)                        | 1.07 | 0.35 |

ผลจากการสัมภาษณ์ตามแนวโครงสร้างคำถามปลายเปิดในเรื่องการรับรู้ที่เป็นตราบาปกับกลุ่มตัวอย่างบางคนพบว่า ในความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้าน โรคเอดส์เป็นปัญหาทางกายภาพ สืบเนื่องมาจากผลของการรณรงค์ปัญหาเอดส์ของภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในช่วงทศวรรษ 2530 โดยเฉพาะในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2537 มีการรณรงค์ว่า “เอดส์เป็นโรคร้าย รักษาไม่หาย ตายสถานเดียว” เอดส์เป็นโรคติดต่อที่มีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ดังนั้น “เอดส์” จึงถูกมองว่าเป็นผู้ป่วย โดยไม่มีการจำแนกแยกแยะว่าอยู่ในระดับใด เป็นเพียงผู้ที่ตรวจพบแอนติบอดีของเชื้อเอชไอวีในร่างกายแต่ยังไม่มีอาการทางร่างกายหรือมีอาการติดเชื้อเฉียบพลัน มีไข้เรื้อรัง ปวดศีรษะ อ่อนเพลียต่อมน้ำเหลืองโตแต่ยังสามารถมีกิจวัตรประจำวันได้เช่นคนปกติ หรือมีอาการติดเชื้อฉวยโอกาส เป็นต้นว่า เชื้อราที่ระบบสมองและไขสันหลังหรือชนิดแพร่กระจายทั่วตัว ทุ่งวัด วัณโรค มะเร็งหลอดเลือดและผิวหนังที่ต้องนอนป่วยลุกไม่ไหว อาจกล่าวได้ว่า ภาพของเอดส์ในการรณรงค์โดยผ่านสื่อในช่วงแรกเป็นภาพลักษณ์ที่ฝังใจของคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้

นอกจากนั้นผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ได้สะท้อนให้ทราบว่า มีความหลากหลายของประเด็นเนื้อหาในความรู้สึกของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่รับจากคนรอบข้างที่แสดงถึงความรังเกียจ ความแบ่งแยกกีดกัน การถูกปฏิเสธไม่ให้ร่วมกิจกรรมของชุมชน และความไม่เข้าใจในตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ที่ผู้ศึกษาได้จำแนกแยกแยะเป็นหมวดหมู่ของปรากฏการณ์ตราบาป ที่ผู้ติดเชื้อได้รับรู้จากคนรอบข้างและผู้ติดเชื้อรู้สึกอย่างไรต่อการรับรู้ที่เป็นตราบาปนั้น ในแต่ละบริบทของสถานการณ์แต่ละสังคม โดยมีการจำแนกของแบบแผนของการรับรู้ที่เป็นตราบาปออกเป็นรายด้าน ในระดับปัจเจกบุคคลของผู้ติดเชื้อ จากเพศและปัจจัยแวดล้อมที่เสริมให้มีการรับรู้ที่เป็นตราบาปในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะนำเสนอโดยการพรรณนาให้เห็นสภาพของเหตุการณ์ ในทัศนะของบุคคลผู้ให้ข้อมูล

#### 4.2.2 เหตุการณ์ของการรับรู้ที่เป็นตราบาปด้านความมีอคติของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ดังรายละเอียดนี้

##### 4.2.2.1 กลุ่มที่ได้รับความมีอคติจากคนในครอบครัวและญาติพี่น้อง (n = 9)

##### 1) กลุ่มที่มีระยะเวลาของการติดเชื้อนานกว่า 7 ปีขึ้นไป (n = 6)

คนในกลุ่มนี้ได้แก่หญิงหม้ายหรือ หย่า แยกกับสามี หญิงหม้ายที่มีสามีใหม่ หรือเป็นผู้ที่มีระยะเวลาของการติดเชื้อมานานกว่า 7 ปี กล่าวคือ การที่มีระยะเวลาของการติดเชื้อที่นาน จะเคยมีอาการป่วยด้วยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้ง หลังจากทำการรักษาตามอาการหรือได้รับยาต้านไวรัสเอดส์แล้วมีอาการดีขึ้น หรือหญิงที่เคยเป็นหม้ายสามีตายแล้วปัจจุบัน

อยู่กับสามีใหม่ จะได้รับความสงสารเห็นอกเห็นใจจากคนในครอบครัวและญาติพี่น้องน้อยกว่าหญิงหม้ายที่ไม่มีสามีใหม่ ทำให้เกิดภาพเปรียบเทียบในความรู้สึกของคนในครอบครัวและญาติพี่น้อง หรือเป็นผู้ที่ไม่ประพฤติตนเป็นคนดีตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ การรับรู้ที่เคยพบมักเป็นในเรื่องคนในครอบครัวแสดงความรังเกียจโดยการไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วม เช่น สบู่ ยาสีฟัน สบู่ ไม่อยากใช้ห้องน้ำร่วมขณะผู้ติดเชื่อมีอาการเจ็บป่วย ในเรื่องการถูกกีดกันจากคนในครอบครัวไม่ให้ผู้ติดเชื่อไปร่วมงานของชุมชน เช่น งานศพ งานทำบุญบ้าน เนื่องมาจากภาพลักษณ์ทางร่างกายภายนอกที่ปรากฏต่อสายตาผู้พบเห็นซุบซอมและไม่น่าดู ในเรื่องคนในครอบครัวบางคนแสดงท่าทีรำคาญที่ผู้ติดเชื่อมีอาการของโรคเอดส์เนื่องจากเจ็บป่วยต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆ ดังคำบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างมีรายละเอียดดังนี้

"..บางที่มีคนเอาบัตรมาเชิญเราไปงานบ้านใหม่ พี่สาวว่าหือ..บต้องไปอายุเป็น...งานศพก็บต้องไป..อายุเขา..เขาจะมองหน้าเอานา..พี่สาวจริงๆว่าให้..เราน้อยใจมาก.."

(หญิงหม้ายที่มีสามีใหม่ อายุ 40 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าคุณเองติดเชื่อมานาน 8 ปี 6 เดือน)

"..น้องสาวอยู่บ้านหลังเดียวกัน..สบู่ ยาสีฟันเขาก็แยกใช้ต่างหาก...เวลามานอนรพ.ไม่มีใครมาเฝ้า พี่สาวว่าหือ..ตัวเก่าบใช้वानอนแท็บ..ไปไหนได้อยู่..รู้สึกน้อยใจ.."

(หญิงหม้ายที่มีสามีใหม่ อายุ 30 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าคุณเองติดเชื่อมานาน 10 ปี 6 เดือน)

"..พี่ชายถามว่า..วันนี้ไผจะกิน..ถ้าเป็นข้าเจ้ายะเป็นจะบกิน..สบู่ยาสีฟันในบ้านเป็นก็แยกใช้..ห้องน้ำเขาก็สร้างขึ้นอีกห้องหนึ่งหือเราใช้คนเดียว..สั่งห้ามบหือเขาไปตัดผมสระผมที่ร้าน..หือยะเอง..กลัวเป็นจะหือ.."

(หญิงหม้าย อายุ 38 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าคุณเองติดเชื่อมานาน 7 ปี)

"..เวลาเขาเป็นไข้บสบาย..คนในบ้านก็หาเอาไก่หูกแต่งเอา..เป็นบ่าหือเรา

(หญิงคู่ อายุ 29 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าคุณเองติดเชื่อมานาน 11 ปี)

"..เขาบสบายบ้อย..เดี๋ยวกก็เข้า..ก็ออกโงงยา...มีบางเตื่อแม่เป็นก็เดื่อด..แสดงท่าทีรำคาญเขา..ว่าหือเขา..เป็นนิดเป็นหน้อยก็อดเอาก่า..ตะก่อนเฮาก้อหลีกฟอง..อะหยังที่บตีเอาทุกอย่างบว่าเป็นยาบ้ายาหือ..เอาหมัด.."

(หญิงที่หย่ากับสามี อายุ 28 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าคุณเองติดเชื่อมานาน 12 ปี)

2) กลุ่มหญิงที่เคยเกี่ยวข้องกับบริการเพศพาณิชย์ (n = 3) กลุ่มนี้เป็นผู้หญิงที่มีสามีแล้วขณะที่คนในครอบครัวและญาติพี่น้องเพิ่งรับรู้ที่ตนเองติดเชื้อเอชไอวีไม่เกิน 6 เดือน ผู้ติดเชื้อมีอาการทางกายชัดเจนและอยู่ในแวดวงครอบครัวและญาติพี่น้องไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเรื่องเอดส์ พวกเขาที่ยึดติดกับภาพที่นำกลัวว่า “เอดส์เป็นแล้วรักษาไม่หาย ตายลูกเดียว” ประกอบกับผู้ติดเชื้อเองเคยประพฤติไม่ดี เป็นคนไม่ดีในสายตาของคนในครอบครัว เป็นผู้ที่ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีสามีมากกว่าหนึ่งคน เคยประกอบอาชีพพิเศษขายบริการทางเพศ แม้ว่าคนรอบข้างในชุมชนเพื่อนบ้านจะมาเยี่ยมเยื่อนเมื่อผู้ติดเชื้อมีอาการเจ็บป่วยก็ตาม พบบุคคลเหล่านี้คล้อยหลังลับตาไปก็ยิ่งแสดงความรังเกียจและความไม่เข้าใจต่อผู้ติดเชื้ออยู่ การรับรู้ที่เคยพบมักเป็นในเรื่องคนในครอบครัวเข้าใจว่ารับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อจะทำให้ติดโรคเอดส์ด้วย และรังเกียจที่จะใช้ห้องน้ำร่วมกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งพวกเขาที่มีความทุกข์ใจ เจ็บปวดและน้อยใจปะปนกัน ที่สังเกตได้จากการสนทนาจะมีเสียงสั่นเครือและน้ำคลอเบ้าตาทั้งสองข้างสลับในบางจังหวะของการสนทนา ดังรายละเอียดตามคำบอกเล่าดังนี้

“..แม่เป็นบ่เข้าใจ..คิดว่ากินข้าวกับเฮาจะติดเชื้อตวย..แม่จะทิ้งหื้อกินข้าวคนเดียว..แยกถ้วยจาน..เวลาจะกินก็บ่าหื้อชวย..พอแม่เป็นรังเกียจป้าและญาติพี่น้องก็รังเกียจตวย..บาเดียวเจ้าก็อยู่กับแฟนใหม่..”

(หญิงคู่ อายุ 23 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าคุณติดเชื้อมานาน 6 เดือน )

“..ตอนแรกแม่อุ้ยของสามีรู้ว่าเฮาเป็น(เอดส์)..เมื่อใหม่ๆพอเฮาเข้าห้องน้ำเสร็จแม่อุ้ยก็ดื่มน้ำฮ้อน ลวก ..เป็นบ่เข้าใจคิดว่ามันติดกันง่ายๆ..จนแฟนเฮาอธิบายหื้อเป็นฟังว่ามันเปลื้องหลวเปลื้องแกล บ่ต้องยะ..เป็นถึงฟัง..”

(หญิงคู่ อายุ 30 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าคุณติดเชื้อมานาน 6 เดือน )

#### 4.2.2.2 กลุ่มที่ได้รับความมื่อคติจากเพื่อนบ้านและชุมชน (n = 12)

##### 1) กลุ่มหญิงที่สามีเคยมีอาการเจ็บป่วยทางร่างกาย (n = 5)

แม้ว่ากลุ่มหญิงเหล่านี้จะไม่มีอาการทางร่างกายก็ตาม เนื่องด้วยความหมายเอดส์ในทัศนะของชาวบ้าน เกิดจาก การมีเพศสัมพันธ์ แม้จะไม่มีอาการก็ตาม แต่ต้องมีความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับเอดส์ของประชาชน ในปัจจัยของสังคมวัฒนธรรม ในเรื่องของระบบคิด ความเชื่อ มองว่าเป็นโรค

ของความสับสนทางเพศ ให้ภาพของเรื่องเพศเป็นเรื่องต่ำ สกปรก หยาบคาย น่าอับอาย ประกอบกับกรรที่ให้เห็นสภาพของสามีที่เป็นผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายมีลักษณะน่าเกลียดน่ากลัว ทำให้เกิดภาพเชื่อมโยงถึงผู้เป็นภรรยา ความรู้สึกฝังใจว่าผู้ป่วยเอดส์เป็นแหล่งแพร่เชื้อ ทำให้เกิดความกลัวและรังเกียจผู้ติดเชื้อ จากคำบอกเล่าการรับรู้ที่เคยพบมักเป็นในเรื่องการที่คนทั่วไปยังเข้าใจว่าผู้ติดเชื้อคือคนประพฤติน่าเกลียดหรือประพฤติน่าเกลียด เรื่องที่เพื่อนบ้านพากันซุบซิบนินทา ผู้ติดเชื้อเดินไปทางไหนผู้คนก็มองตาม แม้ผู้ติดเชื้อเดินเข้าไปใกล้ผู้คนก็จะหลุนหนีไป พอเดินผ่านก็ซุบซิบนินทากันลับหลัง มากไปกว่านั้นบางคนเจอผู้คนแสดงอาการรังเกียจอย่างออกนอกหน้า โดยมีการจับจ้อง มองผู้ติดเชื้ออย่างถี่ถ้วนเพื่อสำรวจหาความผิดปกติทางกายภาพว่าเข้าได้กับอาการของเอดส์รึยัง บางคนก็ถูกระทบโดยตรงด้วยคำถาม ในเรื่องที่คนรอบข้างมองผู้ติดเชื้อเหมือนเป็นตัวเชื้อโรคจนถึงเรื่องที่เพื่อนฝูงไม่ต้องการข้องแวะพูดคุยด้วย ดังคำบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างมีรายละเอียดดังนี้

“..ส่วนใหญ่เพื่อนบ้านจะรังเกียจซุบซิบนินทา..ต่อหน้าจะบ่นว่าหยิง..แต่จะใช้สายตามอง..แม่อยู่มาเล่าที่อึ้งฟังกำลุนว่าเขาว่าหื้อ..มันบ่าลั้งเป็นเหยิก้า มันหยิงมาผอมล้าเหลือ..”  
(หญิงหม้าย อายุ 28 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าจะตนเองติดเชื้อมานาน 2 ปี 6 เดือน )

“..ชาวบ้านเขาว่าหื้อ..เขาเล่าหัวเฮาว่า..ไปทำบตีบดักมาจึงเป็นเอดส์ เดียวไปตางใด..เป็นก็ผ่อด้วยหางตา..ตะก่อนมีเพื่อนน้กบ่าเดียวบ่ค่อยมีแล้ว..”  
(หญิงหม้าย อายุ 38 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าจะตนเองติดเชื้อมานาน 5 ปี )

“..เวลาที่เรทำอะหยิงในหมู่บ้านที่มีงานทุกอย่าง.. มีความรู้สึกว่ทุกคนบ่อยากให้เราช่วย.. เวลาเรทำอะหยิง ทุกคนที่รู้ว่เราเป็นเอดส์เขามักจะมองเราเป็นตาเดียวกันหมดเลย..รู้สึกน้อยใจมาก..”  
(หญิงคู่ อายุ 29 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าจะตนเองติดเชื้อมานาน 11 ปี)

“... จาวบ้านใกล้เฮือนเคียง.. อู้ว่า.. โรคอันนี้เป็นโรคสังคมรังเกียจ เป็นซี่จ๊ะ.. เพราะว่เวลาออกตุ่มหน้าลี้ก ผิวดำคัลล้ารักษาบ่หาย..เพื่อนบ้างบางคนยังซ้ำเติมว่เป็นโรคร้าย บ่อายเป็นกา บ่อายบีน้องกา ซ้ำแจ้ก็ตอบบีนว่ ไปอายเป็นหยิง บิใจเฮาเขาเขาหาหามาหลอ.. ลูกผัวเอามาติด เวลาไปรับจ้างปลุกข้าว เกียวข้าว..เป็นก็เอ็นบอกระวัง..จะไปหื้อ..หอยบาดตีนบาดมือเน้อ..”  
(หญิงหม้าย อายุ 32 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าจะตนเองติดเชื้อมานาน 5 ปี 7 เดือน )

2) กลุ่มผู้ที่เคยมีอาการของโรคเอดส์ทางด้านร่างกาย ( $n = 7$ ) ผู้ที่เคยมีอาการป่วยด้วยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้ง จากคำบอกเล่าการรับรู้ที่เคยพบมักเป็นในเรื่องการที่ถูกเพื่อนบ้านซุบซิบนินทาขณะเดินผ่าน มีการสะกิดก้นมองและซุบซิบนินทาขณะที่เดินไปตลาด หรือขณะรอรถโดยสารเพื่อมาตรวจรักษาร่างกายที่โรงพยาบาลมีการพูดคุยถึงอาการทางร่างกายของผู้ติดเชื้อลับหลัง หรือการจ้องมองอย่างตรงไปตรงมาแบบออกนอกหน้าหรือถามไถ่ถึงอาการที่แสดงออกทางร่างกายที่ชี้ชัดถึงสถานะของความเป็นผู้ป่วยเอดส์ เช่น ซุบผอม ผิดคำคล้ำ หรือออกตุ่ม ซักไซ้ถึงเหตุผลที่ผู้ติดเชื้อไม่ให้ลูกดูคนมมารดา ในเรื่องที่คนบางคนเข้าใจว่าร่วมรับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อจะติดเชื้อเอดส์ด้วย ในเรื่องที่เพื่อนเข้าใจว่าดื่มน้ำแก้วเดียวกันจะทำให้ติดเชื้อด้วย ในเรื่องที่เพื่อนบ้านไม่ต้องการให้ไปหาที่บ้านต้องการอยู่ห่างๆ คนรอบข้างยังมีความไม่เข้าใจของการติดต่อว่าโดยแท้จริงแล้วมิได้ติดต่อกันง่ายๆ การที่สั่งห้ามลูกหลานที่เป็นเด็กไม่ให้มาเล่นด้วย ไม่ให้ร่วมรับประทานน้ำแก้วเดียวกับลูกของผู้ติดเชื้อ ความไม่เข้าใจในเรื่องเอดส์จากบุคคลรอบข้างที่ผู้ติดเชื้อรับรู้ได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยจากคนในเพื่อนบ้านและชุมชน ดังคำบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างว่า

“...เราสังเกตในหมู่ที่เป็นเพื่อนบ้านกัน เขาเหินห่างไป แต่ก่อนเวลาไปไหนเป็นก็ชวนนั่งรถไปด้วย.. ตอนนี้เป็นป่าชวน เขามีละอ่อนก็บ่าอยากให้เราอุ้ม... ตั้งแต่เราออกตุ่ม ทั้ทั้งที่เป็นตุ่มแห้ง เริ่มเป็นแบบนี้ตั้งแต่เรารับว่าติดเชื้อและมาเข้ากลุ่ม...”

(หญิงหม้าย อายุ 36 ปี ทราบว่าตนเองติดเชื้อมานาน 16 เดือน)

“..เขามองดูตุ่มเรา..เขาก็ไปซุบซิบกันว่า เนี่ยะ..สงสัยจะเป็นเอดส์..พอคลอดลูกแล้วหนูไม่ให้ลูกกินนมอ้างว่าไม่มีน้ำนม..ก็ถูกถามจากชาวบ้านว่า..ตัวเองก็ตัวใหญ่ทำไมไม่มีน้ำนม..”

(หญิงคู่ อายุ 31 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าตนเองติดเชื้อมานาน 1 ปี 5 เดือน)

“..คนบ้านติดกัน..ตั้งแต่แฟนเขาตาย..เขาสั่งหลานน้อยเขาบ่หื้อมาแ่อวมาकिनของบ้านเฮา.. เราารู้สึกน้อยใจจริงๆ..”

(หญิงหม้าย อายุ 38 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าตนเองติดเชื้อมานาน 4 ปี)

#### 4.2.2.3 ความมีอคติที่มีต่อตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ( $n=11$ )

1) กลุ่มผู้ที่ไม่มีอาการของโรคเอดส์ ( $n = 5$ ) กลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่ไม่มีอาการของโรคเอดส์ จะมีการระมัดระวังตัวเองในการดำรงกิจวัตรประจำวัน ในการรับประทาน



อาหารก็จะใช้ช้อนกลาง มีการแยกภาชนะด้วยตนเองในการรับประทานอาหารร่วมวงกับคนในครอบครัว หากไปบ้านเพื่อนหรือบุคคลอื่นก็จะไม่ยอมดื่มน้ำร่วมด้วย ไม่ชอบสูงลิงกับใคร เวลาไปไหนมาไหนก็เข้าใจว่าผู้คนรอบข้างซุบซิบนินทา หรือจ้องมองจับผิด กลุ่มนี้ไม่เปิดเผยตัวอย่างเต็มที่ ชมรมผู้ติดเชื้อก็ไม่สมัครเป็นสมาชิก หรือขณะที่มีฐานะเป็นสมาชิกชมรม ก็จะมาร่วมบ้างในบางครั้ง จะระมัดระวังตัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชน เพราะมีการรับรู้ว่าเป็นโรคนี้คือคนที่เกี่ยวข้องกับเพศพาณิชย์ หรือประพฤติด้านทางเพศ ตนเองเป็นที่น่ารังเกียจแก่คนรอบข้าง แม้ว่าตนเองจะไม่มีอาการทางร่างกายก็ตาม ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ได้สะท้อนให้ทราบถึงความรังเกียจและความไม่เข้าใจ รวมทั้งความรู้สึกที่ตนเองพยายามกีดกันตัวเองออกจากสังคม ในการวัดความรู้สึกที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ดังตัวอย่างดังนี้

“..เราจะไม่สูงลิงกับใคร..ไม่เปิดเผยให้ใครทราบเพราะโรคนี้มักเป็นกับคนที่ไปหาเงินมาหรือไปล่าส่วนมา..แต่ชาวบ้านเขาจะสงสัยเราอยู่มั่ง..เราก็ไม่ยุ่งกับใคร.. เราก็อยู่กับสองคนผัวเมีย..”  
(หญิงคู่ อายุ 22 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าเป็นโรคติดเชื้อมานาน 6 ปี 7 เดือน)

“..จะคอยระวังตัวเอง ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น แก้วน้ำที่กินเสร็จแล้วจะไม่ตั้งไว้จะรีบเอาไปล้าง กินข้าวกับพ่อแม่และลูกจะใช้ช้อนกลาง เพื่อคนอื่นจะได้รังเกียจเรา..”  
(หญิงหม้าย อายุ 32 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าเป็นโรคติดเชื้อมานาน 4 ปี)

“..เวลาเราเดินไปไหน เขาก็จะมองตามเรา..”  
(ชายโสด อายุ 36 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าเป็นโรคติดเชื้อมานาน 4 ปี 6 เดือน)

“..ไม่ชอบสูงลิงกับใคร..ชมรมก็ไม่มาร่วม เพราะร่างกายเราแข็งแรงอยู่ ฟันช่องก็ไม่รู้ เราก็รักษาตัวเองไป ซึ่อย่าดื่มกินครั้งละ 50บาท 100บาทแล้วแต่ครั้ง..”  
(ชายคู่ อายุ 35 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าเป็นโรคติดเชื้อมานาน 1 ปี 4 เดือน)

2) กลุ่มผู้ที่เคยมีอาการหรือกำลังอยู่ในระยะปรากฏอาการ ( $n = 6$ ) เป็นผู้ที่เคยมีอาการหรือขณะนี้มีอาการที่สัมพันธ์กับเอดส์ กลุ่มนี้จะมีการระมัดระวังตัวในการดำรงกิจวัตรประจำวันและการร่วมกิจกรรมของกลุ่ม ในการพบกลุ่มที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ และสังคมแก่ผู้ติดเชื้อของโรงพยาบาล จากการสังเกตในกลุ่มนี้ผู้ติดเชื้อจะมองข้ามมองขวาเหลียวมองดูจนแน่ใจว่าไม่มีคนที่รู้จัก จึงเดินขึ้นมาที่ศูนย์ดังกล่าว มีการปิดบังไม่ให้ผู้อื่นเห็นสภาพ

ร่างกายของตัวเองโดยสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว สวมแว่นตาอำพรางการประสานสายตากับคนรอบข้าง ไม่ต้องการให้คนที่รู้จักมาพบเจอตนขณะที่มีอาการเจ็บป่วยทางกายเป็นความรู้สึกที่รับรู้ด้วยตนเองว่าตนเป็นที่น่ารังเกียจของคนรอบข้างที่จะร่วมรับประทานอาหารหรือพบปะพูดคุยด้วย ดังตัวอย่างตามคำบอกเล่านี้

"..เพื่อนฝูงที่เรียนมหาวิทยาลัยด้วยกัน..โทรศัพท์มาถามถึงเหตุไม่ไปเรียนต่อ..จะมาเที่ยวตอนหน้าหนาวหรือช่วงวันหยุดเทศกาล..จะบอกปิดไปว่าเราไม่อยู่บ้านช่วงนั้น..ไม่ยอมให้เขาเห็นเราในสภาพเช่นนี้..."

(หญิงโสด อายุ 23 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าคุณเองติดเชื้อมานาน 3 ปี 4 เดือน)

"... เขาเรียกเราไปจัดดอกไม้ เราจะแยกกินข้าวเอง กลัวเขาว่าให้ ส่วนมากคนแถวบ้านจะไม่รู้หรอก..เราจะใส่เสื้อแขนยาวจะบ่าปิดให้เขาผ่อ.."

(ชายโสด อายุ 33 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าคุณเองติดเชื้อมานาน 5 เดือน)

"..ส่วนใหญ่เราจะไม่ไปหาใคร โดยเฉพาะตอนนี้ เราผอม ใสและเหนื่อยแบบนี้ คนที่รู้จักไม่ยอมให้เขาเห็นเราในสภาพแบบนี้ เราจะไปไหน กาดก็ไป งานในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะป็นงานวัด งานศพ งานอะหยังเราก็ไป กลัวเขารังเกียจ... "

(หญิงคู่ อายุ 40 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าคุณเองติดเชื้อมานาน 4 ปี 6 เดือน)

"..งานวัดที่ผ่านมาเป็นจิ้นเป็นปล่า..เฮาจะบ่หุบบก้า.."

(หญิงคู่ อายุ 40 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าคุณเองติดเชื้อมานาน 2 ปี เดือน)

#### 4.2.3 การรับรู้ที่เป็นตราบาปด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ ผู้ป่วยเอดส์

กลุ่มตัวอย่างรับรู้ตราบาปในด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยรับรู้สาเหตุการณที่เกิดขึ้นเป็นประจำและบ่อยครั้งมากที่สุดในเรื่องการที่เพื่อนบ้านไม่ยอมให้ช่วยทำงานเกี่ยวกับการเตรียมอาหารในงานต่างๆของหมู่บ้าน โดยจัดแจงให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ เลี่ยงไปทำหน้าที่อื่นแทน เช่น ล้างจาน (ร้อยละ 10.2 และ ร้อยละ 32.4) นอกจากนั้นพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งรองลงมาคือถูกรุกกีดกันไม่ให้เล่นหยอกล้อกับเด็กๆไม่ให้อุ้มเด็กที่เป็นลูกหลาน (ร้อยละ 15.7) ร้านตัดผมหรือร้านเสริมสวยปฏิเสธหรือไม่เต็มใจให้บริการ (ร้อยละ 11.1) เมื่อไป

เลือกซื้ออาหารในหมู่บ้านถูกคนขายอาหารแสดงท่าที่รังเกียจ (ร้อยละ 10.2) การถูกกีดกันไม่ให้ไปร่วมงานแต่งงาน งานบุญต่างๆของคนในหมู่บ้าน (ร้อยละ 7.4) ในขณะที่ประเด็นการรับรู้ทราบปาด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ไม่เคยพบเจอเลย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และคนในครอบครัว ได้แก่ ขณะที่แพทย์ทำการตรวจร่างกายหกลีงที่จจะตเตดตองตั่ว และบุคลากรทางการแพทย์เลือกปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (ร้อยละ 91.7 และ ร้อยละ 88.9) รองลงมาคือ การกีดกันและไม่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวที่เกิดจากคนในครอบครัวทอดทิ้ง และไม่เต็มใจที่จะร่วมรับประทานอาหารด้วย (ร้อยละ 88.9) และการที่คนในครอบครัวไม่ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ขณะเจ็บป่วย (ร้อยละ 84.2) สำหรับประเด็นอื่นๆที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ไม่เคยพบเจอเลยจากบุคคลทั่วไป ได้แก่ การที่โดยสารรถประจำทางถูกผู้โดยสารอื่นไม่ให้นั่งร่วมเบาะ (ร้อยละ 82.4) การที่ถูกกีดกันไม่ให้ใช้ห้องน้ำสาธารณะ และเพื่อนไม่โทรศัพท์ติดต่อหรือแวะมาพูดคุยด้วย (ร้อยละ 77.7) (ดังรายละเอียดในตาราง 4.6)

ตาราง 4.6 การรับรู้ที่เป็นตราบาปด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

| การรับรู้ที่เป็นตราบาปเอดส์<br>ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม<br>(n=108)  | ระดับการรับรู้ที่เป็นตราบาป |                   |                   |                   | Mean | S.D. |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|
|   | พบอยู่เป็นประจำ             | พบอยู่บ่อยครั้ง   | พบอยู่บางครั้ง    | ไม่เคยพบเลย       |      |      |
|   | จำนวน<br>(ร้อยละ)           | จำนวน<br>(ร้อยละ) | จำนวน<br>(ร้อยละ) | จำนวน<br>(ร้อยละ) |      |      |
| 1. เพื่อนบ้านไม่ยอมให้ฉันช่วยทำงานเกี่ยวกับ เตรียมอาหารในงานต่างๆของหมู่บ้าน โดยจัดแจงให้ตัวฉันเลี้ยงไปทำหน้าที่อื่นแทนเช่น ล้างจาน | 11<br>(10.2)                | 35<br>(32.4)      | 33<br>(30.6)      | 29<br>(26.8)      | 2.26 | 0.97 |
| 2. ฉันถูกกีดกันไม่ให้เล่นหยอกล้อกับเด็กๆไม่ให้อุ้มเด็กที่เป็นลูกหลาน  | 2<br>(1.9)                  | 17<br>(15.7)      | 36<br>(33.3)      | 53<br>(49.1)      | 1.70 | 0.80 |
| 3. ร้านตัดผมหรือร้านเสริมสวยไม่ให้บริการฉัน/หรือไม่เต็มใจที่จะให้บริการแก่ฉัน   | 1<br>(0.9)                  | 12<br>(11.1)      | 34<br>(31.5)      | 61<br>(56.5)      | 1.56 | 0.73 |
| 4. คนขายอาหาร(ปรุงรส)ในหมู่บ้านแสดงท่าทีรังเกียจเมื่อฉันไปเลือกซื้อจัดอาหาร เช่นคนอื่น  | 1<br>(0.9)                  | 11<br>(10.2)      | 41<br>(38.0)      | 55<br>(50.9)      | 1.61 | 0.71 |
| 5. ฉันถูกกีดกันไม่ให้ไปร่วมงานแต่งงานหรืองานบุญต่างๆของคนในหมู่บ้าน   | 1<br>(0.9)                  | 8<br>(7.4)        | 33<br>(30.6)      | 66<br>(61.1)      | 1.48 | 0.68 |
| 6. เพื่อนไม่โทรศัพท์ติดต่อฉัน ไม่มาแวะพูดคุยกับฉันเช่นเคย   | 1<br>(0.9)                  | 5<br>(4.6)        | 18<br>(16.7)      | 84<br>(77.7)      | 1.29 | 0.60 |
| 7. คนในครอบครัวไม่เต็มใจที่จะรับประทานอาหารร่วมกับฉัน   | 1<br>(0.9)                  | 2<br>(1.9)        | 9<br>(8.3)        | 96<br>(88.9)      | 1.15 | 0.47 |

ตาราง 4.6 (ต่อ)

| การรับรู้ที่เป็นตราบาปเอดส์<br>ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม<br>(n=108)                        | ระดับการรับรู้ที่เป็นตราบาป |            |              |              | Mean | S.D. |
|---|-----------------------------|------------|--------------|--------------|------|------|
|   | พบอยู่เป็น                  | พบอยู่     | พบอยู่       | ไม่เคย       |      |      |
|   | ประจำ                       | บ่อยครั้ง  | บางครั้ง     | พบเลย        |      |      |
|   | จำนวน                       | จำนวน      | จำนวน        | จำนวน        |      |      |
| (ร้อยละ)  | (ร้อยละ)                    | (ร้อยละ)   | (ร้อยละ)     |              |      |      |
| 8.ฉันถูกผู้โดยสารคนอื่นปฏิเสธ<br>ไม่ให้นั่งร่วมเบาะติดกัน ขณะ<br>โดยสารรถประจำทาง             | 0<br>(0.0)                  | 7<br>(6.5) | 12<br>(11.1) | 89<br>(82.4) | 1.24 | 0.56 |
| 9. ฉันถูกกีดกันไม่ให้ใช้ห้องน้ำ<br>สาธารณะร่วมกับผู้อื่น                                      | 0<br>(0.0)                  | 6<br>(5.6) | 18<br>(16.7) | 84<br>(77.7) | 1.2  | 0.56 |
| 10. คนในครอบครัวไม่ดูแลเอา<br>ใจใส่ฉันตั้งแต่ฉันเริ่มป่วย                                     | 0<br>(0.0)                  | 6<br>(5.6) | 11<br>(10.2) | 91<br>(84.2) | 1.21 | 0.53 |
| 11.ฉันถูกเพื่อนบ้านกีดกัน แยก<br>จานชามช้อนและให้รับประทาน<br>เพียงลำพัง                      | 0<br>(0.0)                  | 4<br>(3.7) | 41<br>(38.0) | 63<br>(58.3) | 1.45 | 0.57 |
| 12. คนในครอบครัวทอดทิ้งฉัน<br>เมื่อฉันบอกว่าฉันติดเชื้อเอชไอวี                                | 0<br>(0.0)                  | 4<br>(3.7) | 8<br>(7.4)   | 96<br>(88.9) | 1.15 | 0.45 |
| 13.แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่<br>ของรพ.คนอื่น ๆ ปฏิบัติต่อตัว<br>ฉันแตกต่างไปจากผู้ป่วยทั่วไป | 0<br>(0.0)                  | 0<br>(0.0) | 12<br>(11.1) | 96<br>(88.9) | 1.11 | 0.32 |
| 14. ขณะที่แพทย์ ตรวจร่างกาย<br>ฉันหลีกเลี่ยงที่จะแตะต้องตัวฉัน                                | 0<br>(0.0)                  | 0<br>(0.0) | 9<br>(8.3)   | 99<br>(91.7) | 1.08 | 0.28 |

#### 4.2.4. เหตุการณ์ที่เป็นตราบาปด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้ติดเชื้อ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

จากการสัมภาษณ์ด้วยคำถามปลายเปิดพบว่า มีกลุ่มที่รับรู้ว่าคุณเองถูกปฏิเสธ  
และแบ่งแยก กีดกันในการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับในกิจกรรมต่างๆกับคนในครอบครัว  
เพื่อนบ้านในชุมชนแต่ไม่พบว่าถูกปฏิเสธแบ่งแยกจากบุคลากรทางการแพทย์ ดังได้สะท้อนให้

ทราบถึงการที่เขาเหล่านั้นพยายามกดดันผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ออกจากสังคม ในการวัดความรู้สึกที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ได้รับ

4.2.4.1 กลุ่มที่ได้รับทราบจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับคนในครอบครัว ( $n = 3$ ) กลุ่มผู้หญิงที่ด้อยอำนาจ กล่าวคือ หญิงมีฐานะยากจน ไม่มีอาชีพที่มั่นคง เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คนในครอบครัวไม่ฟังความคิดเห็น มีอาการแสดงออกทางร่างกายที่ชี้ชัดถึงสถานะของความเป็นผู้ป่วยเอดส์ เช่น ซบผอม ผิวดำคล้ำ หรือออกตุ่ม เคยมีอาการป่วยด้วยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้ง คนในครอบครัวโกรธ ระวังหวาดกลัวว่าเชื้อจะมาติดตนเองได้ อับอายผู้คนที่บ้านชุมชนที่มีคนเป็นเอดส์อยู่ในครอบครัว จึงกีดกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อมีส่วนร่วมในงานที่พบปะผู้คนมากหน้าหลายตา เหตุการณ์ที่พบมักจะเป็นในเรื่องการถูกกีดกันไม่ให้ไปร่วมงานแต่งงานหรืองานบุญต่างๆ ในหมู่บ้าน ในเรื่องคนในครอบครัวไม่ดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่เริ่มมีอาการป่วย ดังคำบอกเล่าดังต่อไปนี้

“...เมื่อสามวันก่อนพ่อเสียชีวิตในงานศพพ่อ พี่ชายก็สั่งห้ามไม่ให้ไปร่วมต้อนรับแขกที่มาร่วมงานศพ... บ่าต้องไปรับแขกตัวผอม เป็นจะรังเกียจ .... ”

(หญิงหม้าย อายุ 38 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าตนเองติดเชื้อมานาน 7 ปี)

“....เป็นไล่เข้าเจ้าหนี... บ่ามีอะหยังมาอยู่ตวยข้า สูยังบ่ปิ๊กบ้านเหย... ข้าเจ้าทนอยู่ทุกวันนี้แบบเหมือนคนหนูหนวก เพราะจะหนีไปไหนก็บ่ารอด ..เพราะว่าบ้านเราทุกข์ยาก สามีและแม่ฮ้อยของสามีไม่ฮ้อยากดูแลเรา สามีเป็นจ้งเฮา.. บางครั้งบางมื่อยังไม่กินข้าวร่วมกับเรา ไม่ฮ้อยากคุยกับเรา เราอยู่หน้าบ้าน เป็นจะอยู่หลังบ้าน ..เงินทองก็บ่หื้อใช้จ่าย.. ยามนอนก็หันหลังหื้อ..”

(หญิงคู่ อายุ 30 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าตนเองติดเชื้อมานาน 6 เดือน)

4.2.4.2 กลุ่มที่ได้รับทราบจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนบ้าน ชุมชน ( $n = 14$ )

1) กลุ่มผู้ที่ไม่มีอาการทางร่างกาย ( $n = 6$ ) เหตุการณ์ที่พบมักจะเป็นในเรื่องเพื่อนบ้านไม่ยอมให้ช่วยทำงานเกี่ยวกับเตรียมอาหารในงานต่างๆ ของหมู่บ้านโดยจัดแจงให้ผู้ติดเชื้อเลี้ยงไปทำหน้าที่อื่น ขณะที่ผู้คนอื่นช่วยกันทำครัวประกอบอาหารในงานของหมู่บ้าน เช่น มีผู้ติดเชื้อไปช่วยผ่าฟักเขียวเพื่อประกอบอาหาร ก็ถูกกีดกันไม่ให้ทำโดยให้เหตุผลว่ากลัวคนต่างหมู่บ้านจะพาให้ จะรังเกียจ ให้ไปช่วยล้างจานเถอะ ในกระบวนการที่ทำน้ำพริกกะปิหากมีผู้ติดเชื้อไปร่วมคั้นมะเขือเปราะเพื่อมาปรุงรสน้ำพริกด้วย ถ้ามีอาหารเหลือก็จะถูกนิทาทั้งต่อหน้าและ

ลับหลังว่าผู้ติดเชื้อเป็นเหตุ แม้ผู้ติดเชื้อเดินเข้าไปในครัวก็จะมีอาการสะกิดกันมองบางคนเจอผู้คนแสดงอาการรังเกียจอย่างออกนอกหน้า โดยมีการพูดกระทบทั้งทางตรงทางอ้อมต่อผู้ติดเชื้อด้วยคำพูดที่ส่อเสียด เช่น เชิญชวนให้ผู้ที่นั่งร่วมวงกับผู้ติดเชื้อดื่ม้ำน้ำโดยพูดว่า"...แก้วนี้เอาไปใช้เป็นเอตส์..ทำไมปิ้ง..กลัวติดหยั้ง.." (ดื่ม้ำน้ำโดยใช้แก้วนี้สิ..เราไม่ใช่เป็นเอตส์..ไม่ต้องกลัวติดหยั้ง) ในเรื่องถูกเพื่อนบ้านกีดกันแยกงานขามซ้อนในการรับประทานอาหารในงานต่างๆของหมู่บ้าน ทั้งในงานของชุมชน งานศพหรืองานวัดหากมีผู้ติดเชื้อมานั่งร่วมวงรับประทานอาหารอยู่ก่อนแล้วในโตกข้าวหากมีซ้อนอยู่ผู้ที่มานั่งทีหลังจะขอเปลี่ยนซ้อน จะมีการแบ่งแยกภาชนะเช่น แกงจืดจะแยกรับประทานด้วยถ้วยเดียวเป็นของแต่ละบุคคลไป แกงแม้จะเป็นชนิดเดียวกันก็แบ่งเป็น 2 ถ้วย น้ำพริกก็จะกินคนละมุมด้วยกับรอยเดิมที่ผู้ติดเชื้อจิ้ม หรือหากผู้อื่นนั่งอยู่ก่อนแล้ว มีการเชื้อเชิญผู้ติดเชื้อร่วมวงด้วยหากผู้ติดเชื้อเข้าไปนั่งร่วมวงก็จะรับอ้อม โดยอ้างว่านั่งกินมานานแล้วทั้งที่ความเป็นจริงเพิ่งกินได้ไม่กี่คำ ในเรื่องคนขายอาหารปรุงสุกในหมู่บ้านแสดงท่าทีรังเกียจเมื่อผู้ติดเชื้อเข้าไปเลือกซื้อจับต้องอาหารเช่นคนอื่นๆ ขณะที่ไปเลือกอาหารเช่น หมูทอด ปลาทอด คนขายจะบอกว่าไม่ต้องจับให้ชี้เอาว่าเลือกอันไหน ในเรื่องร้านตัดผมหรือร้านเสริมสวยในหมู่บ้านไม่ให้บริการหรือไม่เต็มใจให้บริการ ในการไปรับบริการร้านตัดผมหรือทำผมในหมู่บ้าน เจ้าของร้านไม่เต็มใจที่จะให้บริการโดยให้เหตุผลว่ารอค่างานนี้หรือให้มีติดก่อน รอให้ผู้คนไม่พลุกพล่านก่อนค่อยมาใหม่เนื่องจากไม่สะดวกในการที่จะทำผมให้ สร้างความน้อยใจเป็นอย่างมากกับผู้ติดเชื้อดังคำบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างมีรายละเอียดดังนี้

"..ช่วยผ่าฟัก ทำกับข้าวช่วยงานแต่งงาน เป็นว่าใส่หน้า.. คนอื่นมาหันเป็นจะจ๊ะ.. หมู่เดียวกันหาบ่าจ๊ะ.. บ้านเฮาไผบ่าจ๊ะแต่คนอื่นจะจ๊ะ.. ข้าเจ้ารู้สึกน้อยใจมาก.. น้ำตาไหลและพูดได้ตอบไปว่า มันเป็นบ่าหยั้ง เจ้ายังบ่าเป็นหยั้งเด้อลล.."

(หญิงหม้าย อายุ 44 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าจะตนเองติดเชื้อมานาน 7 ปี 1 เดือน)

"..ร้านตัดผมโดยทั่วไปเป็นจะโกนหนวดหือ ถ้าเฮาไป.. เป็นฮู้ว่าเฮาติดเชื้อเป็นจะบ่าโกนหือ.."

(ชายหย่ากับภรรยาแล้ว อายุ 41 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าจะตนเองติดเชื้อมานาน 10 ปี)

"...ในการกินข้าวร่วมวงเดียวกัน รอยที่เราจิ้ม น้ำพริกมุมนี้ เขาจะเว้นไป เขาจะเลี้ยงไปกินมุมอื่น ไม่กินรอยเก่าที่เราจิ้มเหมือนกับว่าจะมีเชื้อโรคติดอยู่ตรงนั้น และกินบักก็คำเขาก็ลุกหนีพร้อมกับพูดว่า.. กินมานานแล้ว.. อ้อมก่อนนะ..."

(หญิงหม้าย อายุ 31 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าจะตนเองติดเชื้อมานาน 1 ปี 4 เดือน)

“...ไปร้านตัดผมของคนในหมู่บ้านที่รู้จักกัน....รอดีก่อนค่อยมาตัด..รอหือคนเจียบก่อนนะ..เจ้า  
ของร้านตัดผมในหมู่บ้านพูดกับเรา....”

(หญิงหม้าย อายุ 32 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าคุณเองติดเชื้อมานาน 5 ปี 7 เดือน)

2) ผู้ที่อยู่ในระยะปรากฏอาการ (n = 8) กลุ่มนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เนื่องด้วยมีอาการทางกายภาพที่ไม่สามารถปกปิดได้อีกต่อไป คือผู้ที่เคยทนต์แล้วอาการดีขึ้นหรือผู้ที่มีอาการทางผิวหนัง ชุ่มผอม ผิวดำดำไหม้ หรือมีตุ่มผื่นทางร่างกาย เหตุการณ์ที่รับรู้จะเป็นในเรื่องเพื่อนบ้านกีดกันแยกงานข้ามชั้นในการรับประทานอาหาร แสดงความรังเกียจในเรื่องการแลกเปลี่ยนอาหาร จากเดิมกับข้าวที่ทำกันในแต่ละบ้านมีการแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาตอนเย็น บ้านไหนข้าวเหนียวข้าวสุกไม่พอกินก็หยิบยืมกันไป ในหมู่เพื่อนบ้านที่มีรั้วติดกันหรือในละแวกเดียวกัน ภาพเหล่านี้ได้เลือนหายไปเมื่อชุมชนรับรู้ว่าคุณเองเป็นผู้ติดเชื้อ และในเรื่องผู้ติดเชื้อที่มีอาการทางร่างกายไม่ได้รับเชิญไปงานบุญขึ้นบ้านใหม่หรืองานแต่งงาน ในเรื่องไม่ให้งานทำงานเกี่ยวกับเตรียมอาหารหากเป็นงานของชุมชนเช่นงานวัด หรืองานศพ ก็จะไม่ถูกเชิญชวนให้มาร่วมทำอาหาร แม้แต่เดินผ่านโรงครัวของวัดเพื่อจะไปช่วยล้างจานหรือเสิร์ฟน้ำ ก็ถูกเพื่อนบ้านสะกิดกันมองและบ่นปากใส่ บางคนก็เข้าไปช่วยลาบจิ้น (เนื้อ) ก็ถูกต่อว่าด้วยคำพูดซึ่งหน้า “..บ่ต้องทำ หือคนอื่นทำ ฮู้ตัวเอา..” (ไม่ต้องทำให้ผู้อื่นทำรู้ตัวบ้าง) บางทีสวมเสื้อแขนยาวคลุมไว้แต่ไม่คลุมปิดบริเวณมือทั้งสองข้างเพื่อนบ้านเห็นก็ซุบซิบให้ได้ยินว่า...”เนี่ย..มันออกตุ่มละ..จะไปโกลมันเน้อ..” (เริ่มมีตุ่มผื่นตามตัวแล้ว..อย่าไปเข้าโกลนะ) ในเรื่องร้านตัดผมหรือร้านเสริมสวยไม่เต็มใจให้บริการ ร้านทำผมในหมู่บ้าน จะถูกอ้างว่านัดลูกค้าไว้แล้ว น้ำยาตัดผมไม่มีบ้าง รวมทั้งในเรื่องผู้โดยสารคนอื่นปฏิเสธไม่ให้นั่งร่วมเบาะขณะที่โดยสารรถสี่ล้อประจำทาง เนื่องจากเขาเห็นตุ่มที่มือและเท้าซึ่งไม่สามารถปกปิดได้หมดด้วยเสื้อผ้า ผู้โดยสารอื่นเขาก็เกิบหนีไม่นั่งชิดติดด้วย มีรายละเอียดดังกล่าวต่อไปนี้

“...ถ้าไปช่วยการช่วยงาน จะมีบางคนที่ใส่หน้าเสา บ่ต้องช่วย...ติดเชื้อมาต้องช่วยละ...  
หือคนอื่นยะ..เฮ้าน้อยใจ..”

(หญิงหม้าย อายุ 37 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าคุณเองติดเชื้อมานาน 5 ปี 5 เดือน)

“..ร้านตัดผมในหมู่บ้าน ปฏิเสธว่า..บ่มีน้ำยาตัด ..วันนี้บ่ว่างนัดลูกค้าไว้แล้วบ้าง..ทั้งๆที่มีลูกค้า  
อ้างสารพัด.. เราก็คะมาทำร้านในเมืองที่คนไม่รู้จักเรามากกว่า...”

(หญิงคู่ อายุ 40 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าคุณเองติดเชื้อมานาน 2 ปี)



“..แต่ก่อน คนบ้านใกล้กันเวลาเราทำกับข้าวก็แลกกันกิน แบ่งกันกิน เย็นวันไหนที่เพื่อนบ้านข้างหนึ่ง ข้าวสุกไม่พอกิน หวิดไป ..ก็หยิบยืมข้าวบ้านเรา ถ้าบ้านเราหวิดหรือไม่พอกินก็ยืมบ้านเขา ผลัดกัน ยืมตั้งแต่เป็นรู้ว่าเราติดเชื้อ ..บ่สบายบ่อยๆ..บ่มีเลยที่จะมายื่นแกง ยื่นข้าวให้กัน...”

(หญิงคู่ อายุ 30 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่าเป็นตนเองติดเชื้อมานาน 10 ปี 6 เดือน)

#### 4.2.5 การรับรู้ที่เป็นตราบาปด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลของผู้ติดเชื้อ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มีต่อตนเอง

กลุ่มตัวอย่างรับรู้ตราบาปในด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลของการรับรู้ใน  
ความรู้สึกนึกคิดที่ตัวผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มีต่อตนเองรู้สึกเป็นประจำคือ การมองตัวเอง  
ว่าเป็นคนโชคร้ายมากที่สุด (ร้อยละ 74.1) รองลงมาคือรับรู้ว่าเป็นตนเองประมาทในการใช้ชีวิต  
(ร้อยละ 37.0) และรับรู้ว่าเป็นคนที่น่าสงสาร (ร้อยละ 36.1) ในขณะที่ประเด็นการรับรู้ตรา  
บาปด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลของการรับรู้ในความรู้สึกนึกคิดที่ตัวผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้  
ป่วยเอดส์มีต่อตนเองที่ไม่เคยรู้สึกเลยคือ เรื่องการมองตัวเองว่าเป็นคนที่โชคดี (ร้อยละ 88.5) รอง  
ลงมาคือ การที่รับรู้มองตัวเองเป็นคนที่เห็นแก่ตัว (ร้อยละ 58.3) (ดังรายละเอียดในตาราง 4.7)

ตาราง 4.7 การรับรู้ที่เป็นตราบาปด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ  
ผู้ป่วยเอดส์มีต่อตนเอง

| การรับรู้ที่เป็นตราบาปเอดส์<br>ด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคล<br>ของผู้ติดเชื้อมีต่อตนเอง<br>(n = 108) | ระดับการรับรู้ที่เป็นตราบาป              |  |   |  | Mean | S.D. |
|---|--|--|---|--|------|------|
|   | รู้สึกเป็น<br>ประจำ<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) | รู้สึกอยู่<br>บ่อยครั้ง<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) | รู้สึกอยู่<br>บางครั้ง<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) | ไม่เคย<br>รู้สึกเลย<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) |      |      |
| 1.ฉันมองตัวเองว่าเป็นคนที่<br>โหดร้าย   | 80<br>(74.1)                             | 9<br>(8.3)                                   | 9<br>(8.3)                                  | 10<br>(9.3)                              | 3.47 | 0.99 |
| 2. ฉันมองตัวเองว่าเป็นคนที่<br>ประมาทในการใช้ชีวิต  | 40<br>(37.0)                             | 30<br>(27.8)                                 | 21<br>(19.5)                                | 17<br>(15.7)                             | 2.86 | 1.09 |
| 3.ฉันมองตัวเองเป็นคนที่<br>มี<br>คุณค่า   | 33<br>(30.6)                             | 37<br>(34.3)                                 | 23<br>(21.3)                                | 15<br>(13.8)                             | 2.19 | 1.02 |
| 4. ฉันมองตัวเองว่าเป็นคน<br>น่าสงสาร  | 39<br>(36.1)                             | 29<br>(26.9)                                 | 26<br>(24.0)                                | 14<br>(13.0)                             | 2.14 | 1.05 |
| 5.ฉันมองตัวเองว่าเป็นคนที่<br>ไม่มีผลร้ายต่อผู้อื่น   | 30<br>(27.8)                             | 47<br>(43.5)                                 | 24<br>(22.2)                                | 7<br>(6.5)                               | 2.07 | 0.87 |
| 6.ฉันมองตัวเองว่าเป็นคนที่<br>ไม่มีอันตรายต่อผู้อื่น  | 27<br>(25.0)                             | 45<br>(41.7)                                 | 25<br>(23.1)                                | 11<br>(10.2)                             | 2.19 | 0.93 |
| 7.ฉันมองตัวเองว่าเป็นคนที่<br>สังคมควรให้อภัย   | 26<br>(24.1)                             | 43<br>(39.8)                                 | 27<br>(25.0)                                | 12<br>(11.1)                             | 2.23 | 0.94 |
| 8.ฉันมองตัวเองว่าพึ่งตนเองได้<br>ไม่เป็นภาระให้ผู้อื่น  | 26<br>(24.1)                             | 42<br>(38.9)                                 | 20<br>(18.5)                                | 20<br>(18.5)                             | 2.31 | 1.04 |
| 9.ฉันมองตัวเองว่าเป็นคนที่<br>รู้จักระมัดระวังตัวเอง  | 25<br>(23.1)                             | 41<br>(38.0)                                 | 23<br>(21.3)                                | 19<br>(17.6)                             | 2.33 | 1.02 |
| 10. ฉันมองตัวเองว่าเป็นบุคคล<br>ที่เสียสละ  | 20<br>(18.5)                             | 37<br>(34.3)                                 | 18<br>(16.7)                                | 33<br>(30.5)                             | 2.59 | 1.11 |
| 11.ฉันมองตัวเองว่าเป็นคนที่<br>น่าสมน้ำหน้า   | 20<br>(18.5)                             | 20<br>(18.5)                                 | 25<br>(23.2)                                | 43<br>(39.8)                             | 2.16 | 1.15 |

ตาราง 4.7 (ต่อ)

| การรับรู้ที่เป็นตราบาปเอตส์<br>ด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคล<br>ที่ผู้ติดเชื่อมีต่อตนเอง<br>(n = 108) | ระดับการรับรู้ที่เป็นตราบาป |                         |                        |                     | Mean | S.D. |
|---|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------|------|
|   | รู้สึกเป็น<br>ประจำ         | รู้สึกอยู่<br>บ่อยครั้ง | รู้สึกอยู่<br>บางครั้ง | ไม่เคย<br>รู้สึกเลย |      |      |
|   | จำนวน<br>(ร้อยละ)           | จำนวน<br>(ร้อยละ)       | จำนวน<br>(ร้อยละ)      | จำนวน<br>(ร้อยละ)   |      |      |
| 12. ฉันมองตัวเองว่าเป็นคน<br>ใจไม่ฉลาดเลย   | 17<br>(15.7)                | 21<br>(19.4)            | 34<br>(31.6)           | 36<br>(33.3)        | 2.18 | 1.07 |
| 13. ฉันมองตัวเองว่าเป็นคน<br>ที่ไม่น่าให้อภัย   | 15<br>(13.9)                | 17<br>(15.7)            | 27<br>(25.0)           | 49<br>(45.4)        | 1.98 | 1.08 |
| 14. ฉันมองตัวเองว่าเป็นคนที่<br>สังคมให้การยอมรับ   | 13<br>(12.0)                | 44<br>(40.7)            | 38<br>(35.3)           | 13<br>(12.0)        | 2.47 | 0.86 |
| 15. ฉันมองตัวเองว่าเป็น<br>ภาระให้ผู้อื่น   | 12<br>(11.1)                | 22<br>(20.4)            | 36<br>(33.3)           | 38<br>(35.2)        | 2.07 | 1.00 |
| 16. ฉันมองตัวเองว่าเป็นคนที่<br>น่ารังเกียจของสังคม   | 11<br>(10.2)                | 36<br>(33.3)            | 34<br>(31.5)           | 27<br>(25.0)        | 2.29 | 0.96 |
| 17. ฉันมองตัวเองว่าเป็นคน<br>ที่น่าเหยียดหยาม   | 10<br>(9.3)                 | 27<br>(25.0)            | 24<br>(22.2)           | 47<br>(43.5)        | 2.00 | 1.03 |
| 18. ฉันมองตัวเองว่าเป็นคน<br>น่ายกย่อง  | 9<br>(8.3)                  | 26<br>(24.1)            | 32<br>(29.6)           | 41<br>(38.0)        | 2.97 | 0.98 |
| 19. ฉันมองตัวเองว่าเป็นคนที่<br>น่ากลัว   | 8<br>(7.8)                  | 22<br>(20.4)            | 33<br>(30.5)           | 45<br>(41.3)        | 1.94 | 0.96 |
| 20. ฉันมองตัวเองว่าเป็นคนที่<br>น่าอันตราย  | 7<br>(6.5)                  | 30<br>(27.8)            | 22<br>(20.4)           | 49<br>(45.3)        | 1.95 | 1.00 |
| 21. ฉันมองตัวเองว่าเป็นคน<br>ไร้คุณค่า  | 7<br>(6.5)                  | 21<br>(19.4)            | 32<br>(29.7)           | 48<br>(44.4)        | 1.88 | 0.94 |
| 22. ฉันมองตัวเองว่าเป็นคน<br>ที่ฉลาด  | 6<br>(5.6)                  | 25<br>(23.1)            | 40<br>(37.0)           | 37<br>(34.3)        | 3.00 | 0.90 |

| การรับรู้ที่เป็นตราบาปเอตส์<br>ด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคล<br>ที่ผู้ติดเชื้อมีต่อตนเอง<br>(n = 108) | ระดับการรับรู้ที่เป็นตราบาป |                                |                               |                                | Mean | S.D. |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------|------|
|   | รู้สึกเป็น                  | รู้สึกอยู่                     | รู้สึกอยู่                    | ไม่เคย                         |      |      |
|   | ประจำ<br>จำนวน<br>(ร้อยละ)  | บ่อยครั้ง<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) | บางครั้ง<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) | รู้สึกเลย<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) |      |      |
| 23. ฉันมองตัวเองว่าเป็นคนที่<br>เห็นแก่ตัว  | 5<br>(4.6)                  | 12<br>(11.2)                   | 28<br>(25.9)                  | 63<br>(58.3)                   | 1.62 | 0.86 |
| 24. ฉันมองตัวเองว่าเป็นคน<br>โหดที่ติดเชื้อเอชไอวี  | 3<br>(2.6)                  | 4<br>(3.9)                     | 5<br>(4.6)                    | 96<br>(88.9)                   | 3.80 | 0.64 |

#### 4.2.6 เหตุการณ์ที่เป็นตราบาปด้านการประเมินค่าส่วนบุคคลที่มีต่อตนเอง ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

ในการสัมภาษณ์ด้วยคำถามปลายเปิดในความรู้สึกของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้  
ป่วยเอดส์ มีภาพในการมองตนเองและการให้คุณค่ากับตนเองในมุมมองต่างๆของความรู้สึกนึก  
คิดว่าเป็นคนโหดร้าย น่ารังเกียจ ไร้ค่า น่าเหยียดหยามโดยแบ่งออกเป็น 2 ด้านย่อย คือ จาก  
ประสบการณ์ทางอ้อม และจากประสบการณ์จริงที่ตนเองรับรู้ในการเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้  
ป่วยเอดส์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.2.6.1 จากประสบการณ์โดยอ้อมที่ตนเองรับรู้ในการเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ  
ผู้ป่วยเอดส์จากผู้อื่น (n = 5) การรับรู้ในการที่เคยมีตัวอย่างให้เห็นในความรังเกียจที่เพื่อนบ้าน  
และชุมชนมีต่อผู้ติดเชื้อในขณะที่เพื่อนบ้านยังไม่ทราบว่าตนเป็นผู้ติดเชื้อ การรับรู้ว่าตนเองยังคงเคยรู้  
สึกรังเกียจและพูดถึงผู้ติดเชื้อในแง่ลบของคนที่ไม่ดี มีความลำสอนทางเพศ รู้สึกสมน้ำหน้าและ  
เหยียดหยามผู้ติดเชื้อถึงความประมาทในการใช้ชีวิตแม้ว่าเขาจะไม่มีอาการทางกายก็ตาม ซึ่ง  
ขณะเวลานั้นบุคคลยังไม่รู้ตัวว่าตนเองก็เป็นหนึ่งในนั้น หรือแม้แต่ตนเองที่เป็นผู้ติดเชื้อยังนี้กรัง  
เกียจอาการทางกายของเพื่อนผู้ติดเชื้อด้วยกันเอง มีการเชื่อมโยงภาพของผู้ติดเชื้อถึงความน่ารัง  
เกียจจากเพื่อนบ้านชุมชนคนรอบข้างมายังตนเอง แม้ว่าตนเองจะไม่มีอาการทางร่างกาย หรือมี  
อาการทางกายแต่ไม่ชัดเจนก็ตาม ดังตัวอย่างความรู้สึกชายคู่ อายุ 23 ปี สำเร็จการศึกษาระดับ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นพนักงานโรงแรม มีรายได้ 3,500  
บาทต่อเดือน ทราบว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวีมานาน 2 ปี 2 เดือน มีสภาพร่างกายแข็งแรงดีไม่มี  
อาการสัมพันธ์กับโรคเอดส์ เป็นสมาชิกชมรมผู้ติดเชื้อของโรงพยาบาลร่วมกิจกรรมนานๆครั้ง

เฉพาะพบกลุ่มครั้งสำคัญเช่น งานปีใหม่ สงกรานต์ มีความรู้สึกว่าตนเองโชคร้าย เป็นคนโง่ที่ไม่ฉลาดเลยและประมาทในการใช้ชีวิตมากที่สุด จึงรู้จักเฉพาะตนเองกับภรรยาและเพื่อนในกลุ่มผู้ติดเชื่อเอชไอวีด้วยกันเท่านั้น มารดาและบิดาทั้งของภรรยาและตนเองยังไม่เปิดเผยให้ทราบเพราะกลัวญาติพี่น้องรังเกียจ เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาเคยมองผู้ติดเชื่อในมุมผู้ที่ประพฤติไม่ดี แม้แต่เพื่อนที่เคยสนิทด้วยพอเรารู้ว่าเขาติดเชื่อเอชไอวีก็ห่างเหินกัน คบกันไม่สนิทเหมือนเดิม คาดไม่ถึงไม่คิดว่าจะมาเจอกับตนเอง ดังคำพูดที่กล่าวกับผู้ศึกษาว่า "...ตกต่ำเป็น..เป็นดีไค่หัว..ตกต่ำตัวเป็นดีไค่ให้.." (เห็นเป็นเรื่องคนอื่นจึงหัวเราะดูน่าขำ พอมาเจอกับตัวเองแล้วอยากร้องไห้) ดังนั้นตนเองจึงไม่อยากสูงส่งกับใคร หรือกลุ่มตัวอย่างบุคคลอื่นที่กล่าวถึงความรู้สึกที่ตนเองเคยมีประสบการณ์ที่พบกับคนในหมู่บ้านเดียวกัน ขณะที่สามีตายด้วยเอดส์ภรรยาเฝ้าฝังศพร่างกายแต่ไม่ชัดเจนนัก มาช่วยทำกับข้าวในงานของชุมชน ถูกเพื่อนบ้านนินทาต่อว่าแสดงความรังเกียจ "...พ่อล่อผัวมันตายเป็นเอดส์ มันมาเหยียะยะหยัง.." (ดูสิสามีตายด้วยเอดส์ยังจะมาช่วยเขาทำไม) หรือกลุ่มตัวอย่างบุคคลอื่นที่กล่าวถึงความรู้สึกที่ตนเองเคยรับรู้ว่าเป็นบ้านบางคนมองผู้ติดเชื่อถึงความน่ารังเกียจในขณะที่เขายังไม่ทราบว่าเราเป็นผู้ติดเชื่อ "...มันเป็นแล้ว บอู้ตัวมันกา เป็นบไซขอหื้อมาชวยล.." (เป็นเอดส์แล้วยังไม่รู้ตัวอีกไม่มีใครเขาขอให้มาชวยนี่) การที่เคยมีตัวอย่างให้เห็นในความรังเกียจที่คนรอบข้างมีต่อผู้ติดเชื่อในขณะที่ยังไม่ทราบว่าตนเป็นผู้ติดเชื่อ การรับรู้และความรู้สึกมีมากมาย ดังคำบอกเล่าดังต่อไปนี้

"..มีตัวอย่างให้เห็นคะ มีผู้ติดเชื่อชื่อพี่น้องเข้าไปชวยงานศพเข้าไปชวยในครัว..ชาวบ้านว่าหื้อ บ่ดูตัวเองออกตุ้มยั้งมาอยู่..เขว่าลับหลังหนูได้ยื่นใส่พอดี.. หนูยังรู้สึกว่่าน่ารังเกียจที่เขาไม่ดูตัวเองตอนนี้พอหนูรู้ว่าตัวเองติดเชื่อ หนูไม่ไปไหนทั้งนั้นเพราะกลัวเขาว่าหื้อ...ถ้าจำเป็นต้องไปก็ไปรวมบ่ตาย..บ่ไปชวยอะหยังไผ..."

(หญิงคู่ อายุ 23 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่่าตนเองติดเชื่อมานาน 2 ปี 8 เดือน)

"...ยอมรับไม่ได้ว่่าตนเองติดเชื่อเอชไอวีครับ เพราะว่่ากลัวคนอื่นรังเกียจ ตัวเองเคยว่่าเขาไว้เยอะแต่เราก็รักษาสุขภาพ ดูแลตัวเอง ตอนนี้แข็งแรงคืออยู่ ไม่อยากให้คนรอบข้างมีการมองเปลี่ยนไป หากเรามีอาการออกแล้วทัศนคติของคนใกล้ชั้รอบข้างเราน่าจะเปลี่ยนไปจากเดิม.."

(ชายคู่ อายุ 23 ปี ระยะเวลาที่ทราบว่่าตนเองติดเชื่อมานาน 2 ปี 2 เดือน)

4.2.6.2 จากประสบการณ์จริงที่ตนเองรับรู้ในการเป็นผู้ติดเชื่อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (n = 10) การรับรู้มักเป็นในเรื่องการรับรู้และมีภาพในการให้คุณค่าตัวเองในการเป็นผู้

ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ว่าเป็นคนที่โชคร้าย โชคร้ายที่ไม่ได้ตรวจเลือดก่อน เพราะความไม่รู้ ไม่เข้าใจมาก่อนว่าคนธรรมดาไม่มีตุ่มไม่มีแผลจะมีเชื้อเอดส์ มีภาพในการให้คุณค่ากับตนเองว่า ประมาทในการใช้ชีวิตและสร้างภาระให้กับญาติพี่น้องในการดูแลยามเจ็บป่วย หากต้องเสียชีวิตรู้สึกสงสารลูกที่ต้องเป็นภาระกับพ่อแม่ที่แก่เฒ่า และรู้สึกสมน้ำหน้าตัวเองที่ประมาทในการใช้ชีวิตตลอดจนคิดว่าตนเองเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจของสังคมโดยเฉพาะตอนสภาพร่างกายที่ผอม หน้า ลึกและออกตุ่ม แม้ว่าจะแต่งตัวดีด้วยชุดสุขภาพก็ตาม เมื่อไปนั่งใกล้ใครๆ ผู้คนก็หลกหนีไปหมด การรับรู้และความรู้สึกมีมากมายจากประสบการณ์จริงที่ตนเองเคยรู้สึก ดังคำบอกเล่าดังต่อไปนี้

ชายคู่ อายุ 33 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อยู่กินกับภรรยาและลูกอีกคนหนึ่ง รับทราบว่าได้ติดเชื้อเอชไอวีมานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันไม่ได้ทำงานแล้วแต่ก่อนเคยทำงานเป็นพนักงานขับรถให้กับกรมป่าไม้ ตั้งแต่เริ่มป่วยบ่อยเขาก็เลิกจ้างประกอบกับหมดงบประมาณของกรมป่าไม้ด้วย และได้รับเงินชดเชยเดือนละ 2,000 บาทมานานเกือบหนึ่งปี คิดว่าตนเองรับเชื้อมาจากหญิงบริการทางเพศ เคยป่วยด้วยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส เป็นเรื้อรังและงูสวัด รับรู้และมีภาพในการให้คุณค่าตัวเองในการเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ว่าเป็นคนที่โชคร้าย หากต้องเสียชีวิตรู้สึกสงสารลูก ที่ต้องเป็นภาระกับพ่อแม่ที่แก่เฒ่า และรู้สึกสมน้ำหน้าตัวเองที่ประมาทในการใช้ชีวิตตลอดจนคิดว่าตนเองเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจของสังคมโดยเฉพาะตอนสภาพร่างกายที่ผอม หน้า ลึกและออกตุ่ม แม้ว่าจะแต่งตัวดีด้วยชุดสุขภาพก็ตาม เมื่อไปนั่งใกล้ใครๆ ผู้คนก็หลกหนีไปหมด เช่นเดียวกับชายคู่ อายุ 37 ปี รู้ว่าตนเองติดเชื้อมานาน 9 ปี 5 เดือนถึงความโชคร้ายของตนเองว่า “..บ่น่าลึกลับน้อย มันย้อนเหล้า เผื่อมาสู้อ เสียใจ เมื่อลุน..”(ผมไม่น่าเลย กว่าจะรู้ตัวก็สายเสียแล้ว เพราะเมานั่นเอง)

กรณีชายรักร่วมเพศอายุ 36 ปีติดเชื้อมานาน 4 ปี 6 เดือน มีภาพในการให้คุณค่ากับตนเองว่าประมาทในการใช้ชีวิตและสร้างภาระให้กับญาติพี่น้องในการดูแลยามเจ็บป่วย เช่นเดียวกับชายวัย 39 ปี เรียนจบปริญญาตรี มีอาชีพค้าขาย ทุกวันนี้หย่ากับภรรยาแล้ว “..รู้สึก ผิดเสียใจที่ทำตัวประมาทไม่รู้จักการป้องกันตัวเอง ทำให้พ่อ-แม่ พี่ น้อง ลูก เมียเดือดร้อนไปด้วย..”

กรณีชายคู่ที่จบม.3 อาชีพทำธุรกิจส่วนตัว ได้ให้คำกับตนเองว่า “..ผมมันโง่ ที่ใช้ชีวิตอย่างประมาทและเห็นแก่ตัว ไม่น่าให้อภัยตนเองเลย..สมควรละที่คนอื่นจะมองว่าน่ารังเกียจ..และเป็นภาระ ดูน่าอันตรายสุดท้ายก็ไร้ค่า..”

ในกลุ่มผู้หญิงโดยทั่วไปมักจะคิดว่าตนเองโชคร้าย ที่ด้อยคุณค่ากว่าบุคคลอื่น ดังตัวอย่างหญิงโสดวัย 24 ปี “โชคร้าย ไม่ได้ตรวจเลือดก่อน เพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจมาก่อนว่า คนธรรมดาไม่มีตุ่มไม่มีแผลจะมีเชื้อเอดส์..” เช่นเดียวกับหญิงโสดอายุ 23 ปี ติดเชื้อมานาน 3 ปี

แต่เปิดเป็นความลับยังไม่บอกให้ แฟน ทราบคิดว่าตนเอง “..โซคร้าย เป็นอันตรายต่อแฟน (ใหม่) และเป็นภาระให้กับแฟน (ใหม่)..” ขณะที่ในกลุ่มหญิงหม้ายคิดว่าตนเองโซคร้ายที่ติดจากสามี ไม่ได้ไปล่าสอนกับใครมา มองตนเองว่าน่าสงสารและโซคร้ายมากกว่า เช่นเดียวกับในกลุ่มหญิงที่ เคยประกอบอาชีพพิเศษ ขยายบริการทางเพศ จะรู้สึกโซคร้าย ที่ตนเองไปประกอบอาชีพนี้เพราะ ความทุกข์ยาก มีรายละเอียด ดังตัวอย่างในความรู้สึกดังนี้

“..เรามองตัวเก่าว่าเป็นคนประมาทในการใช้ชีวิตและเป็นภาระให้กับญาติพี่น้องของเราเอง...”  
(ชายโสด อายุ 36 ปี ระยะเวลาที่ทราบตนเองว่าติดเชื้อมานาน 4 ปี 6 เดือน)

“..ฉันมองตนเองว่าเป็นคนที่อันตราย ใจและน่ารังเกียจ..”  
(หญิงคู่ อายุ 23 ปี ระยะเวลาที่ทราบตนเองว่าติดเชื้อมานาน 6 เดือน)

“..ถ้าเขามีขอยมีแผลเขาก็อายตัวเก่า ไม่อยากไปไหน สภาพร่างกายเปลี่ยนไป ผอม หน้าลึก ออก ตุ่ม ถึงเขาจะแต่งตัวดี ไปนั่งฮิมเป็น เป็นก็จะลุกไปเหยีย...”  
(ชายคู่ อายุ 33 ปี ระยะเวลาที่ทราบตนเองว่าติดเชื้อมานาน 14 ปี 3 เดือน)

“..โซคร้ายที่ต้องมาเจอปัญหาแบบนี้ สงสารลูกที่กำพร้าพ่อ...และจะต้องเป็นภาระให้กับพ่อแม่ที่ แก่เฒ่า ถ้าเราเจ็บป่วยและยังต้องดูแลลูกของเราอีก...”  
(หญิงหม้าย อายุ 33 ปี ระยะเวลาที่ทราบตนเองว่าติดเชื้อมานาน 6 ปี 8 เดือน)

#### 4.2.7 การรับรู้ที่เป็นตราบาปด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลที่บุคคลอื่นมี ต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

กลุ่มตัวอย่างรับรู้ตราบาปในด้านการประเมินคุณค่าที่บุคคลอื่นมองผู้ติดเชื้อ โดยวัดจากการรับรู้ของผู้ติดเชื้อจากคนรอบข้างในการให้คุณค่ากับตัวเองในเรื่องการที่บุคคลอื่นมี ภาพ ในการมองตัวเองว่าเป็นคนที่โซคร้ายมากที่สุด (ร้อยละ 39.8) รองลงมาคือการที่บุคคลอื่น มองว่าเป็นคนน่าสมน้ำหน้า (ร้อยละ 32.4) และประมาทในการใช้ชีวิต (ร้อยละ 23.1) ในขณะที่ ประเด็นตราบาปด้านการประเมินคุณค่าที่บุคคลอื่นมองตัวเองที่กลุ่มตัวอย่างไม่เคยรู้สึกเลยคือ การที่คนรอบข้างมองว่าเป็นคนโชคร้ายที่ติดเชื้อ (ร้อยละ 78.7) รองลงมาคือ การถูกบุคคลอื่นมองว่า เป็นคนที่เห็นแก่ตัว (ร้อยละ 53.7) การถูกมองว่าเป็นคนที่น่ายกย่อง (ร้อยละ 49.1) และการถูก มองว่าเป็นคนที่ฉลาด (ร้อยละ 44.4) (ดังรายละเอียดในตาราง 4.8)

ตาราง 4.8 การรับรู้ที่เป็นตราบาปของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้านการประเมินคุณค่า  
ส่วนบุคคลที่บุคคลอื่นมีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

| การรับรู้ที่เป็นตราบาปเอดส์<br>ด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคล<br>ที่บุคคลอื่นมีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี<br>และผู้ป่วยเอดส์ (n = 108) | ระดับการรับรู้ที่เป็นตราบาป              |  |   |  | Mean | S.D. |
|--|--|--|---|--|------|------|
|  | รู้สึกเป็น<br>ประจำ<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) | รู้สึกอยู่<br>บ่อยครั้ง<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) | รู้สึกอยู่<br>บางครั้ง<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) | ไม่เคย<br>รู้สึกเลย<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) |      |      |
| 1. คนทั่วไปมองฉันว่าเป็น<br>คนที่โหดร้าย   | 43<br>(39.8)                             | 38<br>(35.2)                                 | 11<br>(10.2)                                | 16<br>(14.8)                             | 3.00 | 1.05 |
| 2. คนทั่วไปมองฉันว่าเป็นคนที่<br>น่าสมน้ำหน้า  | 35<br>(32.4)                             | 34<br>(31.5)                                 | 23<br>(21.3)                                | 16<br>(14.8)                             | 2.19 | 1.05 |
| 3. คนทั่วไปมองฉันว่าเป็นคนที่<br>ประมาทในการใช้ชีวิต   | 25<br>(23.1)                             | 32<br>(29.7)                                 | 30<br>(27.8)                                | 21<br>(19.4)                             | 2.56 | 1.05 |
| 4. คนทั่วไปมองฉันว่าเป็นคน<br>น่าสงสาร   | 17<br>(15.7)                             | 38<br>(35.2)                                 | 41<br>(38.0)                                | 12<br>(11.1)                             | 2.44 | 0.89 |
| 5. คนทั่วไปมองฉันว่าพึ่งตนเอง<br>ได้และไม่เป็นภาระให้ผู้อื่น   | 15<br>(13.9)                             | 40<br>(37.0)                                 | 40<br>(37.0)                                | 13<br>(12.1)                             | 2.47 | 0.88 |
| 6. คนรอบข้างมองฉันว่าเป็นคนที่<br>ไม่น่าให้อภัย  | 15<br>(13.9)                             | 13<br>(12.0)                                 | 36<br>(33.3)                                | 44<br>(40.8)                             | 1.99 | 1.05 |
| 7. คนทั่วไปมองฉันว่าเป็นคนที่<br>รู้จักระมัดระวังตัวเอง  | 14<br>(13.0)                             | 29<br>(26.9)                                 | 43<br>(39.8)                                | 22<br>(20.3)                             | 2.68 | 0.95 |
| 8. คนทั่วไปมองฉันว่าเป็นคนที่<br>ไม่มีอันตรายต่อผู้อื่น  | 13<br>(12.0)                             | 40<br>(37.1)                                 | 42<br>(38.9)                                | 13<br>(12.0)                             | 2.51 | 0.86 |



ตาราง 4.8 (ต่อ)

| การรับรู้ที่เป็นตราบาปเอดส์<br>ด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคล<br>ที่บุคคลอื่นมีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี<br>และผู้ป่วยเอดส์ (n = 108) | ระดับการรับรู้ที่เป็นตราบาป |                         |                        |                     | Mean | S.D. |
|--|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------|------|
|  | รู้สึกเป็น<br>ประจำ         | รู้สึกอยู่<br>บ่อยครั้ง | รู้สึกอยู่<br>บางครั้ง | ไม่เคย<br>รู้สึกเลย |      |      |
|  | จำนวน<br>(ร้อยละ)           | จำนวน<br>(ร้อยละ)       | จำนวน<br>(ร้อยละ)      | จำนวน<br>(ร้อยละ)   |      |      |
| 9. คนทั่วไปมองฉันว่าเป็นคนที่<br>น่ารังเกียจของสังคม   | 13<br>(12.0)                | 35<br>(32.5)            | 39<br>(36.1)           | 21<br>(19.4)        | 2.37 | 0.93 |
| 10. คนทั่วไปมองฉันว่าเป็นคนที่<br>ไร้คุณค่า  | 12<br>(11.1)                | 34<br>(31.6)            | 48<br>(44.4)           | 14<br>(13.0)        | 2.06 | 0.94 |
| 11. คนทั่วไปมองฉันว่าเป็นคนที่<br>น่ากลัว  | 12<br>(11.1)                | 29<br>(26.9)            | 37<br>(34.3)           | 30<br>(27.8)        | 2.21 | 0.98 |
| 12. คนทั่วไปมองฉันว่าเป็นคน<br>ที่น่าอันตราย   | 12<br>(11.1)                | 29<br>(26.9)            | 33<br>(30.6)           | 34<br>(31.5)        | 2.18 | 1.00 |
| 13. คนทั่วไปมองฉันว่าเป็นคนที่<br>สังคมให้การยอมรับ  | 11<br>(10.2)                | 46<br>(42.6)            | 39<br>(36.1)           | 12<br>(11.1)        | 2.48 | 0.83 |
| 14. คนรอบข้างมองฉันว่าเป็น<br>คนที่สังคมควรให้อภัย   | 11<br>(10.2)                | 45<br>(41.7)            | 34<br>(31.5)           | 18<br>(16.7)        | 2.55 | 0.89 |
| 15. คนทั่วไปมองฉันว่าเป็นคนที่<br>มีคุณค่า   | 11<br>(10.2)                | 37<br>(34.3)            | 43<br>(39.8)           | 17<br>(15.7)        | 2.61 | 0.87 |
| 16. คนรอบข้างมองฉันว่าเป็น<br>คนที่น่าเหยียดหยาม   | 11<br>(10.2)                | 23<br>(21.3)            | 41<br>(38.0)           | 33<br>(30.6)        | 2.11 | 0.96 |
| 17. คนรอบข้างมองฉันว่าเป็น<br>คนที่ไม่ฉลาดเลย  | 10<br>(9.3)                 | 29<br>(26.9)            | 35<br>(32.4)           | 34<br>(31.5)        | 2.14 | 0.97 |
| 18. คนรอบข้างมองฉันว่าเป็นคน<br>ที่เสียสละ   | 10<br>(9.3)                 | 25<br>(23.1)            | 32<br>(29.6)           | 42<br>(38.0)        | 2.96 | 0.99 |
| 19. คนรอบข้างมองฉันว่าเป็น<br>คนที่น่ายกย่อง   | 10<br>(9.3)                 | 14<br>(13.0)            | 31<br>(28.7)           | 53<br>(49.1)        | 3.18 | 0.98 |

ตาราง 4.8 (ต่อ)

| การรับรู้ที่เป็นตราบาปเอดส์<br>ด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคล<br>ที่บุคคลอื่นมีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ<br>ผู้ป่วยเอดส์ (n = 108) | ระดับการรับรู้ที่เป็นตราบาป |                                |                               |                                | Mean | S.D. |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------|------|
|  | รู้สึกเป็น                  | รู้สึกอยู่                     | รู้สึกอยู่                    | ไม่เคย                         |      |      |
|  | ประจำ<br>จำนวน<br>(ร้อยละ)  | บ่อยครั้ง<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) | บางครั้ง<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) | รู้สึกเลย<br>จำนวน<br>(ร้อยละ) |      |      |
| 20. คนทั่วไปมองฉันว่าเป็นบุคคลที่ไร้คุณค่า   | 9<br>(8.3)                  | 23<br>(21.3)                   | 41<br>(38.0)                  | 35<br>(32.4)                   | 2.06 | 0.94 |
| 21. คนทั่วไปมองฉันว่าเป็นคนที่โชคไม่ดีที่ติดเชื้อเอชไอวี   | 8<br>(7.4)                  | 5<br>(4.6)                     | 10<br>(9.3)                   | 85<br>(78.7)                   | 3.59 | 0.89 |
| 22. คนทั่วไปมองฉันว่าเป็นภาระให้ผู้อื่น  | 6<br>(5.6)                  | 23<br>(21.3)                   | 42<br>(38.9)                  | 37<br>(34.3)                   | 1.98 | 0.89 |
| 23. คนรอบข้างมองฉันว่าเป็นคนที่ฉลาด  | 6<br>(5.6)                  | 20<br>(18.5)                   | 34<br>(31.5)                  | 48<br>(44.4)                   | 3.15 | 0.92 |
| 24. คนรอบข้างมองฉันว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัว  | 2<br>(1.9)                  | 11<br>(10.1)                   | 37<br>(34.3)                  | 58<br>(53.7)                   | 1.60 | 0.75 |

#### 4.2.8 เหตุการณ์ที่เป็นตราบาปด้านการประเมินค่าส่วนบุคคลที่มีบุคคลอื่นมีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

จากการสัมภาษณ์ด้วยคำถามปลายเปิดพบว่า ในการรับรู้ว่าคุณค่าส่วนบุคคลอื่นมีภาพในการให้คุณค่าส่วนบุคคลและรู้สึกนึกคิดกับตัวผู้ติดเชื้อ รับรู้ในการถูกมองว่าเป็นคนโชคร้าย นำรังเกียจ นำอันตราย ไม่น่าให้อภัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้านย่อย คือ ภาพในการให้คุณค่าจากกลุ่มญาติพี่น้อง และภาพในการให้คุณค่าจากกลุ่มเพื่อนบ้านและคนในชุมชน ในการเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์โดยดูจากพฤติกรรมและประสบการณ์จริงที่ได้รับโดยมีรายละเอียดดังนี้

4.2.8.1 การรับรู้ถึงภาพในการให้คุณค่าจากกลุ่มญาติพี่น้อง ในการเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (n = 3) กลุ่มผู้หญิงที่เคยประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับเพศพาณิชย์ พบการประเมินค่าทางลบจากบุคคลในครอบครัวทั้งที่เป็นญาติสายตรง จนถึงญาติสายอ้อม เช่น พี่ชายที่อยู่บ้านหลังเดียวกัน พี่สะใภ้ที่อยู่บ้านคนละหลัง แม่อยู่ (ยาย) ของสามี ที่อยู่บ้านหลังเดียวกัน ดังตัวอย่างในความรู้สึกต่อไปนี้

กรณีหญิงคู่อายุ 30 ปี อาชีพ เก็บผักขายเป็นรายวันมีรายได้วันละ 50-60 บาท เพิ่งทราบว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวีมานาน 6 เดือน อยู่ในระยะปรากฏอาการ มีฝ้าขาวในปาก มีไข้ ร่างกายซูบผอม มีตุ่มผื่นตามผิวหนัง ในอดีต เคยมีอาชีพขายบริการทางเพศ มีภาพในการให้คุณค่า จากคนในครอบครัวคือสามีและแม่ขี้ของสามี ภาพที่ตัวเองถูกมองว่าเป็นบุคคลที่น่ากลัว จากร่างกายที่ซูบผอม และออกตุ่มตามผิวหนัง ยามป่วยไข้ก็เป็นภาระในการดูแล นำรังเกียจและนำอันตราย โดยแม่ขี้ของสามีได้เอยปากไล่ นาง ออกจากบ้าน ทุกวันนี้สามีและแม่ขี้ยังมีความเกลียดชัง และโกรธตัวเองอยู่ หากมีบุคคลอื่นมาแวะเยี่ยมเยียน ตัวแม่ขี้จะพูดคุยด้วยเป็นอย่างดี พอบุคคลเหล่านั้นคล้อยหลัง แม่ขี้ก็ดูดำ ว่าเป็นคนที่ไร้ค่า นำอาย นำรังเกียจ และไม่นำไปให้อภัยเลย สำหรับตนมีระบบคิดว่าตนเป็นคนดีกตัญญูหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ ไม่ได้ล่าสอนทางเพศเปลี่ยน สามีหลายคนขณะพูดคุยกับนักศึกษา เล่าด้วยเสียงสั่นเครือและน้ำตาคลอกลับในบางจังหวะของการพูดคุยที่ตั้งตัวอย่างในความรู้สึกต่อไปนี้ ดังคำพูดที่ว่า

"..สามีและแม่ขี้ของสามีไม่อยากดูแลเรา สามีเป็นจิ้งจ่า.. โกรธเราที่เราเอาเชื้อเอชไอวีมาติด .โดย เฉพาะแม่ขี้..ถ้ามีคนมาแฉว่าที่บ้านจะสู้ดีสุดดีด้วย พอลับหลังเป็นก็จะดำเจ้าเปลี่ยนเป็นคนละ คน.. ที่ข้าเจ้าติดเชื้อเพราะความทุกข์ยาก ไม่ได้สลับบาดี ..ถ้าข้าเจ้ารู้ว่าตัวเก่าติดเชื้อจะบ้าเอาไผ.. นี่เพราะว่าเฮาบ้าอยู่เพราะโรคนี้เป็นโรคที่น่ารังเกียจเพราะมันติดแล้วมันบ่หายมีแต่ตายกับตาย.."

4.2.8.2 ภาพในการให้คุณค่าจากกลุ่มเพื่อนบ้าน และคนในชุมชน ในการเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (n = 12) ในผู้ที่เริ่มมีอาการปรากฏทางร่างกาย ในการสัมภาษณ์ด้วยคำถามปลายเปิดพบว่าแม้มีตุ่มผื่นทางร่างกายเพียงเล็กน้อย ไม่ชัดเจนหากเพื่อนในกลุ่มทราบว่าติดเชื้อเอชไอวีแล้ว ที่พบเจอในชีวิตการทำงาน เช่น ใน การปลูกข้าวหรือเกี่ยวข้าว เจ้าของนา ผู้เป็นนายจ้างจะมากระซิบบอกว่า "...บ่ตีมากินน้ำฮ่วมกันเน้อ.." เป็นการสื่อที่ไม่ต้องใช้คำอธิบายมากมาย ก็รับรู้ว่าคุณค่าคนอื่นมองตนเองเป็นที่น่ารังเกียจ ขณะที่ ไปใช้บริการที่ร้านตัดผมแม่ไม่ใส่ร้านคนที่ยู่จกก็ตาม หากมีอาการปรากฏทางกายเพียงเล็กน้อยเขาก็จะไม่โกนหนวดให้ งานบุญขึ้นบ้านใหม่คนที่รู้จักกันเขาก็ไม่เชิญ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

กรณีที่พบในกลุ่มเพื่อนที่ทำงานอาชีพเดียวกัน เรื่องเล่าจากชายคู่อายุ 41 ปี จบชั้นประถมศึกษามีอาชีพรับจ้างรายวันโดยการออกมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ถูกมองจากเพื่อนที่ออกวินมอเตอร์ไซค์ด้วยกัน มีการพูดให้ได้ยิน เมื่อมีอาการปรากฏทางกายแต่ไม่ชัดเจนนัก

"..สมน้ำหน้า..เจอดีแล้วน้อ.. ไผจ้มนังง่าว ไผจ้มนังฮ้าย มันสมควรละ. มันเขาจะมันหาเอาคน

เดียว...” เป็นคนโง่และประมาทในการใช้ชีวิตไปเสาะแสวงหาการติดเชื้อเอชไอวีมาเอง เพื่อนที่อยู่  
 วินมอเตอร์ไซด์ด้วยกันร่วมกันเหยียดหยามดูถูกและรุมกระหน่ำซ้ำเติมต่อว่าอย่างไม่น่าให้อภัย ซึ่ง  
 ได้รับการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลเป็นภาพลบในสายตาเพื่อนๆว่าเป็นบุคคลที่โง่ที่ไม่ฉลาดเลย  
 ซึ่งผู้ติดเชื้อก็ได้ตอบสนองกลับแบบฉบับพันกันใด “..จะเจอร้าย..เจอดีก็ตัวเฮา.. ไปเช่าที่น้องสูงเขา  
 มาถ่ายตวยลอ..” (ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนด้วย) ออกไปหาที่ใหม่และไม่ไปที่วินมอเตอร์ไซด์เดิมอีก

กรณีที่พบในกลุ่มร้านค้าชุมชนในหมู่บ้าน เป็นเรื่องเล่า จากชายคู่อายุ 30ปี  
 ทราบว่าตนเองติดเชื้อมานาน 7 ปี ได้รับการซ้ำเติมจากภรรยา จากแม่ค้าขายข้าวซอยในหมู่บ้าน  
 เพราะขณะกินข้าวซอยมีเลือดกำเดาไหลจากจมูก “..เจ้าของร้านก็ต่อว่า.. เสียลูกค้าหมด.. ป้าผู้ว่า  
 เป็นจะจ๊ะจะรังเกียจจะหยิ่งปาล้ำปาลี้อ...” (ไม่รู้ว่าเขาจะรังเกียจมากมายขนาดนี้) ซึ่งเขารู้สึก  
 เจ็บปวดที่ถูกเชือดเฉือนด้วยคำพูดจี้รบกวนบ้าน เพราะตนเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าปัญหาเอดส์เกิดจาก  
 ความผิดพลาดของตนเอง เมื่อถูกตอกย้ำ ตราบาปที่ได้รับก็ยิ่งทวีคูณและไม่กลับไปกินข้าวซอย  
 ร้านนั้นอีกเลย ยังมีการประเมินค่าของผู้ติดเชื้อในภาพลบมากมาย การรับรู้ในความรู้สึกนึกคิดที่ผู้  
 ติดเชื้อไม่ได้รับการกระทบแบบโดยตรงซึ่งหน้าเป็นรูปธรรมคำพูด แต่เป็นกริยาท่าทางที่ผู้ติดเชื้อ  
 สามารถเข้าใจได้ เช่น การมองหน้า การพูดนินทาหลังแล้วมีคนมาเล่าให้ฟัง ซึ่งสื่อถึงโชคร้ายที่  
 แฝงไปด้วยความน่ารังเกียจ เป็นคนที่ประมาทในการใช้ชีวิต น่าเหยียดหยาม โง่ เป็นคนที่ไม่น่า  
 อภัย เป็นคนที่เห็นแก่ตัว ที่ดูน่ากลัว น่าเป็นอันตรายตลอดจนเป็นภาระให้ผู้อื่นยามเจ็บป่วยและสุดท้ายก็ไร้ค่าดังคำพูดที่ว่า

“..เพื่อนบ้านมักพูดให้ได้ยินว่า..บางคนมีตุ่มออกอู๋ตัวอยู่แล้วแต่ตัวเก่า บ่ยอมฮับ..ผ่อแล้วน่าจะ  
 ขนาด..ย่อนมันฮ้าย มันล่าสอน..มันเลยเป็นเอดส์..”

(หญิงหม้าย อายุ 39 ปี ระยะเวลาที่ทราบตนเองว่าติดเชื้อมานาน 8 ปี 4 เดือน)

“...ญาติพี่น้องห่างๆกัน..เป็นจะดูแควน ..บ่อยากผ่อหน้าเฮา ..แต่ถ้าเวลามีกำรมีงาน..  
 เฮาเดินไปร่วมวง..เป็นจะผ่อหน้า...เขาว่าหื้อเจ้าเป็นคนเหลือก้า..ฟังเอาผิวตั้งแต่อายุ 17..”

(หญิงหม้าย อายุ 36 ปี ระยะเวลาที่ทราบตนเองว่าติดเชื้อมานาน 1 ปี)

“..ไปร่วมงานวัด งานศพ กินข้าวเฮาจะนั่งเองที่หนึ่ง ..บางครั้งเตียงคาบข้าวก็ไปกินที่บ้าน บางทีก็บ  
 อยู่เมีน..เขาผ่อเฮาอย่างเป็นทางการเป็นตัวเชื้อโรค เหมือนมันจะวิดใส่ได้..”

(หญิงหม้าย อายุ 30 ปี ระยะเวลาที่ทราบตนเองว่าติดเชื้อมานาน 10 ปี 6 เดือน)

จะเห็นได้ว่า ข้อค้นพบที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยคำถามปลายเปิด ผู้ศึกษาได้แสดงความถี่ของปรากฏการณ์หรือค่าตัวแปรทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ มาวิเคราะห์เป็นตัวเลขว่ามีทั้งสิ้นมีจำนวนที่รายในแต่ละเหตุการณ์ และพยายามนำเสนอเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เกิดความเข้าใจในความหลากหลาย ความหมายและความสัมพันธ์ในการเกิดของแต่ละเหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันในความหมายและทัศนคติของผู้ให้ข้อมูล กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สิ่งที่เราเรียกว่า “ทัศนคติของคนใน” เนื่องจากปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมทางสังคมในความหมายของตราบาปเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดและปรุงแต่งขึ้นโดยสังคม ภาพของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลมีในกรณีใดบ้างของปรากฏการณ์นั้น กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ ปรากฏการณ์สังคม ไม่ได้อยู่อย่างโดดๆด้วยตัวของมันเอง แต่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขบางประการและมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อม อาจกล่าวได้ว่า ปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดการรับรู้ที่เป็นตราบาปในด้านความมีอคติ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การประเมินคุณค่าส่วนบุคคลที่ผู้ติดเชื่อมีต่อตนเองและการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลที่บุคคลอื่นมีต่อผู้ติดเชื่อ ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ แต่มีการซ้อนทับและความเหลื่อมล้ำของแต่ละด้านอยู่ ด้วยความแตกต่างของปัจเจกบุคคลในด้านวัย เพศ ความประพฤติดส่วนตัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว มีการเชื่อมโยงกันอยู่ของแต่ละเหตุการณ์

#### 4.3 ความแตกต่างของการรับรู้ที่เป็นตราบาประหว่างปัจจัยพื้นฐานของผู้ติดเชื่อเฮอไอวีและผู้ป่วยเอดส์

การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้ที่เป็นตราบาปของผู้ติดเชื่อเฮอไอวีและผู้ป่วยเอดส์ตามปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยลักษณะทางประชากรและสังคม (ได้แก่ เพศ กลุ่มอายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ) ปัจจัยสภาพความเจ็บป่วยและความรุนแรงของโรค (ได้แก่ ระยะเวลาของการติดเชื่อ ระยะเวลาในการดำเนินของโรค การมีอาการของโรคเอดส์ การรับรู้สภาพร่างกายในขณะปัจจุบัน) ปัจจัยการรับรู้ถึงแหล่งที่นำเชื้อมาให้ตนเองและการเคยมีพฤติกรรมเสี่ยง (ได้แก่ การรับรู้ถึงแหล่งที่นำเชื้อเฮอไอวีมาให้ตนเองและการเคยมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื่อเฮอไอวี) ปัจจัยการมีส่วนร่วมและบทบาทในชมรมผู้ติดเชื่อเฮอไอวี (ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชมรม การมีบทบาทในชมรม) ที่แตกต่างกัน จะทดสอบด้วยสถิติ t-test หรือวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of variance) ตามความเหมาะสม แต่ถ้าการแจกแจงของข้อมูลมีการกระจายไม่เป็นโค้งปกติจะใช้สถิติ non-parametric โดยสถิติ Kruskal Wallis Test สำหรับการทดสอบวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of variance) กรณีที่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติแล้วจะได้ทำการเปรียบเทียบเชิงซ้อน (multiple comparisons) โดยใช้วิธีเชฟเฟ (Scheffe method) เพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไปว่าในตัวแปรดังกล่าวมีปัจจัยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้ที่เป็นตราบาป ด้านความมีอคติ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มีต่อตัวเอง และด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลที่บุคคลอื่นมีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มีระยะเวลาของการติดเชื้อและจำนวนอาการของโรคเอดส์ที่ต่างกันจะทำการทดสอบด้วยสถิติค่าสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ์เพียร์สัน

#### 4.3.1 ความแตกต่างของการรับรู้ที่เป็นตราบาปในด้านความมีอคติระหว่างปัจจัยพื้นฐาน

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ที่เป็นตราบาปด้านความมีอคติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์จำแนกตามเพศ การรับรู้สุขภาพร่างกายในขณะปัจจุบัน การรับรู้ถึงแหล่งที่นำเชื้อมาให้ตนเอง และการเคยมีพฤติกรรมเสี่ยง ทำการทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และทำการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตราบาปด้านความมีอคติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จำแนกตามกลุ่มอายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาของการติดเชื้อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชมรมผู้ติดเชื้อและบทบาทในชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทดสอบด้วยสถิติ Kruskal Wallis Test พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตราบาปด้านความมีอคติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ได้แก่ ระยะเวลาในการดำเนินของโรค การมีอาการของโรคเอดส์ และการมีตุ่มผื่นทางร่างกาย ด้วยสถิติ t-test พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (ดังรายละเอียดในตาราง 4.9)

ตาราง 4.9 ความแตกต่างคะแนนประเมินของการรับรู้ที่เป็นตราบาปด้านความผิดศีลระหว่าง  
ปัจจัยพื้นฐาน

| ปัจจัย (n = 108)                | Mean | S.D. | ค่าสถิติทดสอบ       | p-value |
|---------------------------------|------|------|---------------------|---------|
| 1.เพศ                           |      |      |                     |         |
| -ชาย (n = 38)                   | 1.53 | 0.31 | -1.223 <sup>1</sup> | 0.224   |
| -หญิง (n = 70)                  | 1.62 | 0.42 |                     |         |
| 2.กลุ่มอายุ                     |      |      |                     |         |
| -ต่ำกว่า 25 ปี (n = 13)         | 1.54 | 0.59 | 5.263 <sup>2</sup>  | 0.072   |
| - 25ปี - 35 ปี (n = 52)         | 1.65 | 0.39 |                     |         |
| -มากกว่า 35 ปี ขึ้นไป (n = 43)  | 1.52 | 0.30 |                     |         |
| 3.สถานภาพสมรส                   |      |      |                     |         |
| -โสด (n = 11)                   | 1.56 | 0.27 | 0.066 <sup>2</sup>  | 0.968   |
| -คู่ (n = 45)                   | 1.62 | 0.46 |                     |         |
| -หม้าย/หย่า/แยก (n = 52)        | 1.56 | 0.35 |                     |         |
| 4.การศึกษา                      |      |      |                     |         |
| -ไม่ได้เรียนหนังสือ (n = 13)    | 1.61 | 0.42 | 0.923 <sup>2</sup>  | 0.630   |
| -ระดับประถมศึกษา(n = 69)        | 1.57 | 0.37 |                     |         |
| -มัธยมศึกษาขึ้นไป (n = 26)      | 1.64 | 0.44 |                     |         |
| 5.ฐานะทางเศรษฐกิจ               |      |      |                     |         |
| -ต่ำกว่า 2,500 บาท (n = 59)     | 1.64 | 0.43 | 2.611 <sup>2</sup>  | 0.271   |
| - 2,500 – 5,000 บาท (n = 39)    | 1.52 | 0.34 |                     |         |
| -มากกว่า 5,000 บาท (n = 10)     | 1.57 | 0.31 |                     |         |
| 6.ระยะเวลาของการติดเชื่อเฮชไอวี |      |      |                     |         |
| -น้อยกว่า 1ปี (n = 38)          | 1.59 | 0.54 | 0.569 <sup>2</sup>  | 0.752   |
| - 1 – 5 ปี (n = 27)             | 1.58 | 0.36 |                     |         |
| -มากกว่า 5 ปี (n = 43)          | 1.59 | 0.34 |                     |         |

ตาราง 4.9 (ต่อ)

| ปัจจัย (n = 108)                    | Mean | S.D. | ค่าสถิติทดสอบ       | p-value |
|-------------------------------------|------|------|---------------------|---------|
| 7.ระยะเวลาในการดำเนินของโรคเอดส์    |      |      |                     |         |
| -ระยะปรากฏอาการ (n = 59)            | 1.67 | 0.42 | -2.366 <sup>1</sup> | 0.020*  |
| -ระยะไม่ปรากฏอาการ (n = 49)         | 1.50 | 0.32 |                     |         |
| 8.การมีอาการของโรคเอดส์             |      |      |                     |         |
| -มีอาการ (n = 71)                   | 1.65 | 0.42 | -2.717 <sup>1</sup> | 0.008*  |
| -ไม่มีอาการ (n = 37)                | 1.47 | 0.28 |                     |         |
| 9.การมีตุ่มผื่นทางร่างกาย           |      |      |                     |         |
| -มีตุ่มผื่น (n = 28)                | 1.72 | 0.41 | -2.030 <sup>1</sup> | 0.048*  |
| -ไม่มีตุ่มผื่น (n = 80)             | 1.54 | 0.37 |                     |         |
| 10.การรับรู้สุขภาพร่างกายในปัจจุบัน |      |      |                     |         |
| -แข็งแรงดี (n = 61)                 | 1.58 | 0.40 | -0.406 <sup>1</sup> | 0.685   |
| -อ่อนเพลีย (n = 47)                 | 1.61 | 0.37 |                     |         |
| 11.แหล่งที่นำเชื้อเอชไอวีมาให้ตนเอง |      |      |                     |         |
| -จากคูสมรส (n = 65)                 | 1.59 | 0.36 | -0.136 <sup>1</sup> | 0.892   |
| -จากผู้อื่นและสาเหตุอื่น (n = 43)   | 1.60 | 0.43 |                     |         |
| 12.พฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อ      |      |      |                     |         |
| -มีพฤติกรรมเสี่ยง (n = 75)          | 1.60 | 0.42 | -0.520 <sup>1</sup> | 0.605   |
| -ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง (n = 33)       | 1.56 | 0.32 |                     |         |
| 13.การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรม    |      |      |                     |         |
| -ร่วมกิจกรรมแทบทุกเดือน(n=53)       | 1.65 | 0.43 | 2.175 <sup>2</sup>  | 0.337   |
| -ร่วมกิจกรรมนานๆครั้ง (n=25)        | 1.57 | 0.40 |                     |         |
| -ไม่เคยร่วมกิจกรรมเลย (n=30)        | 1.50 | 0.27 |                     |         |



ตาราง 4.9 (ต่อ)

| ปัจจัย (n = 108)                 | Mean | S.D. | ค่าสถิติทดสอบ      | p-value |
|----------------------------------|------|------|--------------------|---------|
| 14.บทบาทในชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี |      |      |                    |         |
| -เป็นแกนนำในชมรม (n = 17)        | 1.67 | 0.44 | 3.228 <sup>2</sup> | 0.199   |
| -เป็นสมาชิกชมรม (n = 61)         | 1.62 | 0.42 |                    |         |
| -ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรม (n = 30)   | 1.47 | 0.24 |                    |         |

หมายเหตุ <sup>1</sup> หมายถึง ค่าสถิติทดสอบ t ของ t-test

<sup>2</sup> หมายถึง ค่าสถิติทดสอบ Chi-Square ของ Kruskal Wallis Test

\* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

#### 4.3.2 ความแตกต่างของการรับรู้ที่เป็นตราบาปในด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างระหว่างปัจจัยพื้นฐาน

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตราบาป ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จำแนกตามเพศ การรับรู้ถึงแหล่งที่นำเชื้อมาให้ตนเอง และการเคยมีพฤติกรรมเสี่ยง ด้วยสถิติ t-test พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และทำการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนตราบาปด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์จำแนกตาม สถานภาพสมรส การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาของการติดเชื้อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชมรมผู้ติดเชื้อ และบทบาทในชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นในกลุ่มอายุที่ต่างกันพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( p-value = 0.001 )

ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนตราบาปด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์จำแนกตาม ระยะเวลาในการดำเนินของโรค การมีอาการของโรคเอดส์และการมีตุ่มผื่นทางร่างกาย การรับรู้สภาพร่างกายในขณะปัจจุบัน ด้วยสถิติ t-test พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ดังรายละเอียดในตาราง 4.10)

ตาราง 4.10 ความแตกต่างคะแนนประเมินของการรับรู้ที่เป็นตราบาปด้านการมีปฏิสัมพันธ์  
ทางสังคมระหว่างปัจจัยพื้นฐาน

| ปัจจัย (n = 108)               | Mean | S.D. | ค่าสถิติทดสอบ       | p-value |
|--------------------------------|------|------|---------------------|---------|
| 1. เพศ                         |      |      |                     |         |
| -ชาย (n = 38)                  | 1.35 | 0.30 | -1.022 <sup>1</sup> | 0.309   |
| -หญิง (n = 70)                 | 1.42 | 0.36 |                     |         |
| 2. กลุ่มอายุ                   |      |      |                     |         |
| -ต่ำกว่า 25 ปี (n = 13)        | 1.16 | 0.32 | 15.503 <sup>2</sup> | 0.001*  |
| -25ปี - 35 ปี (n = 52)         | 1.50 | 0.37 |                     |         |
| -มากกว่า 35 ปีขึ้นไป (n = 43)  | 1.34 | 0.27 |                     |         |
| 3. สถานภาพสมรส                 |      |      |                     |         |
| -โสด (n = 11)                  | 1.27 | 0.17 | 1.137 <sup>2</sup>  | 0.566   |
| -คู่ (n = 45)                  | 1.44 | 0.39 |                     |         |
| -หม้าย/หย่า/แยก (n = 52)       | 1.38 | 0.32 |                     |         |
| 4. การศึกษา                    |      |      |                     |         |
| -ไม่ได้เรียนหนังสือ (n = 13)   | 1.34 | 0.38 | 0.923 <sup>2</sup>  | 0.630   |
| -ระดับประถมศึกษา (n = 69)      | 1.42 | 0.35 |                     |         |
| -มัธยมศึกษาขึ้นไป (n = 26)     | 1.36 | 0.28 |                     |         |
| 5. ฐานะทางเศรษฐกิจ             |      |      |                     |         |
| -ต่ำกว่า 2,500 บาท (n = 59)    | 1.45 | 0.36 | 3.837 <sup>2</sup>  | 0.147   |
| -2,500 – 5,000 บาท (n = 39)    | 1.33 | 0.32 |                     |         |
| -มากกว่า 5,000 บาท (n = 10)    | 1.33 | 0.29 |                     |         |
| 6. ระยะเวลาของการติดต่อเอชไอวี |      |      |                     |         |
| -น้อยกว่า 1ปี (n = 38)         | 1.42 | 0.43 | 1.473 <sup>2</sup>  | 0.479   |
| -1 – 5 ปี (n = 27)             | 1.36 | 0.31 |                     |         |
| -มากกว่า 5 ปี (n = 43)         | 1.42 | 0.32 |                     |         |

ตาราง 4.10 (ต่อ)

| ปัจจัย (n = 108)                     | Mean | S.D. | ค่าสถิติทดสอบ       | p-value |
|--------------------------------------|------|------|---------------------|---------|
| 7.ระยะเวลาในการดำเนินของโรคเอดส์     |      |      |                     |         |
| -ระยะปรากฏอาการ (n = 59)             | 1.49 | 0.34 | -3.184 <sup>1</sup> | 0.002*  |
| -ระยะไม่ปรากฏอาการ (n = 49)          | 1.29 | 0.31 |                     |         |
| 8. การมีอาการของโรคเอดส์             |      |      |                     |         |
| -มีอาการ (n = 71)                    | 1.46 | 0.37 | -3.141 <sup>1</sup> | 0.002*  |
| -ไม่มีอาการ (n = 37)                 | 1.28 | 0.25 |                     |         |
| 9. การมีตุ่มผื่นทางร่างกาย           |      |      |                     |         |
| -มีตุ่มผื่น (n = 28)                 | 1.55 | 0.38 | 2.511 <sup>1</sup>  | 0.016*  |
| -ไม่มีตุ่มผื่น (n = 80)              | 1.35 | 0.31 |                     |         |
| 10. การรับรู้สุขภาพร่างกายในปัจจุบัน |      |      |                     |         |
| -แข็งแรงดี (n = 61)                  | 1.34 | 0.32 | -2.007 <sup>1</sup> | 0.047*  |
| -อ่อนเพลีย (n = 47)                  | 1.47 | 0.35 |                     |         |
| 11. แหล่งที่นำเชื้อเอชไอวีมาให้ตนเอง |      |      |                     |         |
| -จากคูสมรส (n = 65)                  | 1.37 | 0.32 | -0.904 <sup>1</sup> | 0.368   |
| -จากผู้อื่นและสาเหตุอื่น (n = 43)    | 1.44 | 0.37 |                     |         |
| 12. พฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อ      |      |      |                     |         |
| -มีพฤติกรรมเสี่ยง (n = 75)           | 1.41 | 0.36 | -0.394 <sup>1</sup> | 0.694   |
| -ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง (n = 33)        | 1.38 | 0.29 |                     |         |
| 13. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรม    |      |      |                     |         |
| -ร่วมกิจกรรมแทบทุกเดือน (n = 53)     | 1.42 | 0.34 | 1.802 <sup>2</sup>  | 0.406   |
| -ร่วมกิจกรรมนานๆครั้ง (n = 25)       | 1.43 | 0.37 |                     |         |
| -ไม่เคยร่วมกิจกรรมเลย (n = 30)       | 1.33 | 0.31 |                     |         |
| 14. บทบาทในชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี    |      |      |                     |         |
| -เป็นแกนนำในชมรม (n = 17)            | 1.44 | 0.40 | 3.729 <sup>2</sup>  | 0.155   |
| -เป็นสมาชิกชมรม (n = 61)             | 1.43 | 0.33 |                     |         |
| -ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรม (n = 30)       | 1.31 | 0.31 |                     |         |

หมายเหตุ<sup>1</sup> หมายถึง ค่าสถิติทดสอบ t ของ t-test

<sup>2</sup> หมายถึง ค่าสถิติทดสอบ Chi-Square ของ Kruskal Wallis Test

\* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

#### 4.3.3 ความแตกต่างของการรับรู้ที่เป็นตราบาปในด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มีต่อตนเองระหว่างปัจจัยพื้นฐาน

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตราบาปด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มีต่อตนเอง จำแนกตามเพศ การมีตุ่มผื่นทางร่างกาย การรับรู้สภาพร่างกายในขณะปัจจุบัน การเคยมีพฤติกรรมเสี่ยง ด้วยสถิติ t-test พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และทำการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตราบาปด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มีต่อตนเอง จำแนกตามกลุ่มอายุ ฐานะทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาของการติดเชื้อ ด้วยสถิติวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตราบาป ด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มีต่อตนเองจำแนกตาม ระยะเวลาในการดำเนินของโรค การมีอาการของโรคเอดส์ การรับรู้ถึงแหล่งที่นำเชื้อมาให้ตนเอง ด้วยสถิติ t-test พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p$ -value = 0.005 และ 0.001)

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนตราบาปด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มีต่อตนเองจำแนกตามสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชมรมผู้ติดเชื้อและบทบาทในชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี ด้วยสถิติวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อได้เปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยใช้วิธีเชฟเฟ พบว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มีสถานภาพสมรสโสด (Mean=2.75) กับผู้ที่เป็นหม้าย หย่า แยก (Mean=2.20) มีความแตกต่างของการรับรู้ที่เป็นตราบาปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p$ -value=0.043) และผู้ที่มีสถานภาพสมรสคู่ (Mean=2.45) กับผู้ที่เป็นหม้าย หย่า แยก (Mean=2.20) พบว่ามีความแตกต่างกันของการรับรู้ที่เป็นตราบาปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน ( $p$ -value=0.020) เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาพบว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ (Mean=1.92) กับผู้ที่เรียนจบระดับประถมศึกษา (Mean=2.39) มีความแตกต่างของการรับรู้ที่เป็นตราบาปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p$ -value=0.013) และผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ (Mean=1.92) กับผู้ที่เรียนจบระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป (Mean = 2.51) พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p$ -value=

0.003) เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมและบทบาทในชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี พบว่าผู้ที่ร่วมกิจกรรมของชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวีนานๆครั้ง (Mean = 2.53) กับผู้ที่ร่วมกิจกรรมของชมรมแทบทุกเดือน (Mean=2.17) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.001) และผู้ที่ร่วมกิจกรรมของชมรมแทบทุกเดือน (Mean = 2.17) กับผู้ที่ไม่เคยร่วมกิจกรรมของชมรมเลย (Mean = 2.56) พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.001) สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี (Mean = 2.54) กับผู้ที่เป็นแกนนำชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี (Mean=2.06) พบว่ามีความแตกต่างของการรับรู้ที่เป็นตราบาปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.012) (ดังรายละเอียดในตาราง 4.11)

ตาราง 4.11 ความแตกต่างคะแนนประเมินของการรับรู้ที่เป็นตราบาปด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มีต่อตนเองระหว่างปัจจัยพื้นฐาน

| ปัจจัย (n = 108)               | Mean | S.D. | ค่าสถิติทดสอบ      | p-value |
|--------------------------------|------|------|--------------------|---------|
| 1.เพศ                          |      |      |                    |         |
| -ชาย (n = 38)                  | 2.64 | 0.57 | 1.845 <sup>1</sup> | 0.068   |
| -หญิง (n = 70)                 | 2.20 | 0.46 |                    |         |
| 2.กลุ่มอายุ                    |      |      |                    |         |
| -ต่ำกว่า 25 ปี (n = 13)        | 2.31 | 0.49 | 0.570 <sup>2</sup> | 0.568   |
| - 25ปี - 35 ปี (n = 52)        | 2.42 | 0.54 |                    |         |
| - มากกว่า 35 ปีขึ้นไป (n = 43) | 2.31 | 0.56 |                    |         |
| 3.สถานภาพสมรส                  |      |      |                    |         |
| - โสด (n = 11)                 | 2.75 | 0.57 | 6.309 <sup>2</sup> | 0.003*  |
| - คู่ (n = 45)                 | 2.45 | 0.50 |                    |         |
| - หม้าย/หย่า/แยก (n = 52)      | 2.20 | 0.51 |                    |         |
| 4.การศึกษา                     |      |      |                    |         |
| - ไม่ได้เรียนหนังสือ (n = 13)  | 1.92 | 0.56 | 6.002 <sup>2</sup> | 0.003*  |
| - ระดับประถมศึกษา (n = 69)     | 2.39 | 0.51 |                    |         |
| - มัธยมศึกษาขึ้นไป (n = 26)    | 2.51 | 0.52 |                    |         |

ตาราง 4.11 (ต่อ)

| ปัจจัย (n = 108)                     | Mean | S.D. | ค่าสถิติทดสอบ       | p-value |
|--------------------------------------|------|------|---------------------|---------|
| 5.ฐานะทางเศรษฐกิจ                    |      |      |                     |         |
| - ต่ำกว่า 2,500 บาท (n = 59)         | 2.25 | 0.52 | 2.521 <sup>2</sup>  | 0.085   |
| - 2,500 – 5,000 บาท (n = 39)         | 2.49 | 0.53 |                     |         |
| - มากกว่า 5,000 บาท (n = 10)         | 2.47 | 0.63 |                     |         |
| 6. ระยะเวลาของการติดเชื้อเอชไอวี     |      |      |                     |         |
| - น้อยกว่า 1 ปี (n = 38)             | 2.44 | 0.52 | 0.792 <sup>2</sup>  | 0.455   |
| - 1 – 5 ปี (n = 27)                  | 2.28 | 0.53 |                     |         |
| - มากกว่า 5 ปี (n = 43)              | 2.40 | 0.55 |                     |         |
| 7. ระยะเวลาในการดำเนินของโรคเอดส์    |      |      |                     |         |
| - ระยะเวลาปรากฏอาการ (n = 59)        | 2.52 | 0.55 | -3.572 <sup>1</sup> | 0.001*  |
| - ระยะเวลาไม่ปรากฏอาการ (n = 49)     | 2.17 | 0.47 |                     |         |
| 8. การมีอาการของโรคเอดส์             |      |      |                     |         |
| - มีอาการ (n = 71)                   | 2.46 | 0.57 | -2.899 <sup>1</sup> | 0.005*  |
| - ไม่มีอาการ (n = 37)                | 2.18 | 0.43 |                     |         |
| 9. การมีตุ่มผื่นทางร่างกาย           |      |      |                     |         |
| - มีตุ่มผื่น (n = 28)                | 2.55 | 0.64 | -1.913 <sup>1</sup> | 0.063   |
| - ไม่มีตุ่มผื่น (n = 80)             | 2.30 | 0.49 |                     |         |
| 10. การรับรู้สุขภาพร่างกายในปัจจุบัน |      |      |                     |         |
| - แข็งแรงดี (n = 61)                 | 2.27 | 0.40 | -1.981 <sup>1</sup> | 0.050   |
| - อ่อนเพลีย (n = 47)                 | 2.48 | 0.66 |                     |         |
| 11. แหล่งที่นำเชื้อเอชไอวีมาให้ตนเอง |      |      |                     |         |
| - จากคูสมรส (n = 65)                 | 2.18 | 0.45 | -4.889 <sup>1</sup> | 0.001*  |
| - จากผู้อื่นและสาเหตุอื่น (n = 43)   | 2.65 | 0.54 |                     |         |

ตาราง 4.11 (ต่อ)

| ปัจจัย (n = 108)                  | Mean | S.D. | ค่าสถิติทดสอบ       | p-value |
|-----------------------------------|------|------|---------------------|---------|
| 12. พฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อ   |      |      |                     |         |
| - มีพฤติกรรมเสี่ยง (n = 75)       | 2.42 | 0.59 | -1.955 <sup>1</sup> | 0.054   |
| - ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง (n = 33)    | 2.23 | 0.39 |                     |         |
| 13. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรม |      |      |                     |         |
| - ร่วมกิจกรรมแทบทุกเดือน (n = 53) | 2.17 | 0.50 | 7.101 <sup>2</sup>  | 0.001*  |
| - ร่วมกิจกรรมนานๆครั้ง (n = 25)   | 2.53 | 0.55 |                     |         |
| - ไม่เคยร่วมกิจกรรมเลย (n = 30)   | 2.56 | 0.49 |                     |         |
| 14. บทบาทในชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี |      |      |                     |         |
| - เป็นแกนนำในชมรม (n = 17)        | 1.44 | 0.40 | 4.639 <sup>2</sup>  | 0.012*  |
| - เป็นสมาชิกชมรม (n = 61)         | 1.43 | 0.33 |                     |         |
| - ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรม (n = 30)   | 1.31 | 0.31 |                     |         |

หมายเหตุ <sup>1</sup> หมายถึง ค่าสถิติทดสอบ t ของ t-test

<sup>2</sup> หมายถึง ค่าสถิติทดสอบ F ของ One Way Analysis of variance

\* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

#### 4.3.4 ความแตกต่างของการรับรู้ตราบาปในด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลที่บุคคลอื่นมีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตราบาปด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลที่บุคคลอื่นมีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จำแนกตามเพศ การมีตุ่มผื่นทางร่างกาย การรับรู้สภาพร่างกายในขณะปัจจุบัน การเคยมีพฤติกรรมเสี่ยง ด้วยสถิติ t-test พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และทำการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนตราบาปด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลที่บุคคลอื่นมีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์จำแนกตามกลุ่มอายุ ฐานะทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาของการติดเชื้อ การมีบทบาทในชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี ด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนทราบาปด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลที่บุคคลอื่นมีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จำแนกตามสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชมรมผู้ติดเชื้อ ด้วยสถิติวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการเปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยวิธีเชฟเฟพบว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มีสถานภาพสมรสเสด (Mean=2.78) กับผู้ที่เป็นหม้าย หย่า แยก (Mean=2.30) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value= 0.043) และผู้ที่มีสถานภาพสมรสคู่ (Mean=2.63) กับผู้ที่เป็นหม้าย หย่า แยก (Mean = 2.30) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.020) เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาพบว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ (Mean =1.98) กับผู้ที่เรียนจบชั้นประถมศึกษา (Mean=2.51) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.011) และพบว่าผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ (Mean =1.98) กับผู้ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป (Mean =2.65) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.004)

ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนทราบาป ด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลที่ผู้อื่นมีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จำแนกตามระยะเวลาในการดำเนินของโรค อาการของโรคเอดส์ และการรับรู้ถึงแหล่งที่นำเชื้อมาให้ตนเอง ทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.029 และ 0.001) ตามลำดับ (ดังรายละเอียดในตาราง 4.12)

ตาราง 4.12 ความแตกต่างคะแนนประเมินของการรับรู้ที่เป็นทราบาปด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลที่บุคคลอื่นมีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน

| ปัจจัย (n = 108)               | Mean | S.D. | ค่าสถิติทดสอบ      | p-value |
|--------------------------------|------|------|--------------------|---------|
| 1. เพศ                         |      |      |                    |         |
| -ชาย (n = 38)                  | 2.04 | 0.35 | 1.680 <sup>1</sup> | 0.096   |
| -หญิง (n = 70)                 | 1.92 | 0.37 |                    |         |
| 2. กลุ่มอายุ                   |      |      |                    |         |
| -ต่ำกว่า 25 ปี (n = 13)        | 2.43 | 0.55 | 0.819 <sup>2</sup> | 0.444   |
| -25ปี - 35 ปี (n = 52)         | 2.56 | 0.63 |                    |         |
| -มากกว่า 35 ปี ขึ้นไป (n = 43) | 2.41 | 0.57 |                    |         |



ตาราง 4.12 (ต่อ)

| ปัจจัย (n = 108)                  |          | Mean | S.D. | ค่าสถิติทดสอบ       | p-value |
|-----------------------------------|----------|------|------|---------------------|---------|
| 3. สถานภาพสมรส                    |          |      |      |                     |         |
| -โสด                              | (n = 11) | 2.78 | 0.63 | 5.675 <sup>2</sup>  | 0.005*  |
| -คู่                              | (n = 45) | 2.63 | 0.55 |                     |         |
| -หม้าย/หย่า/แยก                   | (n = 52) | 2.30 | 0.58 |                     |         |
| 4. การศึกษา                       |          |      |      |                     |         |
| -ไม่ได้เรียนหนังสือ               | (n = 13) | 1.98 | 0.61 | 6.216 <sup>2</sup>  | 0.003*  |
| -ระดับประถมศึกษา                  | (n = 69) | 2.51 | 0.58 |                     |         |
| -มัธยมศึกษาขึ้นไป                 | (n = 26) | 2.65 | 0.52 |                     |         |
| 5. ฐานะทางเศรษฐกิจ                |          |      |      |                     |         |
| -ต่ำกว่า 2,500 บาท                | (n = 59) | 2.38 | 0.60 | 2.024 <sup>2</sup>  | 0.137   |
| -2,500 – 5,000 บาท                | (n = 39) | 2.62 | 0.56 |                     |         |
| -มากกว่า 5,000 บาท                | (n = 10) | 2.55 | 0.66 |                     |         |
| 6. ระยะเวลาของการติดเชื้อเอชไอวี  |          |      |      |                     |         |
| -น้อยกว่า 1 ปี                    | (n = 38) | 2.55 | 0.59 | 1.897 <sup>2</sup>  | 0.155   |
| -1 – 5 ปี                         | (n = 27) | 2.35 | 0.55 |                     |         |
| -มากกว่า 5 ปี                     | (n = 43) | 2.59 | 0.64 |                     |         |
| 7. ระยะเวลาในการดำเนินของโรคเอดส์ |          |      |      |                     |         |
| -ระยะปรากฏอาการ                   | (n = 59) | 2.70 | 0.59 | -4.656 <sup>1</sup> | 0.001*  |
| -ระยะไม่ปรากฏอาการ                | (n = 49) | 2.22 | 0.49 |                     |         |
| 8. การมีอาการของโรคเอดส์          |          |      |      |                     |         |
| -มีอาการ                          | (n = 71) | 2.56 | 0.66 | -2.209 <sup>1</sup> | 0.029*  |
| -ไม่มีอาการ                       | (n = 37) | 2.33 | 0.42 |                     |         |
| 9. แยกตามตุ่มผื่นร่างกาย          |          |      |      |                     |         |
| -มีอาการ                          | (n = 28) | 2.69 | 0.74 | -1.875 <sup>1</sup> | 0.069   |
| -ไม่มีอาการ                       | (n = 80) | 2.41 | 0.52 |                     |         |

ตาราง 4.12 (ต่อ)

| ปัจจัย (n = 108)                     | Mean | S.D. | ค่าสถิติทดสอบ       | p-value |
|--------------------------------------|------|------|---------------------|---------|
| 10. การรับรู้สภาพร่างกายในปัจจุบัน   |      |      |                     |         |
| -แข็งแรงดี (n = 61)                  | 2.41 | 0.44 | -1.532 <sup>1</sup> | 0.128   |
| -อ่อนเพลีย (n = 47)                  | 2.58 | 0.75 |                     |         |
| 11. แหล่งที่นำเชื้อเอชไอวีมาให้ตนเอง |      |      |                     |         |
| -จากคูสมรส (n = 65)                  | 2.33 | 0.56 | -3.385 <sup>1</sup> | 0.001*  |
| -จากผู้อื่นและสาเหตุอื่น (n = 43)    | 2.71 | 0.59 |                     |         |
| 12. พฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อ      |      |      |                     |         |
| -มีพฤติกรรมเสี่ยง (n = 75)           | 2.54 | 0.64 | -1.630 <sup>1</sup> | 0.107   |
| -ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง (n = 33)        | 2.36 | 0.47 |                     |         |
| 13. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรม    |      |      |                     |         |
| -ร่วมกิจกรรมแทบทุกเดือน (n = 53)     | 2.29 | 0.61 | 6.204 <sup>2</sup>  | 0.001*  |
| -ร่วมกิจกรรมนานๆครั้ง (n = 25)       | 2.67 | 0.62 |                     |         |
| -ไม่เคยร่วมกิจกรรมเลย (n = 30)       | 2.68 | 0.44 |                     |         |
| 14. บทบาทในชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี    |      |      |                     |         |
| -เป็นแกนนำในชมรม (n = 17)            | 2.22 | 0.63 | 2.568 <sup>2</sup>  | 0.081   |
| -เป็นสมาชิกชมรม (n = 61)             | 2.49 | 0.63 |                     |         |
| -ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรม (n = 30)       | 2.63 | 0.50 |                     |         |

หมายเหตุ<sup>1</sup> หมายถึง ค่าสถิติทดสอบ T ของ t-test

<sup>2</sup> หมายถึง ค่าสถิติทดสอบ F ของ One Way Analysis of variance

\* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

#### 4.3.5 ความแตกต่างของการรับรู้ที่เป็นตราบาปในภาพรวมระหว่างปัจจัยพื้นฐานของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตราบาปรวมทุกด้านของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จำแนกตามเพศ และการรับรู้สภาพร่างกายในขณะปัจจุบัน ด้วยสถิติ t-test พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และทำการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตราบาปของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จำแนกตามกลุ่มอายุ ฐานะทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาของการติดเชื้อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและบทบาทในชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี ด้วยสถิติวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนตราบาปรวมทุกด้านของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จำแนกตามสถานภาพสมรส และระดับการศึกษา ด้วยสถิติวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และผลการเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้สถิติเซฟเฟ พบว่า ผู้ที่มีสถานภาพสมรสหม้าย หย่า แยก (Mean=1.86) กับผู้ที่มีสถานภาพสมรสคู่ (Mean=2.04) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.048) และเมื่อพิจารณาระดับการศึกษาพบว่า ผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ (Mean = 1.71) กับ ผู้ที่มีเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป (Mean=2.04) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.027)

ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ที่เป็นตราบาปในภาพรวมทุกด้านของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จำแนกตามกลุ่มผู้ที่มีระยะเวลาในการดำเนินของโรค การมีอาการของโรคเอดส์ การมีตุ่มผื่นทางร่างกายและการรับรู้ถึงแหล่งที่นำเชื้อมาให้ตนเองนั้น ทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ดังรายละเอียดในตาราง 4.13)

ตาราง 4.13 ความแตกต่างคะแนนประเมินของการรับรู้ที่เป็นตราบาปในภาพรวมระหว่าง

ปัจจัยพื้นฐาน

| ปัจจัย (n = 108)                  | Mean | S.D. | ค่าสถิติทดสอบ      | p-value |
|-----------------------------------|------|------|--------------------|---------|
| 1. เพศ                            |      |      |                    |         |
| -ชาย (n = 38)                     | 2.04 | 0.35 | 1.680 <sup>1</sup> | 0.096   |
| -หญิง (n = 70)                    | 1.92 | 0.37 |                    |         |
| 2. กลุ่มอายุ                      |      |      |                    |         |
| -ต่ำกว่า 25 ปี (n = 13)           | 1.87 | 0.40 | 2.191 <sup>2</sup> | 0.117   |
| - 25ปี - 35 ปี (n = 52)           | 2.03 | 0.37 |                    |         |
| - มากกว่า 35 ปี ขึ้นไป (n = 43)   | 1.90 | 0.34 |                    |         |
| 3. สถานภาพสมรส                    |      |      |                    |         |
| - โสด (n = 11)                    | 2.09 | 0.33 | 3.884 <sup>2</sup> | 0.024*  |
| - คู่ (n = 45)                    | 2.04 | 0.35 |                    |         |
| - หม้าย/หย่า/แยก (n = 52)         | 1.86 | 0.36 |                    |         |
| 4. การศึกษา                       |      |      |                    |         |
| - ไม่ได้เรียนหนังสือ (n = 13)     | 1.71 | 0.37 | 3.883 <sup>2</sup> | 0.024*  |
| - ระดับประถมศึกษา (n = 69)        | 1.97 | 0.36 |                    |         |
| - มัธยมศึกษาขึ้นไป (n = 26)       | 2.04 | 0.35 |                    |         |
| 5. ฐานะทางเศรษฐกิจ                |      |      |                    |         |
| - ต่ำกว่า 2,500 บาท (n = 59)      | 1.93 | 0.37 | 0.324 <sup>2</sup> | 0.724   |
| - 2,500 – 5,000 บาท (n = 39)      | 1.99 | 0.34 |                    |         |
| - มากกว่า 5,000 บาท (n = 10)      | 1.98 | 0.41 |                    |         |
| 6. ระยะเวลาของการติดเชื้อเอชไอวี  |      |      |                    |         |
| - น้อยกว่า 1ปี (n = 38)           | 1.95 | 0.39 | 0.655 <sup>2</sup> | 0.521   |
| - 1 – 5 ปี (n = 27)               | 1.90 | 0.31 |                    |         |
| - มากกว่า 5 ปี (n = 43)           | 2.00 | 0.37 |                    |         |
| 7. ระยะเวลาในการดำเนินของโรคเอดส์ |      |      |                    |         |
| - ระยะปรากฏอาการ (n = 59)         | 2.10 | 0.37 | 4.760 <sup>1</sup> | 0.001*  |
| - ระยะไม่ปรากฏอาการ (n = 49)      | 1.80 | 0.29 |                    |         |

ตาราง 4.13 (ต่อ)

| ปัจจัย (n = 108)                     | Mean | S.D. | ค่าสถิติทดสอบ       | p-value |
|--------------------------------------|------|------|---------------------|---------|
| 8. การมีอาการของโรคเอดส์             |      |      |                     |         |
| -มีอาการ (n = 71)                    | 2.03 | 0.39 | -3.575 <sup>1</sup> | 0.001*  |
| -ไม่มีอาการ (n = 37)                 | 1.81 | 0.25 |                     |         |
| 9. การมีตุ่มผื่นทางร่างกาย           |      |      |                     |         |
| -มีตุ่มผื่น (n = 28)                 | 2.13 | 0.43 | -2.608 <sup>1</sup> | 0.013*  |
| -ไม่มีตุ่มผื่น (n = 80)              | 1.90 | 0.32 |                     |         |
| 10. การรับรู้สุขภาพร่างกายในปัจจุบัน |      |      |                     |         |
| -แข็งแรงดี (n = 61)                  | 1.90 | 0.30 | -1.940 <sup>1</sup> | 0.055   |
| -อ่อนเพลีย (n = 47)                  | 2.04 | 0.43 |                     |         |
| 11. แหล่งที่นำเชื้อเอชไอวีมาให้ตนเอง |      |      |                     |         |
| -จากคูสมรส (n = 65)                  | 1.87 | 0.33 | -3.281 <sup>1</sup> | 0.002*  |
| -จากผู้อื่นและสาเหตุอื่น (n = 43)    | 2.10 | 0.37 |                     |         |
| 12. พฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อ      |      |      |                     |         |
| -มีพฤติกรรมเสี่ยง (n = 75)           | 1.99 | 0.40 | -1.420 <sup>1</sup> | 0.159   |
| -ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง (n = 33)        | 1.88 | 0.27 |                     |         |
| 13. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรม    |      |      |                     |         |
| -ร่วมกิจกรรมแทบทุกเดือน (n = 53)     | 1.88 | 0.39 | 2.374 <sup>2</sup>  | 0.098   |
| -ร่วมกิจกรรมนานๆครั้ง (n = 25)       | 2.05 | 0.38 |                     |         |
| -ไม่เคยร่วมกิจกรรมเลย (n = 30)       | 2.02 | 0.29 |                     |         |
| 14. บทบาทในชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี    |      |      |                     |         |
| -เป็นแกนนำในชมรม (n = 17)            | 1.85 | 0.39 | 0.964 <sup>2</sup>  | 0.385   |
| -เป็นสมาชิกชมรม (n = 61)             | 1.98 | 0.39 |                     |         |
| -ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรม (n = 30)       | 1.99 | 0.29 |                     |         |

หมายเหตุ<sup>1</sup> หมายถึง ค่าสถิติทดสอบ T ของ t-test

<sup>2</sup> หมายถึง ค่าสถิติทดสอบ F ของ One Way Analysis of variance

\* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

#### 4.3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาของการติดเชื้อและจำนวนอาการของโรคเอดส์กับการรับรู้ที่เป็นตราบาปของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการรับรู้ที่เป็นตราบาปต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ที่มีระยะเวลาของการติดเชื้อ และจำนวนอาการของโรคเอดส์ที่เกิดขึ้นกับผู้ติดเชื้อ พบว่าการรับรู้ที่เป็นตราบาปด้านความมีอคติ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มีต่อตนเอง ด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลที่ผู้อื่นมีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์และในภาพรวมของทุกด้าน ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาของการติดเชื้อเอชไอวีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่การมีจำนวนอาการของโรคเอดส์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ที่เป็นตราบาปด้านความมีอคติ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มีต่อตนเอง ด้านการประเมินคุณค่าส่วนบุคคลที่ผู้อื่นมีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ และในภาพรวมของทุกด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ดังรายละเอียดในตาราง 4.14)

ตาราง 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาของการติดเชื้อและระดับความรุนแรงของโรคกับการรับรู้ที่เป็นตราบาปของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

| การรับรู้ที่เป็นตราบาป<br>ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี<br>และผู้ป่วยเอดส์ | ปัจจัย (n = 108)       |         |                        |         |
|--|------------------------|---------|------------------------|---------|
|  | ระยะเวลาของการติดเชื้อ |         | จำนวนอาการของโรคเอดส์  |         |
|  | Pearson<br>Correlation | p-value | Pearson<br>Correlation | p-value |
| ภาพรวมของทุกด้าน   | 0.099                  | 0.309   | 0.393                  | 0.001*  |
| ด้านความมีอคติ   | 0.006                  | 0.949   | 0.261                  | 0.006*  |
| ด้านการมีปฏิสัมพันธ์<br>ทางสังคม                                   | 0.067                  | 0.488   | 0.401                  | 0.001*  |
| ด้านการประเมินคุณค่า<br>ส่วนบุคคลที่มีต่อตัวเอง                    | 0.060                  | 0.535   | 0.313                  | 0.001*  |
| ด้านการประเมินคุณค่าส่วน<br>บุคคลที่ผู้อื่นมีต่อตัวเอง             | 0.144                  | 0.136   | 0.280                  | 0.003*  |

หมายเหตุ \* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05