

สารบัญ

หน้า

| | |
|--|----|
| กิตติกรรมประกาศ | ค |
| บทคัดย่อภาษาไทย | ง |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ | ฉ |
| สารบัญตาราง | ญ |
| สารบัญแผนภูมิ | ฎ |
| บทที่ 1 บทนำ | 1 |
| ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา | 1 |
| วัตถุประสงค์ของการศึกษา | 3 |
| สมมุติฐานของการศึกษา | 4 |
| ขอบเขตการศึกษา | 4 |
| ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา | 4 |
| คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา | 4 |
| บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | 6 |
| ความรู้เกี่ยวกับยาด้านไวรัส | 6 |
| เป้าหมายในการรักษาด้วยยาด้านไวรัสเอดส์ | 8 |
| การรักษาด้วยยาด้านไวรัสล้มเหลว | 13 |
| ปัจจัยที่มีผลทำให้การรักษาด้วยยาด้านไวรัสล้มเหลว | 13 |
| ข้อบ่งชี้ในการสิ้นสุดการรักษา | 15 |
| การรับรู้เกี่ยวกับยาด้านไวรัส | 15 |
| ความมีวินัยในการรับประทานยา | 22 |
| วิธีการส่งเสริมการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง | 25 |
| งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | 27 |
| กรอบแนวคิดในการศึกษา | 31 |

สารบัญ (ต่อ)

| | | |
|-----------------|---|----|
| หน้า | | |
| บทที่ 3 | วิธีดำเนินการศึกษา | 32 |
| | ลักษณะประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง | 32 |
| | เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา | 33 |
| | วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล | 36 |
| | การวิเคราะห์ข้อมูล | 37 |
| บทที่ 4 | ผลการศึกษา | 38 |
| | ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง | 38 |
| | ส่วนที่ 2 ความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส | 49 |
| | ส่วนที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง ความรู้ การรับรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับวินัยในการรับประทานยาในผู้ป่วย โรคเอดส์ | 53 |
| บทที่ 5 | สรุป อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ | 58 |
| | สรุปผลการศึกษา | 59 |
| | อภิปรายผลการศึกษา | 62 |
| | ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้ | 65 |
| เอกสารอ้างอิง | | 66 |
| ภาคผนวก | | 73 |
| | ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่รับประทานยาต้านไวรัส | 74 |
| | ภาคผนวก ข คำจำกัดความผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ | 79 |
| | ภาคผนวก ค รายงานผู้ทรงคุณวุฒิ | 82 |
| ประวัติผู้เขียน | | 83 |

สารบัญตาราง

| ตาราง | หน้า |
|---|------|
| 1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามสถานที่ใช้บริการ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา | 39 |
| 2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับซีดี 4 ก่อนและ หลังการรับประทานยาต้านไวรัส | 40 |
| 3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระยะเวลาที่ทราบผลเลือด ระยะเวลาที่เริ่มรับประทานยาและสูตรยาที่ใช้ในปัจจุบัน | 41 |
| 4 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอาชีพ รายได้ และแหล่งให้การช่วยเหลือ | 42 |
| 5 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามที่อยู่อาศัย ผู้ดูแลผู้ป่วยจำนวนบุตร ในความดูแลและการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อในครอบครัว | 43 |
| 6 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามวิธีการคุมกำเนิด | 45 |
| 7 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสิทธิคำรักษาพยาบาล | 46 |
| 8 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการเจ็บป่วยในระยะเวลา 1 เดือน | 47 |
| 9 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการเจ็บป่วยและ ระยะเวลาที่นอน โรงพยาบาล | 48 |
| 10 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามรายชื่อตามระดับความรู้ เกี่ยวกับยาต้านไวรัส | 49 |
| 11 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามรายชื่อ ตามระดับการรับรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส | 50 |
| 12 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับความรู้และ การรับรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส | 51 |
| 13 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศกับ ความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัส | 52 |
| 14 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับการรับรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส | 53 |
| 15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัสกับ ความมีวินัยในการรับประทานยา ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา | 54 |
| 16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ | |

| | |
|--|----|
| รับประทานยาด้วยความรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส | 55 |
| 17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ ระยะเวลาที่รับประทานยา กับการรับรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส | 56 |
| 18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ ระยะเวลาที่รับประทานยา กับวินัยในการรับประทานยา | 57 |



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

สารบัญแผนภูมิ

| แผนภูมิ | หน้า |
|---|------|
| 1 แผนภูมิแสดงข้อบ่งชี้ในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ใหญ่ | 9 |
| 2 แผนภูมิแสดงการเริ่มใช้ยาต้านไวรัส | 11 |
| 3 แผนภูมิแสดงกระบวนการของการรับรู้ | 16 |
| 4 แผนภูมิแสดงปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือ และวินัยในการรับประทานยา | 25 |

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved