

บทคัดย่อ

จากการตรวจสอบmetafenoscaris โอดีทาปีของลูกธุนแรก (F_1 -progeny) ของยุงกันปล่องชนิด *Anopheles vagus* ที่ได้จากแม่ที่แยกเลี้ยงเดี่ยวที่จับจากอุ่นภูมิภาค แล้วนำกลับสู่ห้องทดลอง พบว่า ยุงกันปล่องชนิด *An. vagus* มีโครงโน้มโโซมเพศที่แตกต่างกัน โครงโน้มโน้ม X มีสองชนิด คือ X_1 และ X_2 โครงโน้มโน้ม Y มีสองชนิด คือ Y_1 และ Y_2 ความแตกต่างของโครงโน้มโโซมเพศ ทั้งสองชนิด (X และ Y) สามารถพบร่องรอยได้จากยุงกันปล่องที่จับมาจากห้องทดลองอุ่นภูมิภาค อาศัยความแตกต่างของโครงโน้มโน้ม Y สามารถแบ่งยุงกันปล่องชนิดนี้ออกได้เป็นสองรูปแบบคือ รูปแบบ A มีโครงโน้มโโซมเพศเป็น X_1, X_2, Y_1 และ รูปแบบ B มีโครงโน้มโโซมเพศเป็น X_1, X_2, Y_2

จากการศึกษาเปรียบเทียบทางชีววิทยาบางประการของยุงกันปล่องทั้งสองรูปแบบที่เพาะเลี้ยงในห้องทดลองคือ ระยะเวลาของไข่ ตัวอ่อน ตัวโน้ม และตัวเต็มวัย อัตราส่วนของยุงตัวเต็มวัยเพศเมียต่อยุงตัวเต็มวัยเพศผู้ ความสามารถในการกินเลือด ความสามารถในการผสมพันธุ์เทียบของยุงตัวเต็มวัยเพศผู้ ความสามารถในการผสมพันธุ์อิสระในกรงขนาด 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวนไปที่วางต่ออยู่ตัวเต็มวัยเพศเมียหนึ่งตัว พบว่าโดยส่วนใหญ่เหมือนกัน ยกเว้นความแตกต่างของการฟักตัวออกจากไข่ ระยะเวลาของการเป็นตัวอ่อน และการมีอายุยืนยาวของยุงตัวเต็มวัย

การผสมพันธุ์ระหว่างยุงกันปล่องชนิด *An. vagus* รูปแบบ A และ รูปแบบ B โดยการผสมซึ่งกันและกัน (reciprocal cross) และการผสมรุ่นพ่อแม่กับรุ่นลูก (back cross) พบว่าการผสมพันธุ์ของยุงทั้งสองรูปแบบให้ลูกที่แข็งแรงและมี polytene chromosomes ที่ synapsis เมื่อเปรียบเทียบกับการผสมพันธุ์ระหว่างพ่อแม่เดียวกัน ตั้งน้ำนยุงกันปล่องทั้งสองรูปแบบจึงไม่มีระบบการสืบพันธุ์ที่แยกจากกัน

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright[©] by Chiang Mai University
All rights reserved

ABSTRACT

Metaphase karyotype of F₁-progeny raised from isolines, wild-caught females of *Anopheles vagus* from two different localities in Chiang Mai province, i.e., San Sai and San Kamphaeng districts, were investigated. The results demonstrated that there were two types of X chromosome (X₁, X₂) and Y chromosome (Y₁, Y₂) which could be found sympatrically from these two localities. Based on the different of Y chromosome, thus, X₁, X₂, Y₁ was designated as *An. vagus* Form A, and X₁, X₂, Y₂ as *An. vagus* Form B.

Comparative study on some biological aspects of these two karyotypic colonies which were egg, larva, pupa, and adult durations; adult female:male ratio, feeding ability, male artificial mating ability, free mating ability in a 30 cm cube cage, and eggs deposition per gravid female, revealed that they were generally similar, except the intraspecific variation in egg hatchability, duration of larvae and longevity of adult.

Intraspecific hybridization of two karyotype forms of *An. vagus*, Form A and B, revealed that reciprocal and back crosses provided viable progenies and complete synapsis of salivary gland polytene chromosomes when compared with the parental crosses. In this regard, no reproductive isolation between *An. vagus* Form A and B was observed.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved