ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

พฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรวัยทารก

ชื่อผู้เขียน

นางสาวสายชล บุญวิสุทธานนท์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. ประคิณ สุจฉายา ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. รัตนาวดี ชอนตะวัน กรรมการ อาจารย์ คร. อวยพร ตัณมุขยกุล กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. พัชราภรณ์ อารีย์ กรรมการ

นทคัดย่อ

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพเด็ก พฤติกรรมการส่งเสริม พัฒนาการบุตรวัยทารกของมารดาที่เหมาะสมจะส่งเสริมให้ทารกพัฒนาสู่พัฒนาการในขั้นสูงขึ้นได้

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของมารคาในการส่งเสริมพัฒนาการบุตร วัยทารก กลุ่มตัวอย่างเป็นมารคาที่มีบุตรอยู่ในช่วงอายุ 9-12 เดือน ที่มารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี ของโรงพยาบาล 5 แห่งในเขตจังหวัดพิษณุโลก ได้มาโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ จำนวน 150 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเครื่อง มือ 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป และแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมของมารคาในการส่งเสริมพัฒนาการบุตร วัยทารก สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

- พฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรวัยทารกในเขตจังหวัดพิษณุโลก
 โดยรวมอยู่ในระดับสูง (X = 86.35, SD = 14.45)
- 2. พฤติกรรมของมารดาการส่งเสริมพัฒนาการบุตรวัยทารกรายด้าน พบว่ามีพฤติกรรมการ ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม และการช่วยเหลือตนเอง

อยู่ในระดับสูง (\overline{X} = 26.65, SD = 3.83; \overline{X} = 26.25, SD = 4.55 ตามถำดับ) และมีพฤติกรรมของมารคาใน การส่งเสริมพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และพฤติกรรมของมารคาในการส่งเสริมพัฒนาการ ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่ในระดับปานกลาง (\overline{X} = 12.55, SD = 4.43; \overline{X} = 20.89, SD = 4.43 ตาม ลำดับ)

- 3. พฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรวัยทารกของกลุ่มตัวอย่างรายด้านตาม ช่วงอายุพบว่า
- 3.1 พฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรวัยทารกรายด้านช่วงวัย แรกเกิด-3 เดือน พบว่าพฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรวัยทารกด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก พฤติกรรมการของมารดาในส่งเสริมพัฒนาการบุตรวัยทารกด้านภาษา และพฤติกรรมของมารดาในการ ส่งเสริมพัฒนาการบุตรวัยทารกด้านสังคม และการช่วยเหลือตนเองอยู่ในระดับสูง ($\overline{X}=2.34$, SD=0.90; $\overline{X}=5.53$, SD=0.94; $\overline{X}=5.43$, SD=0.96 ตามถ้ำดับ)
- 3.2 พฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรวัยทารกรายด้านช่วงวัย 3-6 เดือน พบว่าพฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรวัยทารกด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก พฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรวัยทารกด้านภาษา และพฤติกรรมของมารดาในการ ส่งเสริมพัฒนาการบุตรวัยทารกด้านสังคม และการช่วยเหลือตนเองอยู่ในระดับสูง ($\overline{X}=4.24$, SD=1.71; $\overline{X}=12.41$, SD=1.77; $\overline{X}=11.64$, SD=2.21 ตามลำดับ)
- 3.3 พฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรวัยทารกรายด้าน ช่วงวัย 6-9 เดือน พบว่าพฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรวัยทารกด้านภาษาอยู่ ในระดับสูง (\overline{X} = 4.30, SD = 1.44)
- 3.4 พฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรวัยทารกรายด้านช่วง วัย 9-12 เดือน พบว่าพฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรวัยทารกด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ พฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรวัยทารกด้านภาษา และพฤติกรรมของมารดาในการ ส่งเสริมพัฒนาการบุตรวัยทารกด้านสังคม และการช่วยเหลือตนเองอยู่ในระดับสูง $(\overline{X}=4.58, SD=1.77; \overline{X}=4.40, SD=1.70; \overline{X}=3.75, SD=1.50$ ตามลำดับ)

การวิจัยพบว่าตัวอย่างบางรายแสดงพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการแต่ไม่รู้ว่านั่นคือวิธีการ ส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม จึงมีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลที่ปฏิบัติงานในคลินิกสุขภาพเด็กดีแผนก กุมารเวชกรรม ควรมีการให้ความรู้แก่มารคาเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยเพื่อส่งเสริม พัฒนาการเด็ก Thesis Title

Maternal Behaviors in Promoting Infant Development

Author

Miss Saichol Boonwisuttanon

M.N.S.

Pediatric Nursing

Examining Committee

Asst. Prof. Dr. Prakin Suchaxaya Chairman
Asst. Prof. Nitaya Thiyapirom Member
Asst. Prof. Dr. Ratanawadee Chontawan Member
Lect. Dr. Ouyporn Tunmukayakul Member
Asst. Prof. Dr. Patcharaporn Aree Member

Abstract

Promoting infant development is a part of child health promotion. Maternal behaviors in promoting infant development properly will enhance infant development into advanced stage.

The purpose of this study was to investigate the level of maternal behaviors in promoting infant development. The subjects selected by using stratified sampling, were 150 mothers whose infant were 9-12 month old and were taken to attend well baby clinic at 5 hospitals in Pisanulok province. The instrument was an interview guideline composed of two parts: demographic data and maternal behaviors in promoting infant development interview guideline developed by the researcher. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, and standard deviation.

The results of the study revealed that

1. The overall maternal behaviors in promoting infant development was at a high

 $(\overline{X} = 86.35, SD = 14.43).$

- 2. The maternal behaviors in promoting infant development in each aspect of development: language and social-self help were at a high level (\overline{X} = 26.65, SD = 3.83; \overline{X} = 26.25, SD = 4.55), gross motor and fine motor development were at a medium level (\overline{X} = 12.55, SD = 4.43; \overline{X} = 20.89, SD = 5.64)
- 3. The maternal behaviors in promoting infant development in each aspect of each age levels were found that
- 3.1 Maternal behaviors in promoting infant development at birth-3 month: fine motor language and social-self help development were at a high level $(\overline{X} = 2.34, SD = 0.90; \overline{X} = 5.53, SD = 0.94; \overline{X} = 5.43, SD = 0.96)$.
- 3.2 Maternal behaviors in promoting infant development at 3-6 month: fine motor language and social-self help development were at a high level (\overline{X} = 4.24, SD = 1.71; \overline{X} = 12.41, SD = 1.77; \overline{X} = 11.64, SD = 2.21).
- 3.3 Maternal behaviors in promoting infant development at 6-9 month: language development was at a high level $(\overline{X} = 4.30, SD = 1.44)$.
- 3.4 Maternal behaviors in promoting infant development at 9-12 month: gross motor language and social-self help development were at a high level $(\overline{X} = 4.58, SD = 1.77; \overline{X} = 4.40, SD = 1.70; \overline{X} = 3.75, SD = 1.50)$.

This study showed that some mothers performed promoting development behaviors but did not know that those were proper methods in promoting development. It is suggested that nurses who work at well baby clinic in pediatric department should provide knowledge to mothers on methods to promote infant development at each age levels to enhance child development.