

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ความเข้มแข็งอดทน และคุณภาพชีวิตของสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี

ชื่อผู้เขียน นางปานจันทร์ จ่างแก้ว

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร. สุธัณหา ยิ้มแย้ม ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา ปริสัณญกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี ฟองแก้ว กรรมการ
อาจารย์ ดร. พิภพ นันทชัยพันธ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กั้นระรักษา กรรมการ

บทคัดย่อ

การติดเชื้อเอชไอวีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวีอย่างมากทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนครอบครัว จนอาจมีผลต่อคุณภาพชีวิตของสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวีได้ หากสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวีได้มีการเข้าถึงการดูแลสุขภาพและมีความเข้มแข็งอดทนสูงอาจนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบหาความสัมพันธ์เชิงทำนาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ความเข้มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตของสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี และความสัมพันธ์เชิงทำนายระหว่างการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ความเข้มแข็งอดทน และคุณภาพชีวิตของสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ สตรีที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และยอมรับว่ามีการติดเชื้อเอชไอวี (ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ) ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 91 ราย เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ แบบวัดความเข้มแข็งอดทน และแบบประเมินคุณภาพชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

สถิติเชิงพรรณนาและหาความสัมพันธ์เชิงทำนาย โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ สหสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

- 1.สตรีที่คิดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.79) มีความพึงพอใจระดับมากในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ
- 2.สตรีที่คิดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81.30) มีค่าเฉลี่ยความเข้มแข็งอดทนอยู่ในระดับสูง
- 3.สตรีที่คิดเชื้อเอชไอวี (ร้อยละ 48.40) มีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูง
- 4.ความเข้มแข็งอดทนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r=0.80$, $p<0.01$) ในขณะที่การเข้าถึงการดูแลสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต ความเข้มแข็งอดทนสามารถทำนายคุณภาพชีวิตได้ร้อยละ 65 ในขณะที่การเข้าถึงการดูแลสุขภาพไม่สามารถทำนายคุณภาพชีวิตได้

ผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ และการส่งเสริมความเข้มแข็งอดทนแก่สตรีที่คิดเชื้อเอชไอวีเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

Thesis Title Access to Health Care Hardiness and Quality of life Among
HIV Infected Women

Author Mrs.Panchan changkaew

M.N.S. Nursing Care of Woman

Examining Committee

Associate Professor Dr. Susanha Yimyam Chairman

Associate Professor Dr. Sukanya Parisunyakul Member

Assistant Professor Dr. Warunee Fongkaew Member

Lecturer Dr. Pikul Nantachaipan Member

Associate Professor Dr. Kannika Kantaruksa Member

ABSTRACT

The impact of the HIV infection on women involved physical, psychological, spiritual, socioeconomic and family aspect, which might influence to quality of life of women. If the HIV infected women could access to health care and have high hardiness, this may lead them to have a quality of life. The purposes of this predictive correlational research were to investigate the accessibility to health care, hardiness and quality of life among HIV infected women and to examine predictive correlation among access to health care, hardiness, and quality of life in HIV infected women. The subjects were 91 women whose diagnosed by medical physician and accepted the HIV infection (both had and had not infected symptoms) and lived in the Chiang Mai province. The instruments used for data collection were collected by using interview questionnaires consisting of demogrsphic data profile , Access to Health Care Scale, the Hardiness Scale and

The Quality of Life Questionnaire. Data analyzed using descriptive statistics, pearson's product moment correlation coefficient and stepwise multiple regress analysis.

The major results of the study are as follows:

1. Most of the HIV infected women (71.79%) had high level of satisfaction in access to health care ;
2. Most of the HIV infected women (81.30%) had high level mean scores of the hardiness ;
- 3.The HIV infected women (48.40%) had high level mean scores of the quality of life ; and
4. There was a highly relationship between hardiness and quality of life at a significant level of 0.01. However, there was no significant relationship between access to health care and quality of life. The sixty - five percent of quality of life could be predicted by the hardiness, but the access to health care could not be predicted.

The findings of this study may be use as a guideline to improve the access to health care, particularly to promote hardiness among HIV infected women in order to a good quality of life.