

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสพซ้ำของผู้ที่เป็น โรคจิตจากสารแอมเฟตามีน

ชื่อผู้เขียน

นางทิพศมัย จันทรมานนท์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ:

รองศาสตราจารย์ เขียมศร	ทองสวัสดิ์	ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร. ภัทราภรณ์	ทุ่งปิ่นคำ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คาราวรรณ	ดีะปิ่นตา	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ เรมวถ	นันท์ศุภวัฒน์	กรรมการ

#### บทคัดย่อ

ผู้ที่เป็น โรคจิตจากสารแอมเฟตามีนมีอัตรากลับเป็นซ้ำสูงเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อการกลับไปเสพสารแอมเฟตามีนซ้ำ การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสพซ้ำของผู้ที่เป็น โรคจิตจากสารแอมเฟตามีน กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่เป็น โรคจิตจากสารแอมเฟตามีน ที่เข้ารับการรักษาซ้ำแบบผู้ป่วยใน ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2545 จำนวน 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คัดแปลงจากแบบสอบถามของ นันทา ชัยพิชิตพันธ์ (2541) ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) ปัจจัยนำ 3) ปัจจัยเอื้ออำนาจ และ 4) ปัจจัยสนับสนุน วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา พบว่า

1. ด้านปัจจัยนำ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 49 และร้อยละ 59 มีความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับสารแอมเฟตามีนอยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ
2. ด้านปัจจัยเอื้ออำนาจ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 81 มีการเสพสารแอมเฟตามีนในชุมชน ร้อยละ 78 ได้สารแอมเฟตามีนมาโดยการซื้อเอง ร้อยละ 78 ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

สารแอมเฟตามีนจากโทรศัพท์มือถือ 62 ไม่มีการผลิตแต่มีการจำหน่ายสารแอมเฟตามีนในชุมชน และร้อยละ 38 ซึ่สารแอมเฟตามีนได้ง่ายในบริเวณชุมชนที่อาศัย

3. ด้านปัจจัยสนับสนุน กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 82 มีเพื่อนสนิทเสพสารแอมเฟตามีน ร้อยละ 72 ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสารแอมเฟตามีนจากเพื่อน ร้อยละ 69 มีเพื่อนที่เสพสารแอมเฟตามีนอยู่ในชุมชนเดียวกัน และร้อยละ 48 สมาชิกในครอบครัวรู้สึกว่าการเสพเข้าเป็น สิ่งไม่ดี ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน

ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการเสพสารแอมเฟตามีนซ้ำของบุคคลกลุ่มนี้ต่อไป

**Independent Study Title** Factors Related to Amphetamine Reuse Among Persons with Amphetamine Induced Psychotic Disorder

**Author** Mrs. Tipsamai Chandramananda

**M.N.S.** Mental Health and Psychiatric Nursing

**Independent Study Examining Committee:**

Assoc. Prof. Tiamsorn	Tongswas	Chairman
Lect. Dr. Patraporn	Tungpunkom	Member
Asst. Prof. Darawan	Thapinta	Member
Assoc. Prof. Raymoul	Nantsupawat	Member

**Abstract**

The relapse rate of amphetamine use is relatively high in persons with amphetamine induced psychotic disorder. This dues to many influencing factors. The purpose of this descriptive study was to study factors related to amphetamine reuse among persons with amphetamine induced psychotic disorder. The subjects consisted of 85 persons with amphetamine induced psychotic disorder who were readmitted to the Suanprung Hospital during April to June, 2002. The instrument of this study was a questionnaire, which modified from Nanta Chaipichitpan (1998), consisting of four parts: 1) demographic data, 2) predisposing factors, 3) enabling factors, and 4) reinforcing factors. Data analysis was done by descriptive statistics.

The study results were as follows:

1. Predisposing factors: Forty-nine and fifty-nine percents of the subjects reported a moderate level in terms of knowledge and attitude related to amphetamine respectively;

2. Enabling factors: Eighty-one percent of the subjects reported amphetamine reuse in their communities, 78 percent bought amphetamine by themselves, 78 percent received information related to amphetamine from televisions, 62 percent had not produced but sold amphetamine in their communities, and 38 percent had easy access to amphetamine in their communities; and

3. Reinforcing factors: Eighty-two percent of the subjects reported having closed friends using amphetamine, 72 percent received information related to amphetamine from their friends, 69 percent had friends using amphetamine lived in the same communities, and 48 percent had family members with negative feelings toward amphetamine.

These findings could be used as a baseline information to develop prevention guideline in amphetamine reuse in this group of population.