

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการใช้การผูกมัดผู้ป่วย
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช

ชื่อผู้เขียน นายสุรัช สุนันตา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาราวรรณ ตะปินตา ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ตาปัญญา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถินจง โปธิบาล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ศิริพร สิงหนตร กรรมการ
รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ พิเชิธรเสถียร กรรมการ

บทคัดย่อ

การใช้การผูกมัดเพื่อจัดการกับผู้ป่วยที่ควบคุมตนเองไม่ได้เป็นการบำบัดทางการพยาบาลที่มีผลกระทบต่อ เกียรติ ศักดิ์ศรี สิทธิและความปลอดภัยของผู้ป่วย อย่างไรก็ตามการใช้การผูกมัดยังคงมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช การวิจัยเชิงพรรณนาคครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการใช้การผูกมัดผู้ป่วยและศึกษาอำนาจการทำนายของเจตคติกับบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงต่อความตั้งใจในการใช้การผูกมัดผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขทั้ง 11 แห่ง จำนวน 248 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและแบบสอบถามเจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการใช้การผูกมัดผู้ป่วยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวทางของไอเซนและฟิชไบน์ (Ajzen & Fishbein, 1980) มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ .86 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคในส่วนของเจตคติเท่ากับ .81 ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นโดยวิธีทดสอบซ้ำในส่วนของบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการใช้การผูกมัดผู้ป่วยเท่ากับ .70 และ .76 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมนและวิเคราะห์ตัวแบบการถดถอย โลจิสติก

ผลการวิจัยพบว่า เจตคติของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในหอผู้ป่วยไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการใช้การผูกยึดผู้ป่วย ส่วนบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความตั้งใจในการใช้การผูกยึดผู้ป่วย ($r = .48, p < .01$) และจากการวิเคราะห์ตัวแบบการถดถอยโลจิสติก พบว่าปัจจัยบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงเป็นตัวแปรเพียงตัวเดียวที่สามารถอธิบายความตั้งใจในการใช้การผูกยึดผู้ป่วย ได้ร้อยละ 68.95

ดังนั้นผู้บริหาร โรงพยาบาล ผู้บริหารทางการพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช ควรตระหนักถึงความสำคัญของบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงซึ่งมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้การผูกยึดผู้ป่วย โดยควรมีการกำหนดนโยบายและแนวทางการใช้การผูกยึดผู้ป่วยอย่างชัดเจนและควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้การผูกยึดผู้ป่วยต่อไป

Thesis Title Attitudes, Subjective Norms, and Intentions to Patient Restraints
Among Professional Nurses in Psychiatric Hospitals

Author Mr. Surush Sununta

M. N. S. Mental Health and Psychiatric Nursing

Examining Committee :

Assist. Prof. Dr. Darawan	Thapinta	Chairman
Assist. Prof. Dr. Sombat	Tapanya	Member
Assist. Prof. Dr. Linchong	Pothiban	Member
Assoc. Prof. Siriporn	Singhanetr	Member
Assoc. Prof. Wilawan	Picheansathian	Member

Abstract

The use of restraints to manage patients who are out of control is a nursing intervention which impacts the dignity, right, and safety of the patients. Despite of its impacts, this method is still necessary and widely used in psychiatric nursing care. Therefore, the objective of this descriptive study is to describe the correlation between attitudes, subjective norms, and intentions to use patient restraints, as well as their predictive value to the intention of the professional nurses working in psychiatric hospitals. The sample consisted of 248 professional nurses who were providing care for psychiatric patients in 11 psychiatric hospitals of the Department of Mental Health, Ministry of Public Health. The participants were recruited by using the stratified random sampling method. The research instruments consisted of a Demographic Data Recording Form, and the Attitudes, Subjective Norms, and Intentions of Professional Nurses to Use Patient Restraints Questionnaire developed by the researcher based on the concept of Ajzen and Fishbein (1980). The content validity index of the Attitudes, Subjective Norms, and Intentions of Professional Nurses to Use Patient Restraints Questionnaire was .86, the Cronbach's alpha coefficients of the Attitudes part was .81, and the test-retest correlation coefficient of the Subjective Norms, and Intentions to Use Patient Restraints

part were .70, and .76, respectively. Data were analyzed in terms of mean, standard deviation, Spearman correlation, and the binary logistic regression model.

The results revealed that the attitudes to use patient restraints of professional nurses in psychiatric hospitals were not correlated to the intentions, whereas the subjective norms were significantly correlated to the intentions to use patient restraints ($r = .48, p < .01$). The binary logistic regression model revealed that the subjective norms were the only variable which could explain 68.95 percent of the variability of the intention to use patient restraints.

Therefore, hospital administrators, nursing administrators, and professional nurses in psychiatric hospitals should consider the effect of subjective norms on the intentions to use patient restraints. The policy and guideline procedure should also be clarified. The study of other factors influencing the intentions to use patient restraints should be conducted.