

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) ศึกษาในเยาวชนข้ามชาติ อายุ 15 - 24 ปี ที่เข้ามาทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2557 จำนวนทั้งสิ้น 442 คน ผลการศึกษาประกอบด้วย

- ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- ตอนที่ 2 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ
- ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ
- ตอนที่ 4 ทักษะคิดของผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์
- ตอนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นเยาวชนข้ามชาติ อายุ 15 - 24 ปี ที่เข้ามาทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 442 ราย ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย อายุ ชาติพันธุ์ สัญชาติ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาในประเทศบ้านเกิดและประเทศไทย ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน ประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่การถือใบอนุญาตในการทำงานและบัตรประจำตัวเพื่อการอยู่อาศัย สิทธิการรักษาพยาบาล อาชีพและรายได้ต่อเดือน นำเสนอในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไป (n=442)

ข้อมูล	เพศชาย(n=220)		เพศหญิง(n=222)		รวม(n=442)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
อายุ (ปี)						
15 - 18 ปี	37	16.8	68	30.6	105	23.8
19 - 21 ปี	92	41.8	77	34.7	169	38.2
22 - 24 ปี	91	41.4	77	34.7	168	38.0
$(\bar{X}=20.4 \text{ S.D.}=2.53)$						
ชาติพันธุ์						
ไทใหญ่	188	85.5	200	90.1	388	87.8
พม่า	19	8.6	5	2.2	24	5.4
ลาว	2	0.9	2	0.9	4	0.9
ปกากะญอ	4	1.8	0	0.0	4	0.9
กัมพูชา	1	0.5	2	0.9	3	0.7
อื่นๆ*	6	2.7	13	5.9	19	4.3
สัญชาติ						
พม่า	217	98.6	218	98.2	435	98.4
ลาว	2	0.9	2	0.9	4	0.9
กัมพูชา	1	0.5	2	0.9	3	0.7
สถานภาพสมรส						
โสดแบบไม่มีคู่รัก(แฟน)	82	37.3	87	39.2	169	38.2
โสดแบบมีคู่รัก(แฟน)	60	27.3	49	22.1	109	24.7
อยู่กินด้วยกันเฉยๆ	22	10.0	18	8.1	40	9.0
อยู่ด้วยกันโดยแต่งงานตาม	52	23.6	65	29.3	117	26.5
ประเพณี/จดทะเบียนสมรส						
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่	4	1.8	3	1.3	7	1.6

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไป(n=442) (ต่อ)

ข้อมูล	เพศชาย(n=220)		เพศหญิง(n=222)		รวม(n=442)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ระดับการศึกษาที่ประเทศบ้านเกิด						
ไม่ได้เรียน	52	23.6	83	37.4	135	30.5
เรียน(ชั้นที่เรียนจบ)	168	76.4	139	62.6	307	69.5
ชั้น 1 - ชั้น 4	69	41.1	65	46.8	134	43.7
ชั้น 5 - ชั้น 8	53	31.5	53	38.1	106	34.5
ชั้น 9 - ชั้น 10	23	13.7	18	13.0	41	13.4
อื่นๆ*	23	13.7	2	1.4	25	8.1
ไม่ตอบ	0	0.0	1	0.7	1	0.3
ระดับการศึกษาที่ประเทศไทย						
ไม่ได้เรียน	93	42.3	69	31.1	162	36.7
เรียน	127	57.7	153	68.9	280	63.3
ระบบสามัญ	15	11.8	22	14.4	37	13.2
ระบบการศึกษานอกโรงเรียน	112	88.2	131	85.6	243	86.8
ชั้นที่เรียนจบ						
ชั้นประถมศึกษา	16	12.5	22	14.4	38	13.6
ชั้นมัธยมศึกษา	7	5.5	12	7.8	19	6.8
สูงกว่ามัธยมศึกษา	3	2.4	0	0.0	3	1.1
กำลังศึกษาอยู่	9	7.1	13	8.5	22	7.8
อื่นๆ*	91	71.7	104	68.0	195	69.6
ไม่ตอบ	1	0.8	2	1.3	3	1.1
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย						
น้อยกว่า 1 ปี	37	16.8	19	8.5	56	12.7
1 - 4 ปี	116	52.7	116	52.3	232	52.5
5 - 9 ปี	44	20.0	38	17.1	82	18.5
10 ปีขึ้นไป	23	10.5	49	22.1	72	16.3
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่						
น้อยกว่า 1 ปี	54	24.5	38	17.1	92	20.8
1 - 4 ปี	112	50.9	120	54.1	232	52.5
5 - 9 ปี	40	18.2	36	16.2	76	17.2
10 ปีขึ้นไป	14	6.4	28	12.6	42	9.5

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไป (n=442) (ต่อ)

ข้อมูล	เพศชาย(n=220)		เพศหญิง(n=222)		รวม(n=442)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บัตรประจำตัวเพื่อการอาศัยอยู่ในประเทศไทย						
ไม่มี	40	18.2	25	11.3	65	14.7
มี	180	81.8	197	88.7	377	85.3
พาสปอร์ต	157	87.2	167	84.8	324	86.0
บัตรประจำตัวบุคคลบนพื้นที่สูง	11	6.1	17	8.6	28	7.4
บัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บัตร 10ปี)	12	6.7	13	6.6	25	6.6
ใบอนุญาตหรือเอกสารให้ทำงานในประเทศไทย						
ไม่มี	62	28.2	53	23.9	115	26.0
มี	158	71.8	168	75.7	326	73.8
ไม่ตอบ	0	0.0	1	0.4	1	0.2
สิทธิการรักษาพยาบาล						
ไม่มีสิทธิรักษา	139	63.2	121	54.5	260	58.8
มี	81	36.8	101	45.5	182	41.2
ประกันสุขภาพ	73	90.1	80	79.2	153	84.1
ประกันสังคม	4	4.9	17	16.8	21	11.5
ประกันสวัสดิการนายจ้าง	2	2.5	3	3.0	5	2.7
อื่นๆ(ประกันชีวิต)	2	2.5	0	0.0	2	1.1
ไม่ตอบ	0	0.0	1	1.0	1	0.6

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไป (n=442) (ต่อ)

ข้อมูล	เพศชาย(n=220)		เพศหญิง(n=222)		รวม(n=442)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
อาชีพ						
ลูกจ้างในสถานประกอบการอื่นๆ	61	27.8	42	18.9	103	23.3
ก่อสร้าง	69	31.4	33	14.9	102	23.1
ลูกจ้างร้านอาหาร/เครื่องดื่ม	28	12.7	50	22.5	78	17.6
ลูกจ้างร้านค้าทั่วไป	28	12.7	40	18.0	68	15.4
รับจ้างทำงานบ้าน/ดูแลภายในบ้าน	2	0.9	32	14.4	34	7.7
ดูแลภายนอกบ้าน						
ลูกจ้างในโรงงาน	14	6.4	8	3.6	22	5.0
ค้าขาย (กิจการตัวเอง)	8	3.6	3	1.4	11	2.5
ลูกจ้างเกษตรกร	6	2.7	3	1.3	9	2.0
พนักงานในสถานบันเทิง	2	0.9	5	2.3	7	1.6
ไม่ตอบ	2	0.9	6	2.7	8	1.8
รายได้ต่อเดือน						
น้อยกว่า 5000 บาท	11	5.0	18	8.1	29	6.6
5001-10000 บาท	189	85.9	197	88.7	386	87.3
10001-15000 บาท	20	9.1	7	3.2	27	6.1

*ชั้นที่เรียนจบอื่นๆ ได้แก่ ศึกษาภาษาไทยที่ วัดป่าเป้า Migrant Learning Center(MLC) Burma Study Center(BSC) ศูนย์เรียนรู้พัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตแรงงานจังหวัดเชียงใหม่(SEED) และ ระดับปวช.

จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 49.8 และเป็นกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงร้อยละ 50.2 ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วง 19 - 21 ปี มากที่สุด ร้อยละ 38.2 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 22 - 24 ปี ร้อยละ 38.0 กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยที่ 20.4 ปี ชาติพันธุ์ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีชาติพันธุ์ไทใหญ่ ร้อยละ 87.8 รองลงมาคือ ชาติพันธุ์พม่า ร้อยละ 5.4 สัญชาติของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสัญชาติพม่า ร้อยละ 98.4 รองลงมาคือ สัญชาติลาว ร้อยละ 0.9 สถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่างเป็น โสดแบบไม่มี คู่รักมากที่สุด ร้อยละ 38.2 รองลงมา มีสถานภาพอยู่ด้วยกัน โดยแต่งงานตามประเพณีหรือจดทะเบียน สมรส ร้อยละ 26.5 ระดับการศึกษาในประเทศบ้านเกิดของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา ร้อยละ 69.5 โดยชั้นที่เรียนจบจำนวนมากที่สุดคือชั้น 1 - ชั้น 4 ร้อยละ 43.7 สำหรับระดับการศึกษาในประเทศไทยพบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างได้รับการศึกษา ร้อยละ 63.3 โดยส่วนมากศึกษาในระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน ร้อยละ 86.8 โดยส่วนใหญ่กำลังศึกษาภาษาไทย ร้อยละ 69.6 สถานที่ศึกษา ได้แก่ วัดป่าเป้า Migrant Learning Center(MLC) และBurma Study Center(BSC) เป็นต้น ระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในระยะเวลา 1 - 4 ปี ร้อยละ 52.5 รองลงมาคือระยะเวลา 5 - 9 ปี ร้อยละ 18.5 ระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในระยะเวลา 1 - 4 ปี ร้อยละ 52.5 รองลงมาคือระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 20.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีบัตรประจำตัวเพื่อการอาศัยอยู่ในประเทศไทย ร้อยละ 85.3 โดยพบว่ามิพาสปอร์ตมากที่สุด ร้อยละ 86.0 รองลงมาคือบัตรประจำตัวบุคคลบนพื้นที่สูง ร้อยละ 7.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ร้อยละ 73.8 กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิการรักษาพยาบาล ร้อยละ 41.2 โดยส่วนใหญ่มีสิทธิรักษาในระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ร้อยละ 84.1 รองลงมาคือสิทธิประกันสังคม ร้อยละ 11.5 การประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ ร้อยละ 23.3 ได้แก่ พนักงานในโรงพยาบาล โรงแรม สถานที่ราชการ บริษัทและหน่วยงานเอกชน รองลงมาประกอบอาชีพก่อสร้าง ร้อยละ 23.1 และรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ในช่วง 5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 87.3 รองลงมาคือมีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 6.6

ตอนที่ 2 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุยังน้อย การมีคู่นอนหลายคนและการไม่ใช้ถุงยางอนามัย ดังแสดงในตารางที่ 4.2 - 4.10

ตารางที่ 4.2 ประสิทธิภาพการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติจำแนกตามเพศ (n = 442 คน)

ประสิทธิภาพการมีเพศสัมพันธ์	เพศชาย(n=220)		เพศหญิง(n=222)		รวม(n=442)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์	77	35.0	113	50.9	190	43.0
เคยมีเพศสัมพันธ์	143	65.0	109	49.1	252	57.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเคยมีประสิทธิภาพการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 57.0 กลุ่มตัวอย่างเพศชายเคยมีประสิทธิภาพการมีเพศสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง โดยกลุ่มตัวอย่างเพศชายเคยมีประสิทธิภาพการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 65.0 และกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงเคยมีประสิทธิภาพการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 49.1

ตารางที่ 4.3 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ
จำแนกตามเพศ (n = 252 คน)

อายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ครั้งแรก	เพศชาย(n=143)		เพศหญิง(n=109)		รวม(n=252)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี	80	55.9	70	64.2	150	59.5
มากกว่า 18 ปี	62	43.4	36	33.1	98	38.9
จำไม่ได้	0	0.0	2	1.8	2	0.8
ไม่ตอบ	1	0.7	1	0.9	2	0.8
อายุเฉลี่ย	18.6(S.D.= 2.11)		17.7 (S.D.=2.13)		18.2(S.D.= 2.53)	

จากตารางที่ 4.3 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มตัวอย่างในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อย จากตารางกำหนดอายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี ร้อยละ 59.5 โดยมีสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชายอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเท่ากับ 18.2 ปี อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงน้อยกว่าในกลุ่มตัวอย่างเพศชาย โดยอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงเท่ากับ 17.7 ปี กลุ่มตัวอย่างเพศชายเท่ากับ 18.6 ปี ทดสอบความแตกต่างของอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างกลุ่มตัวอย่างเพศชายและกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%(p=0.001) (ตาราง จ.2)

ตารางที่ 4.4 พฤติกรรมการมีคู่นอนหลายคนในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติจำแนกตามเพศ (n = 252 คน)

จำนวนคู่นอน/คู่นอน ครั้งแรก	เพศชาย(n=143)		เพศหญิง(n=109)		รวม(n=252)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนคู่นอนในชีวิตที่ผ่านมา						
1 คน	67	46.8	88	80.7	155	61.5
2 - 4 คน	46	32.2	21	19.3	67	26.6
มากกว่า 5 คน	26	18.2	0	0.0	26	10.3
จำไม่ได้	1	0.7	0	0.0	1	0.4
ไม่ตอบ	3	2.1	0	0.0	3	1.2
คู่นอนครั้งแรก						
คูรักหรือแฟน	125	87.4	106	97.3	231	91.7
คนที่รู้จักคุ้นเคย	9	6.3	1	0.9	10	4.0
คนที่รู้จักผิวเผิน	6	4.2	0	0.0	6	2.4
เพื่อน	2	1.4	2	1.8	4	1.5
คนขายบริการทางเพศ	1	0.7	0	0.0	1	0.4

จากตารางที่ 4.4 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มตัวอย่างในเรื่องการมีคู่นอนหลายคนพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีจำนวนคู่นอนในชีวิตที่ผ่านมามากกว่า 1 คน ร้อยละ 36.9 โดยมีจำนวนคู่นอน 2 - 4 คน ร้อยละ 26.6 และคู่นอนมากกว่า 5 คน ร้อยละ 10.3 กลุ่มตัวอย่างเพศชายมีจำนวนคู่นอนมากที่สุด 25 คน และกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีจำนวนคู่นอนมากที่สุด 4 คน คู่นอนครั้งแรกของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคูรักหรือแฟน ร้อยละ 91.7 รองลงมาคือคนที่รู้จักคุ้นเคย ร้อยละ 4.0

ตารางที่ 4.5 พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กลุ่มเยาวชนข้ามชาติจำแนกตามเพศ
(n = 252 คน)

พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์	เพศชาย(n=143)		เพศหญิง(n=109)		รวม(n=252)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยใช้	81	56.6	79	72.5	160	63.5
ใช้	62	43.4	30	27.5	92	36.5
ความสม่ำเสมอในการใช้ถุงยาง อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์						
ใช้เป็นประจำทุกครั้ง	20	32.3	9	30.0	29	31.5
ส่วนใหญ่ใช้	16	25.8	7	23.3	23	25.0
ใช้บ้างบางครั้ง	26	41.9	14	46.7	40	43.5

จากตารางที่ 4.5 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มตัวอย่างในเรื่องพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์พบว่ากลุ่มตัวอย่างเมื่อมีเพศสัมพันธ์มีการใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 36.5 โดยความสม่ำเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยคือใช้ถุงยางอนามัยบ้างบางครั้งเป็น ร้อยละ 43.5 รองลงมาคือใช้ถุงยางอนามัยเป็นประจำทุกครั้ง ร้อยละ 31.5

ตารางที่ 4.6 ประสิทธิภาพการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่อุปการในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติจำแนกตามเพศ
(n = 135 คน)

ประสิทธิภาพการใช้ถุงยาง อนามัยกับคู่อุปการ	เพศชาย(n=65)		เพศหญิง(n=70)		รวม(n=135)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยใช้	52	80.0	60	85.7	112	83.0
ใช้	13	20.0	10	14.3	23	17.0
ใช้เป็นประจำทุกครั้ง	2	15.4	2	20.0	4	17.4
ส่วนใหญ่ใช้	3	23.1	2	20.0	5	21.7
ใช้บ้างบางครั้ง	8	61.5	6	60.0	14	60.9

จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่อุปการมีการใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 17.0 โดยความสม่ำเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยคือใช้ถุงยางอนามัยบ้างบางครั้ง ร้อยละ 60.9 รองลงมาคือส่วนใหญ่ใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 21.7

ตารางที่ 4.7 ประสิทธิภาพการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประจำในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติจำแนกตามเพศ (n = 116 คน)

ประสิทธิภาพการใช้ถุงยาง อนามัยกับคู่นอนประจำ	เพศชาย(n=76)		เพศหญิง(n=40)		รวม(n=116)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยใช้	41	53.9	19	47.5	60	51.7
ใช้	35	46.1	21	52.5	56	48.3
ใช้เป็นประจำทุกครั้ง	15	42.9	9	42.9	24	42.8
ส่วนใหญ่ใช้	6	17.1	3	14.3	9	16.1
ใช้บ้างบางครั้ง	14	40.0	9	42.8	23	41.1

จากตารางที่ 4.7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนประจำมีการใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 48.3 โดยความสม่ำเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยคือใช้ถุงยางอนามัยเป็นประจำทุกครั้ง ร้อยละ 42.8 รองลงมาคือ ใช้ถุงยางอนามัยบ้างบางครั้ง ร้อยละ 21.7

ตารางที่ 4.8 ประสิทธิภาพการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนชั่วคราวในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติจำแนกตามเพศ (n = 39 คน)

ประสิทธิภาพการใช้ถุงยาง อนามัยกับคู่นอนชั่วคราว	เพศชาย(n=35)		เพศหญิง(n=4)		รวม(n=39)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนคู่นอนชั่วคราว						
1 คน	15	42.9	3	75.0	18	46.1
2 - 4 คน	9	25.7	0	0.0	9	23.1
มากกว่า 5 คน	9	25.7	0	0.0	9	23.1
จำไม่ได้	2	5.7	1	25.0	3	7.7
การใช้ถุงยางอนามัย						
ไม่เคยใช้	11	31.4	2	50.0	13	33.3
ใช้	24	68.6	2	50.0	26	66.7
ใช้เป็นประจำทุกครั้ง	16	66.7	1	50.0	17	65.3
ส่วนใหญ่ใช้	1	4.2	1	50.0	2	7.7
ใช้บ้างบางครั้ง	7	29.1	0	0.0	7	27.0

จากตารางที่ 4.8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชายมีจำนวนคู่นอนชั่วคราวมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนคู่นอนชั่วคราว 1 คน ร้อยละ 46.1 รองลงมา มีจำนวนคู่นอนชั่วคราว 2 - 4 คน และจำนวนคู่นอนชั่วคราวมากกว่า 5 คน มีจำนวนร้อยละเท่ากันคือ 23.1 เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนชั่วคราวมีการใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 66.7 โดยความสม่ำเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยคือใช้ถุงยางอนามัยเป็นประจำทุกครั้ง ร้อยละ 65.3 รองลงมาคือใช้ถุงยางอนามัยบ้างบางครั้ง ร้อยละ 27.0

ตารางที่ 4.9 ประสิทธิภาพการใช้ถุงยางอนามัยกับผู้ขายบริการทางเพศในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ
จำแนกตามเพศ (n = 11 คน)

ประสิทธิภาพการใช้ถุงยาง อนามัยกับผู้ขายบริการ ทางเพศ	เพศชาย(n=11)		เพศหญิง(n=0)		รวม(n=11)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยใช้	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ใช้	11	100.0	0	0.0	11	100.0
ใช้เป็นประจำทุกครั้งที่ ส่วนใหญ่ใช้	10	91.0	0	0.0	10	91.0
	1	9.0	0	0.0	0	9.0

จากตารางที่ 4.9 พบว่ามีเฉพาะกลุ่มตัวอย่างเพศชายเท่านั้นและมีเพศสัมพันธ์กับผู้ขายบริการทางเพศมีการใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 100.0 โดยความสม่ำเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยคือใช้ถุงยางอนามัยเป็นประจำทุกครั้งที่ ร้อยละ 91.0 รองลงมาคือส่วนใหญ่ใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 9.0

ตารางที่ 4.10 ประสิทธิภาพการใช้ถุงยางอนามัยกับผู้ซื้อบริการทางเพศในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ
จำแนกตามเพศ (n = 2คน)

ประสิทธิภาพการใช้ถุงยาง อนามัยกับผู้ซื้อบริการ ทางเพศ	เพศชาย(n=2)		เพศหญิง(n=0)		รวม(n=2)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยใช้	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ใช้	2	100.0	0	0.0	2	100.0
ใช้เป็นประจำทุกครั้งที่	2	100.0	0	0.0	2	100.0

จากตารางที่ 4.10 พบว่ามีเฉพาะกลุ่มตัวอย่างเพศชายเท่านั้นและเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้ซื้อบริการทางเพศมีการใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 100.0 โดยความสม่ำเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยคือใช้ถุงยางอนามัยเป็นประจำทุกครั้งเป็น ร้อยละ 100.0

ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ ได้แก่ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความรู้เรื่องเอชไอวี/โรคเอดส์ ความคิดเห็นที่มีต่อถุงยางอนามัย ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเข้าถึงบริการสุขภาพ การได้รับความรู้และแหล่งที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ สื่อลามกอนาจาร การใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพันธ์ ครอบครัว/บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย บุคคลที่รู้จักมีพฤติกรรมเสี่ยง บุคคลที่บังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอม และปัจจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ประสิทธิภาพการเคมีอากาที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดังแสดงในตารางที่ 4.11 - 4.21

ตารางที่ 4.11 ปัจจัยความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ของกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ: ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ ที่ตอบถูกต้องของกลุ่มเยาวชนข้ามชาติจำแนกตามเพศ (n=442)

ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์	เพศชาย	เพศหญิง	p-value	รวม
	(n=220)	(n=222)		(n=442)
	จำนวน	จำนวน		จำนวน
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)		(ร้อยละ)
1. การใช้ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	179(81.4)	158(71.2)	0.012**	337(76.2)
2. การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	165(75.0)	142(64.0)	0.012**	307(69.5)
3. คนที่เรามองเห็นว่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี อาจเป็นคนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	155(70.5)	140(63.1)	0.099	295(66.7)
4. ยุงสามารถเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวี/เอดส์มาสู่คนได้	62(28.2)	55(24.8)	0.417	117(26.5)

ตารางที่ 4.11 ปัจจัยความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ของกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ: ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ที่ตอบถูกต้องของกลุ่มเยาวชนข้ามชาติจำแนกตามเพศ (n=442) (ต่อ)

ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์	เพศชาย	เพศหญิง	p-value	รวม
	(n=220)	(n=222)		(n=442)
	จำนวน	จำนวน		จำนวน
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)		(ร้อยละ)
5. การกินอาหารร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ทำให้ติดเชื้อเอดส์ได้	120(54.5)	115(51.8)	0.563	235(53.2)
6. การมีเพศสัมพันธ์กับคนรักที่น่าไว้วางใจโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยก็สามารถทำให้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	148(67.3)	136(61.3)	0.187	284(64.3)
7. ในปัจจุบันมียาที่สามารถยับยั้งเชื้อเอชไอวี/เอดส์(ยาต้านไวรัส)	105(47.7)	89(40.1)	0.106	194(43.9)
8. การสัมผัสตัวผู้ติดเชื้อเอดส์ทำให้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	117(53.2)	133(59.9)	0.154	250(56.6)

*แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p-value<0.05, ** ทดสอบโดยใช้สถิติ Chi square

จากตารางที่ 4.11 คำถามความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์มีทั้งหมด 8 ข้อ คะแนนรวม 8 คะแนน กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย 4.6 คะแนน โดยกลุ่มตัวอย่างเพศชายมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิงคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเพศชายเท่ากับ 4.8 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงเท่ากับ 4.4 คะแนน ทดสอบความแตกต่างของคะแนนความรู้เฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างเพศชายและกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.031) (ตาราง จ.1) มีกลุ่มตัวอย่างที่ตอบถูกทุกข้อเพียง ร้อยละ 7.0 และมีกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 4.8 ที่ตอบว่าไม่ทราบทั้ง 8 ข้อ โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างตอบได้ถูกต้องในแต่ละข้อมากกว่า ร้อยละ 50.0 ยกเว้นความรู้ในเรื่องยังสามารถเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวี/เอดส์ มาสู่คนได้มีกลุ่มตัวอย่างที่ตอบได้ถูกต้องเพียง ร้อยละ 26.5 และความรู้เรื่องยาที่สามารถยับยั้งเชื้อเอชไอวี/เอดส์(ยาต้านไวรัส) ได้มีกลุ่มตัวอย่างที่ตอบได้ถูกต้องเพียง ร้อยละ 43.9 ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ ในเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และการมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ได้ในกลุ่มตัวอย่างเพศชายและกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p=0.012)

ตารางที่ 4.12 ปัจจัยด้านความคิดเห็นของผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์ต่อถุงยางอนามัยจำแนกตาม
 ประสบการณ์การใช้ถุงยางอนามัย (n=252)

ความคิดเห็นต่อถุงยางอนามัย	ผู้ที่เคยใช้ถุงยางอนามัย (n=92)		ผู้ที่ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัย (n=160)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ความสะดวกในการได้ถุงยางอนามัย				
เมื่อต้องการใช้				
ไม่สะดวก	24	26.1	45	28.1
สะดวก	65	70.6	60	37.5
ไม่ทราบ	3	3.3	53	33.1
ไม่ตอบ	0	0.0	2	1.3
การใช้ถุงยางอนามัยเป็นการลด				
ความสุขในการมีเพศสัมพันธ์				
ไม่เห็นด้วย	28	30.4	16	10.0
เห็นด้วย	52	56.5	41	25.6
ไม่แน่ใจ	11	12.0	99	61.9
ไม่ตอบ	1	1.1	4	2.5

จากตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์ต่อถุงยางอนามัยโดยจำแนกตามประสบการณ์การใช้ถุงยางอนามัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การใช้ถุงยางอนามัยมีความคิดเห็นว่ามีความสะดวกในการได้ถุงยางอนามัยเมื่อต้องการใช้ ร้อยละ 70.6 ซึ่งมีจำนวนที่มากกว่าผู้ที่ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัย นอกจากนี้มีการเปรียบเทียบความคิดเห็นเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยเป็นการลดความสุขในการมีเพศสัมพันธ์พบว่าผู้ที่เคยใช้ถุงยางอนามัยเห็นด้วย ร้อยละ 56.5 และผู้ที่ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัยเห็นด้วย ร้อยละ 25.6

ตารางที่ 4.13 ปัจจัยด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพ พฤติกรรมหรือประสบการณ์การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ด้วยความสมัครใจในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติจำแนกตามเพศ (n=442)

การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ด้วยความสมัครใจ	เพศชาย(n=220)		เพศหญิง(n=222)		รวม(n=442)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยได้รับการตรวจเลือด	180	81.8	182	82.0	362	81.9
เคยได้รับการตรวจเลือด	38	17.3	38	17.1	76	17.2
ไม่แน่ใจ	2	0.9	2	0.9	4	0.9
สถานที่ที่ได้รับการตรวจเลือด						
โรงพยาบาลรัฐ	26	68.4	28	73.7	54	71.0
โรงพยาบาลเอกชน	4	10.5	3	7.9	7	9.2
คลินิกเอกชน	3	7.9	2	5.3	5	6.6
อื่นๆ*	5	13.2	5	13.2	10	13.2

*สถานที่อื่นๆ ที่ได้รับการตรวจเลือด ได้แก่ สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัด สภากาชาดไทย โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

จากตารางที่ 4.13 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเคยได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ร้อยละ 17.2 โดยกลุ่มตัวอย่างเพศชายและกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงเคยได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ด้วยความสมัครใจในจำนวนที่ใกล้เคียงกันกลุ่มตัวอย่างเพศชายเคยได้รับการตรวจเลือด ร้อยละ 17.3 และกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ร้อยละ 17.1 สถานที่ครั้งล่าสุดที่กลุ่มตัวอย่างได้รับการตรวจเลือดมากที่สุดคือโรงพยาบาลรัฐ ร้อยละ 71.1 รองลงมาคือโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 9.2

ตารางที่ 4.14 ปัจจัยการได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติจำแนกตามเพศ (n=442)

การได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ การป้องกันตนเองจากการ ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย	เพศชาย(n=220)		เพศหญิง(n=222)		รวม(n=442)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยได้รับความรู้	149	67.7	147	66.2	296	67.0
เคยได้รับความรู้	71	32.3	75	33.8	146	33.0

จากตารางที่ 4.14 ปัจจัยด้านการได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย พบว่ากลุ่มตัวอย่างเคยได้รับความรู้ ร้อยละ 33.0 โดยกลุ่มตัวอย่างเพศชายและกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงเคยได้รับความรู้ในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน กลุ่มตัวอย่างเพศชายเคยได้รับความรู้ ร้อยละ 32.3 และกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ร้อยละ 33.8

ตารางที่ 4.15 ปัจจัยด้านแหล่งที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติจำแนกตามเพศ(n=146)

แหล่งที่ได้รับความรู้*	เพศชาย(n=71)		เพศหญิง(n=75)		รวม(n=146)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โรงเรียน	26	36.6	38	50.7	64	43.8
อาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่ให้ความรู้จากภาคเอกชน	18	25.4	11	14.7	29	19.9
อาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่ให้ความรู้จากภาครัฐ	12	16.9	15	20.0	27	18.5
วิทยุ	12	16.9	8	10.7	20	13.7
โรงพยาบาล	3	4.2	10	13.3	13	8.9
แผ่นพับให้ความรู้	7	9.9	5	6.7	12	8.2
เพื่อน	6	8.6	5	6.7	11	7.6
โทรทัศน์	5	7.0	4	5.3	9	6.2
อินเทอร์เน็ต	3	4.2	2	2.7	5	3.4
สถานีอนามัย	2	2.8	2	2.7	4	2.7
หนังสือพิมพ์	1	1.4	2	2.7	3	2.1
คลินิก	1	1.4	2	2.7	3	2.1
อื่นๆ **	5	7.1	5	6.7	10	6.9

*ผู้ตอบเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

** แหล่งที่ได้รับความรู้อื่นๆ ได้แก่ บุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา พี่ชาย พี่สาว ตำรวจ หนังสือทั่วไป หนังสือไทยใหญ่และหนังสือสุศึกษา

จากตารางที่ 4.15 พบว่าแหล่งที่กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยมากที่สุดคือ โรงเรียน ร้อยละ 43.8 รองลงมา

คืออาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่ให้ความรู้จากภาคเอกชน ร้อยละ 19.9 และอาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่ให้ความรู้จากภาครัฐ ร้อยละ 18.5 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.16 ปัจจัยด้านสื่อลามกอนาจารในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติจำแนกตามเพศ (n=442)

ปัจจัยด้านสื่อลามกอนาจาร	เพศชาย(n=220)		เพศหญิง(n=222)		รวม(n=442)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
การดูสื่อลามกอนาจาร						
ไม่เคย	112	50.9	193	86.9	305	69.0
เคย	106	48.2	28	12.6	134	30.3
ไม่ตอบ	2	0.9	1	0.5	3	0.7
ชนิดของสื่อลามกอนาจารที่เคยดู*						
เว็บไซต์หรือคลิป	85	80.2	13	46.4	98	73.1
ลามกอนาจาร ซีดี, ดีวีดี, ใโป้	33	31.1	11	39.3	44	32.8
การ์ตูนลามก	4	3.8	3	10.7	7	5.2
หนังสือใโป้	2	1.9	1	3.6	3	2.2
นิตยสารปลุกใจ	0	0.0	2	7.1	2	1.5

*ผู้ตอบเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตารางที่ 4.16 ปัจจัยด้านการเข้าถึงสื่อลามกอนาจารพบว่ากลุ่มตัวอย่างเคยดูสื่อลามกอนาจาร ร้อยละ 30.3 โดยกลุ่มตัวอย่างเพศชายเคยดูสื่อลามกอนาจารมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ชนิดของสื่อลามกอนาจารที่กลุ่มตัวอย่างรับชมมากที่สุดคือสื่อลามกจากเว็บไซต์หรือคลิปลามกอนาจาร ร้อยละ 73.1 รองลงมาคือซีดีหรือดีวีดีใโป้ ร้อยละ 32.8

ตารางที่ 4.17 ปัจจัยด้านการใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ
จำแนกตามเพศ (n=252)

การใช้สารเสพติดก่อนการมี เพศสัมพันธ์	เพศชาย(n=143)		เพศหญิง(n=109)		รวม(n=252)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยใช้สารเสพติด	114	79.7	102	93.6	216	85.7
เคยใช้สารเสพติด	29	20.3	7	6.4	36	14.3
ชนิดของสารเสพติดที่ใช้						
ก่อนการมีเพศสัมพันธ์*						
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	29	100.0	7	100.0	36	100.0
ยาบ้า	1	3.4	0	0.0	1	2.8
กัญชา	1	3.4	0	0.0	1	2.8

*ผู้ตอบเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตารางที่ 4.17 ปัจจัยด้านการใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 14.3 โดยพบในกลุ่มตัวอย่างเพศชายมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ชนิดของสารเสพติดที่มีการใช้ก่อนการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุดคือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ สุรา เบียร์ เป็นต้น

ตารางที่ 4.18 ปัจจัยด้านครอบครัว/บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติจำแนกตามเพศ
(n=442)

ปัจจัยด้านครอบครัว/บุคคล	เพศชาย(n=220)		เพศหญิง(n=222)		รวม(n=442)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ครอบครัว/บุคคลที่รู้จัก ญาติที่อาศัยในประเทศไทย						
ไม่มี	25	11.4	11	5.0	36	8.1
มี	195	88.6	211	95.0	406	91.9
ลักษณะการพักอาศัย						
ครอบครัว/ญาติ	78	35.4	84	37.8	162	36.6
คู่สมรส/คู่รัก (แฟน)	69	31.4	80	36.0	149	33.7
อยู่คนเดียว	35	15.9	21	9.5	56	12.7
เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน	29	13.2	16	7.2	45	10.2
นายจ้าง	9	4.1	20	9.0	29	6.6
ไม่ตอบ	0	0.0	1	0.5	1	0.2

จากตารางที่ 4.18 ปัจจัยด้านครอบครัว/บุคคลที่รู้จักในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีครอบครัวหรือบุคคลที่รู้จักหรือญาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ร้อยละ 91.9 โดยกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีครอบครัวหรือญาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชาย ลักษณะการพักอาศัยของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างพักอาศัยอยู่กับครอบครัวหรือญาติ ร้อยละ 36.6 รองลงมาคือพักอาศัยกับคู่สมรสหรือคู่รัก ร้อยละ 33.7

Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ 4.19 ปัจจัยด้านบุคคลที่รู้จักมีพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติจำแนกตามเพศ
(n=442)

ปัจจัยด้านบุคคลที่รู้จักมี พฤติกรรมเสี่ยง	เพศชาย(n=220)		เพศหญิง(n=222)		รวม(n=442)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
การรู้จักคนที่ติดเชื้อเอชไอวี หรือเป็นโรคเอดส์						
ไม่รู้จัก	189	85.9	173	77.9	362	81.9
รู้จัก	30	13.6	48	21.6	78	17.6
ไม่ตอบ	1	0.5	1	0.5	2	0.5
การมีคนรู้จักที่ป่วยหรือเสียชีวิตด้วย เอชไอวี/เอดส์						
ไม่มี	9	30.0	15	31.2	24	30.8
มี	19	63.4	32	66.7	51	65.4
ไม่แน่ใจ	1	3.3	1	2.1	2	2.5
ไม่ตอบ	1	3.3	0	0.0	1	1.3

จากตารางที่ 4.19 ปัจจัยด้านบุคคลที่รู้จักมีพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติพบว่า บุคคลที่รู้จักที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้แก่ บุคคลที่รู้จักที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างรู้จักบุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ ร้อยละ 17.6 โดยในจำนวนดังกล่าวกลุ่มตัวอย่างรู้จักบุคคลที่ป่วยหรือเสียชีวิตด้วยเอชไอวี/เอดส์ ร้อยละ 65.4

ตารางที่ 4.20 ปัจจัยด้านบุคคลที่บังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ยินยอมในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ
จำแนกตามเพศ(n=252)

การถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ โดยที่ไม่ยินยอม	เพศชาย(n=143)		เพศหญิง(n=109)		รวม(n=252)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยถูกบังคับ	141	98.6	97	89.0	238	94.4
เคยถูกบังคับ	2	1.4	12	11.0	14	5.6
บุคคลที่บังคับให้มี เพศสัมพันธ์						
คนรัก	1	50.0	5	41.7	6	42.9
คนรู้จัก	0	0.0	4	33.3	4	28.5
เพื่อน	1	50.0	1	8.3	2	14.3
คนแปลกหน้า	0	0.0	2	16.7	2	14.3

จากตารางที่ 4.20 ปัจจัยด้านบุคคลที่บังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ยินยอมพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
เคยถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ยินยอม ร้อยละ 5.6 กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงเคยถูกบังคับให้มี
เพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ยินยอมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชาย โดยกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงเคยถูกบังคับให้มี
เพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ยินยอม ร้อยละ 11.0 ผู้บังคับให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยพบว่าเป็นคนรักมากที่สุด
ร้อยละ 41.7 รองลงมาคือคนรู้จัก ร้อยละ 33.3 กลุ่มตัวอย่างเพศชายเคยถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดย
ที่ไม่ยินยอม ร้อยละ 1.4

ตารางที่ 4.21 ปัจจัยด้านประสบการณ์การเคยมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติในผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์จำแนกตามเพศ (n = 252 คน)

ประสบการณ์การเคยมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	เพศชาย(n=143)		เพศหญิง(n=109)		รวม(n=252)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ประสบการณ์การเคยมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์						
ไม่เคย	136	95.1	94	86.2	230	91.3
เคย	4	2.8	15	13.8	19	7.5
ไม่แน่ใจ	3	2.1	0	0.0	3	1.2
การแสวงหาการรักษาครั้งล่าสุด						
ซื้อยาจากร้านขายยา	4	100.0	2	13.3	6	31.5
ไม่ทำอะไรเลย	0	0.0	5	33.3	5	26.3
โรงพยาบาล/คลินิกของรัฐ	0	0.0	4	26.7	4	21.1
คลินิกเอกชน	0	0.0	2	13.3	2	10.5
โรงพยาบาลเอกชน	0	0.0	1	6.7	1	5.3
อื่นๆ (ต้มยากินเอง)	0	0.0	1	6.7	1	5.3

จากตารางที่ 4.21 ปัจจัยด้านประสบการณ์การเคยมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติในผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยมีอาการ ร้อยละ 7.5 โดยกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงเคยมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชาย กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงเคยมีอาการ ร้อยละ 13.8 กลุ่มตัวอย่างเพศชายเคยมีอาการ ร้อยละ 2.8

ตอนที่ 4 ทักษะชีวิตของผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ

ทักษะชีวิตของผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ รวมไปถึงทัศนคติต่อการใช้ถุงยางอนามัย ดังแสดงในตารางที่ 4.22

ตารางที่ 4.22 ทักษะคิดของผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ
จำแนกตามเพศ (n=190)

ทัศนคติของผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ต่อการมีเพศสัมพันธ์	เพศชาย(n=77)		เพศหญิง(n=113)		รวม(n=190)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เหตุผลที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์						
รู้สึกยังไม่พร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์	30	38.9	54	47.8	84	44.2
มีความคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อน การแต่งงานเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	10	13.0	18	15.9	28	14.7
ยังไม่มีโอกาส	14	18.2	9	8.0	23	12.1
เป็นห่วงความรู้สึกของผู้ปกครอง	6	7.8	7	6.2	13	6.8
กลัวติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ	3	3.9	3	2.6	6	3.3
กลัวปัญหาการตั้งครรภ์	2	2.6	3	2.7	5	2.6
กลัวผู้อื่นจะตำหนิหรือินทา	1	1.3	1	0.9	2	1.1
ไม่ตอบ	0	0.0	1	0.9	1	0.5
อื่นๆ*	11	14.3	17	15.0	28	14.7
การวางแผนในอนาคตถึงการมี เพศสัมพันธ์						
เมื่อตอนแต่งงาน	45	58.4	75	66.4	120	63.2
ยังไม่แน่ใจ	24	31.2	29	25.7	53	27.9
เมื่อพบคนที่รัก	6	7.8	4	3.5	10	5.3
เมื่อมีโอกาส	2	2.6	3	2.7	5	2.6
อื่นๆ (เมื่ออายุมากกว่า 20 ปี)	0	0.0	1	0.9	1	0.5
ไม่ตอบ	0	0	1	0.9	1	0.5

ตารางที่ 4.22 ทักษะคิดของผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ
จำแนกตามเพศ (n=190) (ต่อ)

ทัศนคติของผู้ที่ไม่เคยมี เพศสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์	เพศชาย(n=77)		เพศหญิง(n=113)		รวม(n=190)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
การวางแผนการใช้ถุงยางอนามัย ในอนาคตหากมีเพศสัมพันธ์						
ใช้ถุงยางอนามัย*	33	42.9	48	42.5	81	42.6
ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ โรคทางเพศสัมพันธ์	29	87.9	47	97.9	76	93.8
ป้องกันการตั้งครรภ์	12	36.4	20	41.7	32	39.5
ป้องกันคู่ของตนจากการติดเชื้อ โรคทางเพศสัมพันธ์	4	12.1	13	27.1	17	21.0
คู่นอนให้ใช้	0	0.0	1	2.1	1	1.2
ไม่ใช้ถุงยางอนามัย*	27	35.0	25	22.1	52	27.4
เชื่อใจคู่นอน	25	92.6	20	76.9	45	84.9
คิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้	2	7.4	3	11.5	5	9.4
ไม่รู้จักถุงยางอนามัย	0	0.0	2	7.7	2	3.8
กลัวคู่นอนปฏิเสธ	0	0.0	1	3.8	1	1.9
อื่นๆ (กลัวถุงยางมีสารอันตราย)	0	0.0	1	3.8	1	1.9
ไม่แน่ใจ	15	19.5	35	31.0	50	26.3
ไม่ตอบ	2	2.6	5	4.4	7	3.7

ตารางที่ 4.22 ทักษะคิดของผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ
จำแนกตามเพศ (n=190) (ต่อ)

ทัศนคติของผู้ที่ไม่เคยมี เพศสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์	เพศชาย(n=77)		เพศหญิง(n=113)		รวม(n=190)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ความคิดเห็นเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยเป็น การลดความสุขในการมีเพศสัมพันธ์						
ไม่เห็นด้วย	7	9.1	14	12.4	21	11.1
เห็นด้วย	19	24.7	8	7.1	27	14.2
ไม่แน่ใจ	51	66.2	90	79.6	141	74.2
ไม่ตอบ	0	0.0	1	0.9	1	0.5

*เหตุผลที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์ในข้ออื่นๆ ได้แก่ คิดว่าตนยังเป็นเด็ก อายุยังน้อย ยังไม่มีคนรัก คิดแต่เรื่องทำงาน ไม่มีความสนใจที่จะคบกับใครและไม่รู้จักใคร

**ผู้ตอบเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตารางที่ 4.22 กลุ่มตัวอย่างไม่เคยมีเพศสัมพันธ์จำนวน 190 คน (ร้อยละ 43.0) มีทัศนคติในเรื่องของเพศสัมพันธ์ถึงเหตุผลที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างให้เหตุผลว่ารู้สึกยังไม่พร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 44.2 รองลงมาคือมีความคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 14.7 กลุ่มตัวอย่างมีการวางแผนในการมีเพศสัมพันธ์ในอนาคต ร้อยละ 63.2 วางแผนว่าจะมีเพศสัมพันธ์เมื่อตอนแต่งงาน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างวางแผนเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยในอนาคตเมื่อมีเพศสัมพันธ์พบว่ากลุ่มตัวอย่างจะใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 42.6 สำหรับเหตุผลในการใช้ถุงยางอนามัยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าเป็นการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ ร้อยละ 93.8 รองลงมาคือเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ ร้อยละ 39.5 และพบว่ามีกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 27.4 ที่จะไม่ใช้ถุงยางอนามัย โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเชื่อใจคู่นอนจึงไม่ใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 84.9 รองลงมาคือมีความคิดเห็นว่าไม่จำเป็นต้องใช้ ร้อยละ 9.4 และความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยเป็นการลดความสุขในการมีเพศสัมพันธ์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ ร้อยละ 74.2 และมีกลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยว่าการใช้ถุงยางอนามัยเป็นการลดความสุขในการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 14.2

ตอนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวี กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ โดยพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุยังน้อย การมีคู่นอนหลายคนและพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย ดังแสดงในตารางที่ 4.23 - 4.25

ตารางที่ 4.23 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีกับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุยังน้อย (อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี) ในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ (n=248)

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	ร้อยละของจำนวนผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี (จำนวน/จำนวนทั้งหมด)	p-value
เพศ		0.122
ชาย	56.3 (80/142)	
หญิง	66.0 (70/106)	
การได้รับการศึกษาที่ประเทศบ้านเกิด		0.001*
ไม่ได้เรียน	75.6(59/78)	
เรียน	53.5 (91/170)	
การได้รับการศึกษาที่ประเทศไทย		0.078
ไม่ได้เรียน	54.2 (58/107)	
เรียน	65.2 (92/141)	
ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์		0.236
คะแนน 1 - 4 คะแนน	56.2 (59/105)	
คะแนน 5 - 8 คะแนน	63.6 (91/143)	
บัตรประจำตัวเพื่อการอยู่อาศัยในไทย		0.008*
ไม่มี	39.4 (13/33)	
มี	63.7 (137/215)	

ตารางที่ 4.23 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีกับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุยังน้อย (อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี) ในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ (n=248) (ต่อ)

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	ร้อยละของจำนวนผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี(จำนวน/จำนวนทั้งหมด)	p-value
ใบอนุญาตให้ทำงานหรือเอกสารที่จดทะเบียนในประเทศไทย		0.765
ไม่มี	62.3 (33/53)	
มี	60.0 (117/195)	
สิทธิในการรักษาพยาบาล		0.204
ไม่มี	56.9 (78/137)	
มี	64.9 (72/111)	
รายได้หรือค่าจ้างต่อเดือน		0.077
น้อยกว่า 5000 บาท	91.7 (11/12)	
5,001 - 10,000 บาท	59.0 (128/217)	
10,001 - 15,000 บาท	57.9 (11/19)	
การได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์		0.077
ไม่เคย	57.9 (113/195)	
เคย	71.2 (37/52)	
การได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย		0.052
ไม่เคย	56.3 (94/167)	
เคย	69.1 (56/81)	
การคู่อ้อมกอดนอกร่างกาย		0.307
ไม่เคย	57.1 (89/156)	
เคย	66.3 (59/89)	
ไม่ตอบ	66.7 (2/3)	

ตารางที่ 4.23 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีกับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อย (อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี) ในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ(n=248)

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	ร้อยละของจำนวนผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี(จำนวน/จำนวนทั้งหมด)	p-value
การใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพันธ์		0.757
ไม่เคย	60.1 (128/213)	
เคย	62.9 (22/35)	
ลักษณะการพักอาศัย		0.000*
อยู่คนเดียว	75.8 (25/33)	
ครอบครัว/ญาติ	82.2 (37/45)	
คู่สมรส/คู่รัก (แฟน)	50.7 (73/144)	
นายจ้าง	14.3 (1/7)	
เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน	73.7 (14/19)	
การรู้จักคนที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือเป็นโรคเอดส์		0.076
ไม่รู้จัก	58.2 (114/196)	
รู้จัก	70.6 (36/51)	
การมีคนรู้จักที่ป่วยหรือเสียชีวิตด้วยเอชไอวี/เอดส์		1.000
ไม่มี	68.8 (11/16)	
มี	68.8 (22/32)	
ไม่แน่ใจ	100.0 (2/2)	
ไม่ตอบ	100.0 (1/1)	
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย		0.002*
น้อยกว่า 1 ปี	37.0 (10/27)	

ตารางที่ 4.23 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีกับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุยังน้อย (อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี) ในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ(n=248) (ต่อ)

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	ร้อยละของจำนวนผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี (จำนวน/จำนวนทั้งหมด)	p-value
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (ต่อ)		
1 - 4 ปี	58.9 (73/124)	
5 - 9 ปี	59.3 (35/59)	
10 ปีขึ้นไป	84.2 (32/38)	
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่		0.041*
น้อยกว่า 1 ปี	52.2 (24/46)	
1 - 4 ปี	58.0 (76/131)	
5 - 9 ปี	65.4 (34/52)	
10 ปีขึ้นไป	88.9 (16/18)	

*แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ $p - \text{value} < 0.05$

จากตารางที่ 4.23 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุยังน้อยของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้แก่ การได้รับการศึกษาที่ประเทศบ้านเกิด ($p = 0.001$) การมีบัตรประจำตัวเพื่อการอยู่อาศัยในประเทศไทย ($p = 0.008$) ลักษณะการพักอาศัยมีครอบครัว/บุคคลอาศัยอยู่ด้วย ($p < 0.001$) และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ($p = 0.002$) และจังหวัดเชียงใหม่ ($p = 0.041$)

ตารางที่ 4.24 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีกับ
การมีคู่นอนหลายคนในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ (n=248)

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	ร้อยละของจำนวนผู้ที่มีจำนวนคู่นอน มากกว่า 1 คน (จำนวน/จำนวนทั้งหมด)	p-value
เพศ		0.000*
ชาย	51.8 (72/139)	
หญิง	19.3 (21/109)	
อายุ (ปี)		0.816
15 - 18 ปี	32.1 (9/28)	
19 - 21 ปี	38.7 (36/93)	
22 - 24 ปี	37.8 (48/127)	
การได้รับการศึกษาที่ประเทศบ้านเกิด		0.064
ไม่ได้เรียน	28.9 (22/76)	
เรียน	41.3 (71/172)	
การได้รับการศึกษาในประเทศไทย		0.001*
ไม่ได้เรียน	25.2 (27/107)	
เรียน	46.8 (66/141)	
ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์		0.008*
คะแนน 1 - 4 คะแนน	27.9 (29/104)	
คะแนน 5 - 8 คะแนน	44.4 (64/144)	
บัตรประจำตัวเพื่อการอยู่อาศัยในไทย		0.038*
ไม่มี	21.2 (7/33)	
มี	40.0 (86/215)	
ใบอนุญาตให้ทำงานหรือเอกสารที่จด ทะเบียนในประเทศไทย		0.358
ไม่มี	32.1 (17/53)	
มี	39.0 (76/195)	
สิทธิในการรักษาพยาบาล		0.468

ตารางที่ 4.24 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีกับการมีคู่นอนหลายคนในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ(n=248)(ต่อ)

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	ร้อยละของจำนวนผู้ที่มีจำนวน คู่นอนมากกว่า 1 คน (จำนวน/จำนวนทั้งหมด)	p-value
ไม่มี	35.5 (49/138)	
มี	40.0 (44/110)	
รายได้หรือค่าจ้างต่อเดือน		0.539
น้อยกว่า 5,000 บาท	45.5 (5/11)	
5,001 - 10,000 บาท	36.2 (79/218)	
10,001 - 15,000 บาท	47.4 (9/19)	
การได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์		0.015*
ไม่เคย	33.7 (66/196)	
เคย	52.9 (27/51)	
การได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ การป้องกันตนเองจากการ ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย		0.530
ไม่เคย	36.1 (60/166)	
เคย	40.2 (33/82)	
การคู่อีกก่อนอาจารย์		0.000*
เคย	62.1 (54/87)	
ไม่เคย	23.4 (37/158)	
ไม่ตอบ	66.7 (2/3)	
การใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพันธ์		0.001*
ไม่เคย	33.3 (71/213)	
เคย	62.9 (22/35)	

ตารางที่ 4.24 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีกับ
การมีคู่นอนหลายคนในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ (n=248)(ต่อ)

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	ร้อยละของจำนวนผู้ที่มีจำนวนคู่นอนมากกว่า 1 คน (จำนวน/จำนวนทั้งหมด)	p-value
ลักษณะการพักอาศัย		0.000*
อยู่คนเดียว	60.6 (20/33)	
ครอบครัว/ญาติ	43.5 (20/46)	
คู่สมรส/คู่รัก (แฟน)	27.1 (39/144)	
นายจ้าง	28.6 (2/7)	
เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน	66.7 (12/18)	
การรู้จักคนที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือเป็นโรคเอดส์		0.767
ไม่รู้จัก	36.7 (72/196)	
รู้จัก	41.2 (21/51)	
การมีคนรู้จักที่ป่วยหรือเสียชีวิตด้วยเอชไอวี/เอดส์		0.467
ไม่มี	50.0 (8/16)	
มี	36.4 (12/33)	
ไม่ตอบ	100.0 (1/1)	
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย		0.348
น้อยกว่า 1 ปี	33.3 (9/27)	
1 - 4 ปี	34.4(43/125)	
5 - 9 ปี	47.5 (28/59)	
10 ปีขึ้นไป	35.1 (13/37)	
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่		0.188
น้อยกว่า 1 ปี	37.0 (17/46)	
1 - 4 ปี	32.1 (42/131)	
5 - 9 ปี	49.1 (26/53)	
10 ปีขึ้นไป	41.2 (7/17)	

*แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p – value<0.05

จากตารางที่ 4.24 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการมีคู่นอนหลายคนของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้แก่ เพศ ($p < 0.001$) การได้รับการศึกษาที่ประเทศไทย ($p = 0.001$) ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ($p = 0.008$) การมีบัตรประจำตัวเพื่อการอยู่อาศัยในประเทศไทย ($p = 0.038$) การได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ($p = 0.015$) การรับชมสื่อลามกอนาจาร ($p < 0.001$) การใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพันธ์ ($p = 0.001$) และลักษณะการพักอาศัยมีครอบครัว/บุคคลอาศัยอยู่ด้วย ($p < 0.001$)

ตารางที่ 4.25 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีกับพฤติกรรมการไม่ใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ ($n=252$)

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	ร้อยละจำนวนผู้ที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย (จำนวน/จำนวนทั้งหมด)	p-value
เพศ		0.010*
ชาย	56.6 (81/143)	
หญิง	72.5 (79/109)	
อายุ (ปี)		0.939
15-18 ปี	64.3 (18/28)	
19-21 ปี	62.1 (59/95)	
22-24 ปี	64.3 (83/129)	
การได้รับการศึกษาที่ประเทศบ้านเกิด		0.279
ไม่ได้เรียน	68.4 (54/79)	
เรียน	61.3 (106/173)	
การได้รับการศึกษาที่ประเทศไทย		0.000*
ไม่ได้เรียน	85.2 (92/108)	
เรียน	47.2 (68/144)	
ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์		0.001*
คะแนน 1-4 คะแนน	75.5 (80/106)	
คะแนน 5-8 คะแนน	54.8 (80/146)	

ตารางที่ 4.25 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีกับ
พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ (n=252) (ต่อ)

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	ร้อยละจำนวนผู้ที่ไม่ใช้ ถุงยางอนามัย (จำนวน/จำนวนทั้งหมด)	p-value
บัตรประจำตัวเพื่อการอยู่อาศัยในประเทศไทย		0.000*
ไม่มี	93.9 (31/33)	
มี	58.9 (129/219)	
ใบอนุญาตให้ทำงานหรือเอกสารที่จดทะเบียนในประเทศไทย		0.133
ไม่มี	72.2 (39/54)	
มี	61.1 (121/198)	
สิทธิในการรักษาพยาบาล		0.033*
ไม่มี	69.3 (97/140)	
มี	56.3 (63/112)	
รายได้หรือค่าจ้างต่อเดือน		0.009*
น้อยกว่า 5,000 บาท	41.7 (5/12)	
5,001 - 10,000 บาท	67.0 (148/221)	
10,001 - 15,000 บาท	36.8 (7/19)	
การได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์		0.002*
ไม่เคย	68.5 (135/197)	
เคย	44.4 (24/54)	
ไม่แน่ใจ	100.0 (1/1)	
การได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย		0.010*
ไม่เคย	69.0 (116/168)	
เคย	52.4 (44/84)	

ตารางที่ 4.25 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีกับ
พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ (n=252) (ต่อ)

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	ร้อยละจำนวนผู้ที่ไม่ใช้ ถุงยางอนามัย (จำนวน/จำนวนทั้งหมด)	p-value
การคู่อีกก่อนอาจารย์		0.000*
ไม่เคย	72.3 (115/159)	
เคย	46.7 (42/90)	
ไม่ตอบ	100.0 (3/3)	
การใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพันธ์		0.069
ไม่เคย	65.7 (142/216)	
เคย	50.0 (18/36)	
ลักษณะการพักอาศัย		0.060
อยู่คนเดียว	52.9 (18/34)	
ครอบครัว/ญาติ	52.2 (24/46)	
คู่สมรส/คู่รัก (แฟน)	71.2 (104/146)	
นายจ้าง	57.1 (4/7)	
เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน	52.6 (10/19)	
การรู้จักคนที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือเป็น โรคเอดส์		0.104
ไม่รู้จัก	66.2 (131/198)	
รู้จัก	52.8 (28/53)	
ไม่ตอบ	100.0 (1/1)	
การมีคนรู้จักที่ป่วยหรือเสียชีวิตด้วยเอชไอวี/ เอดส์		0.000*
ไม่มี	17.6 (3/17)	
มี	72.7 (24/33)	
ไม่แน่ใจ	50.0 (1/2)	

ตารางที่ 4.25 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีกับ พฤติกรรมการไม่ใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ (n=252) (ต่อ)

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	ร้อยละจำนวนผู้ที่ไม่ใช้ ถุงยางอนามัย (จำนวน/จำนวนทั้งหมด)	p-value
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย		0.006*
น้อยกว่า 1 ปี	81.5 (22/27)	
1 - 4 ปี	69.6 (87/125)	
5 - 9 ปี	51.7 (31/60)	
10 ปีขึ้นไป	50.0 (20/40)	
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่		0.000*
น้อยกว่า 1 ปี	84.8 (39/46)	
1 - 4 ปี	67.4 (89/132)	
5 - 9 ปี	46.3 (25/54)	
10 ปีขึ้นไป	36.8 (7/19)	

*แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ $p - \text{value} < 0.05$

จากตารางที่ 4.25 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการไม่ใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้แก่ เพศ ($p = 0.010$) การได้รับการศึกษาที่ประเทศไทย ($p < 0.001$) ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ($p = 0.001$) การมีบัตรประจำตัวเพื่อการอยู่อาศัยในประเทศไทย ($p < 0.001$) สิทธิการรักษาพยาบาล ($p = 0.033$) รายได้ต่อเดือน ($p = 0.009$) การได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ($p = 0.002$) การได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย ($p = 0.010$) การรับชมสื่อลามกอนาจาร ($p < 0.001$) การมีคนรู้จักที่ป่วยหรือเสียชีวิตด้วยเอชไอวี/เอดส์ ($p < 0.001$) และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ($p < 0.001$) และจังหวัดเชียงใหม่ ($p = 0.006$)